Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610020.html

Ulipristal

(ue' li pristal) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ulipristal, korunmasız cinsel ilişkiden sonra hamileliği önlemek için kullanılır (herhangi bir doğum kontrol yöntemi olmadan veya başarısız olan veya düzgün kullanılmayan bir doğum kontrol yöntemiyle [örneğin, kaymış veya kırılmış bir prezervatif veya planlandığı gibi alınmayan doğum kontrol hapları]]). Ulipristal, hamileliği önlemek için düzenli olarak kullanılmamalıdır. Bu ilaç, düzenli doğum kontrolünün başarısız olması veya yanlış kullanılması durumunda acil kontraseptif veya yedek olarak kullanılacaktır. Ulipristal, progestin adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Yumurtalığın yumurtalıktan salınmasını önleyerek veya geciktirerek çalışır. Ayrıca hamileliğin gelişmesini önlemek için rahmin (rahim) astarını değiştirerek de işe yarayabilir. Ulipristal hamileliği önleyebilir, ancak insan immün yetmezlik virüsünün (HIV,

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ulipristal ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle korunmasız cinsel ilişkiden veya hormonal bir kontraseptifin (doğum kontrol hapları, yüzükler veya yamalar gibi) başarısız olduğundan şüphelenildikten sonra mümkün olan en kısa sürede yemekle birlikte veya aç karnına alınır. Ulipristal korunmasız cinsel ilişkiden 120 saat (5 gün) sonra alınabilir, ancak ne kadar erken alınırsa hamileliği önleme olasılığı o kadar yüksektir. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Ulipristal'i aynen anlatıldığı gibi alın.

Ulipristal adet döngüsü sırasında herhangi bir zamanda kullanılabilir. Ancak aynı adet döneminde birden fazla kullanılmamalıdır.

Ulipristal aldıktan sonra 3 saatten daha kısa bir süre içinde kusarsanız doktorunuzu arayın. Bu ilacın başka bir dozunu almanız gerekebilir.

Ulipristal tedavisinin hemen ardından hamile kalabileceğiniz için bir sonraki adet döneminize kadar her cinsel ilişkide bariyer yöntemi (prezervatif veya spermisitli diyafram) kullanmalısınız. Ulipristal aldıktan sonraki 5 gün içinde hormonal kontraseptiflerin kullanılması, her iki ilacı da daha az etkili hale getirebilir. Ulipristal kullandıktan en az 5 gün sonra hormonal kontraseptif kullanmaya başlayabilir veya devam edebilirsiniz, ancak bir sonraki adetiniz olana kadar hamileliği önlemek için bir bariyer yöntemi kullanmaya devam etmelisiniz. Hormonal kontraseptifinizle ilgili bir sorun nedeniyle ulipristal aldıysanız, doktorunuzla iletişime geçin veya söz konusu doğum kontrol ürünü için verilen talimatları izleyin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Ulipristal almadan önce,

- ulipristal'e, diğer ilaçlara veya ulipristal tabletlerdeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
- aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: griseofulvin (Gris-PEG), itrakonazol (Onmel, Sporanox) veya ketokonazol gibi belirli mantar önleyici ilaçlar; fenobarbital veya secobarbital (Seconal) gibi barbitüratlar; bosentan (Tracleer); karbamazepin (Equetro, Tegretol, Teril, diğerleri), felbamat (Felbatol), okskarbazepin (Trileptal), fenitoin (Dilantin, Phenytek) ve topiramat (Qsymia'da Topamax) gibi nöbetler için belirli ilaçlar; ve rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de). Diğer birçok ilaç da ulipristal ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.
- Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.
- Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size ulipristal almamanızı söyleyecektir. Mevcut bir hamileliği sonlandırmak için alınan ulipristal almayın.
- Doktorunuza herhangi bir tıbbi durumunuz veya dış gebelik (rahim dışında gebelik) olup olmadığını söyleyin.
- emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
- Ulipristal kullandıktan sonra bir sonraki adet döneminizin beklenenden bir hafta önce veya sonra başlamasının normal olduğunu bilmelisiniz. Bir sonraki adet döneminiz, beklenen tarihten sonra bir haftadan daha uzun bir süre gecikirse doktorunuzu arayın. Hamile olabilirsiniz ve doktorunuz muhtemelen size hamilelik testi yaptırmanızı söyleyecektir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Ulipristal yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- ağrılı adet dönemleri
- adet dönemleri arasında lekelenme veya kanama
- mide bulantısı
- yorgunluk
- baş ağrısı
- baş dönmesi

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki semptomla karşılaşırsanız derhal doktorunuzu arayın:

- şiddetli alt karın ağrısı (ulipristal aldıktan sonra 3 ila 5 hafta)
- döküntü, kaşıntı, kurdeşen veya gözlerin, yüzün, dilin, boğazın şişmesi

Ulipristal başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı aldıktan sonra olağandışı bir sorununuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz. (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçeteniz muhtemelen yeniden doldurulabilir değildir.
Ulipristal ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet ürünleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir.

takviyeler. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- ella®

Son Revize - 08/15/2021

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022