

TITLE - UROFOLLITROPIN / BRAVELLE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medicines Org UK

อ่านเอกสารนี้ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยาบี เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญสำหรับคุณ

- เก็บแผ่นพับนี้ไว้ ท่านอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือพยาบาลของคุณ
- ยาบีได้รับการสั่งจ่ายสำหรับคุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการของพวกเขาจะเหมือนกับของคุณก็ตาม
- หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้พูดคุยกับแพทย์หรือพยาบาลของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้:

1. BRAVELLE คืออะไรและใช้ทำอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ BRAVELLE
3. วิธีใช้ BRAVELLE
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีจัดเก็บ BRAVELLE
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. BRAVELLE คืออะไรและใช้ทำอะไร

BRAVELLE จัดให้เป็นผงที่ต้องผสมกับของเหลว (ตัวทำละลาย) ก่อนนำไปใช้ ได้รับการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

BRAVELLE มีฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนกระตุ้นรูขุมขน (FSH) FSH เป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่ผลิตขึ้นทั้งในเพศชายและเพศหญิง ช่วยให้อวัยวะสืบพันธุ์ทำงานได้ตามปกติ FSH ในยาบีได้มาจากปัสสาวะของสตรีวัยหมดประจำเดือน มันถูกทำให้บริสุทธิ์อย่างสูงและเป็นที่รู้จักกันในชื่อ urofollitropin

BRAVELLE ใช้รักษาภาวะมีบุตรยากของสตรีในสองสถานการณ์ต่อไปนี้:

i. ผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เนื่องจากรังไข่ไม่ผลิตไข่ (รวมถึงโรครังไข่ polycystic) BRAVELLE ใช้ในสตรีที่ได้รับยาที่เรียกว่า clomiphene citrate แล้วเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยากของพวกเขา แต่ยาบีไม่ได้ช่วย

ii. ผู้หญิงในโครงการช่วยการเจริญพันธุ์ (รวมถึงในหลอดทดลอง การปฏิสนธิ/การย้ายตัวอ่อน [IVF/ET], การย้ายเซลล์สืบพันธุ์ภายในรังไข่ [GIFT] และการฉีดสเปิร์มในเซลล์ [ICSI]) BRAVELLE ช่วยให้รังไข่พัฒนาถุงไข่จำนวนมาก (รูขุมขน) ซึ่งไข่อาจพัฒนาได้ (การพัฒนาหลายรูขุมขน)

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ BRAVELLE

ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาบี คุณและคู่ของคุณควรได้รับการประเมินโดยแพทย์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ของคุณ โดยเฉพาะคุณควรได้รับการตรวจสอบสำหรับเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อให้ 1 เป็นวันแรกของช่วงเวลาของคุณ) การรักษาควรได้รับทุกวันสำหรับการรักษาที่อย่างน้อย 7 วัน

- ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยหรือต่อมหมวกไต
- ฮอร์โมนโปรแลคตินในระดับสูง (hyperprolactinemia)
- เนื้องอกของต่อมใต้สมอง (ต่อมที่อยู่บนฐานของสมอง)

- เนื้องอกของไฮโปทาลามัส (บริเวณที่อยู่ใต้สมองส่วนที่เรียกว่าฐานดอก)

หากคุณรู้ว่าคุณมีเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาบี

อย่าใช้ BRAVELLE:

- หากคุณแพ้ (แพ้ง่าย) ต่อ urofollitropin หรือส่วนผสมอื่นใดของยาบี (ระบุไว้ในหัวข้อ 6)
- หากคุณมีเนื้องอกในมดลูก (มดลูก) รังไข่ เต้านม ต่อมใต้สมอง หรือมดลูก
- หากคุณมีซิสต์ในรังไข่หรือรังไข่ที่ขยายใหญ่ขึ้น (เว้นแต่เกิดจากโรครังไข่แบบถุงน้ำหลายใบ)
- หากคุณมีอวัยวะเพศผิดรูปซึ่งทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติ

- หากคุณมีอาการเลือดออกทางช่องคลอดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ

- หากคุณมีเนื้องอกในมดลูก (มดลูก) ซึ่งทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติ

- หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- หากคุณเคยผ่านวัยหมดประจำเดือนมาก่อน

คำเตือนและข้อควรระวัง

พูดคุยกับแพทย์หรือพยาบาลของคุณก่อนใช้ BRAVELLE

หากคุณได้รับ:

- ปวดท้อง
- ท้องอืด
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ท้องเสีย

* อาจมีอาการอื่น, อาการที่พบบ่อย, อื่นๆ

- หายใจลำบาก
- ปัสสาวะน้อยลง

แจ้งให้แพทย์ทราบทันที แม้ว่าอาการจะเกิดขึ้นบางวันหลังจากได้รับการฉีดครั้งสุดท้ายก็ตาม อาการเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณของกิจกรรมระดับสูงในรังไข่ซึ่งอาจรุนแรงได้

หากอาการเหล่านี้รุนแรง ควรหยุดการรักษาภาวะมีบุตรยาก และควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

การรักษาตามปริมาณที่แนะนำของ BRAVELLE และการดูแลรักษาอย่างระมัดระวังจะช่วยลดโอกาสที่คุณจะเกิดอาการเหล่านี้ได้

BRAVELLE

75 IU ผงและตัวทำละลายสำหรับสารละลายสำหรับฉีด (urofollitropin)

หากคุณหยุดใช้ยาบี คุณอาจยังคงมีอาการเหล่านี้ โปรดติดต่อแพทย์ทันทีหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

ขณะที่คุณกำลังรับการรักษาด้วยยาบี โดยปกติแพทย์ของคุณจะจัดให้คุณมี **สแกนอัลตราซาวด์** และบางเวลา **การตรวจเลือด** เพื่อติดตามการตอบสนองของคุณต่อการรักษา

การรักษาด้วยฮอร์โมนเช่นยาบีสามารถเพิ่มความเสี่ยงของ:

- การตั้งครรภ์นอกมดลูก (การตั้งครรภ์นอกมดลูก) หากคุณมีประวัติเป็นโรคก่อนหน้า
- การแท้งบุตร
- การตั้งครรภ์แฝด (แฝดแฝดสาม ฯลฯ)
- ความผิดปกติแต่กำเนิด (มีข้อบกพร่องทางกายภาพในการแรกเกิด)

ผู้หญิงบางคนที่ได้รับการรักษาภาวะมีบุตรยากได้พัฒนาเนื้องอกในรังไข่และอวัยวะสืบพันธุ์อื่นๆ ยังไม่ทราบว่า การรักษาด้วยฮอร์โมนเช่นยาบีทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้หรือไม่

สึ่มเลือดในเส้นเลือดหรือหลอดเลือดแดงมักเกิดขึ้นในสตรีที่ตั้งครรภ์ การรักษาภาวะมีบุตรยากสามารถเพิ่มโอกาสของสิ่งนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีน้ำหนักเกิน หรือถ้าคุณหรือคนในครอบครัวของคุณ (ญาติทางสายเลือด) มีสึ่มเลือด นอกแพทย์หากคุณคิดว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับคุณ

ยาอื่นๆ และ BRAVELLE

แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณกำลังรับประทาน เพิ่งกำลังรับประทาน หรืออาจกำลังใช้ยาอื่นอยู่

Clomiphene citrate เป็นยาอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก หากใช้ BRAVELLE พร้อมกันกับ clomiphene citrate ผลต่อรังไข่อาจเพิ่มขึ้น

สามารถใช้ BRAVELLE พร้อมกันกับ MENOPUR ได้ โปรดดูหัวข้อที่ 3 'วิธีการใช้ BRAVELLE'

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ไม่ควรใช้ยาบีในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

การขับและการใช้เครื่องจักร

ยาบีไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักรของคุณ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับส่วนผสมบางอย่างของ BRAVELLE BRAVELLE มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อโดส กล่าวคือ 'ปราศจากโซเดียม'

3. วิธีใช้ BRAVELLE

ใช้ยาบีตามที่แพทย์ของคุณบอกคุณเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์ของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

พ. ผู้หญิงที่ไม่มีการตกไข่ (ไม่ได้ผลิตไข่): ควรเริ่มการรักษาภายใน 7 วันแรกของรอบเดือน (วัน

การรักษาควรได้รับทุกวันสำหรับการรักษาที่อย่างน้อย 7 วัน

ปริมาณเริ่มต้นปกติ 75 IU ต่อวัน (ขวดผงหนึ่งขวด) แต่อาจปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับอาการของคุณ (สูงสุด 225 IU - 3 ขวดต่อวัน) ควรให้ยาเฉพาะอย่างน้อย 7 วันก่อนเปลี่ยนขนาดยา ขอแนะนำว่าควรเพิ่มขนาดยา 37.5 IU (ครึ่งขวดผง) ในแต่ละครั้ง (และไม่เกิน 75 IU) รอบการรักษาควรถูกยกเลิกหากไม่มีการตอบสนองหลังจาก 4 สัปดาห์

เมื่อได้รับการตอบสนองที่ดี ให้ฉีดฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า human chorionic gonadotrophin (hCG) ในขนาด 5,000 ถึง 10,000 IU เป็นเวลา 1 วันหลังจากการฉีด BRAVELLE ครั้งสุดท้าย ขอแนะนำให้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ฉีด hCG และวันถัดไป มิฉะนั้น อาจทำการผสมเทียม (ฉีดอสุจิเข้าสู่ครรภ์โดยตรง) แพทย์ของคุณจะติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากที่คุณได้รับการฉีด hCG

แพทย์ของคุณจะติดตามผลของการรักษา BRAVELLE แพทย์ของคุณอาจตัดสินใจหยุดการรักษาด้วย BRAVELLE และไม่ให้การฉีด hCG แก่คุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของคุณ ในกรณีนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบกึ่งขวาง (เช่น ถุงยางอนามัย) หรือไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าคุณจะเริ่มมีประจำเดือนครั้งถัดไป

ii ผู้หญิงในโครงการช่วยการเจริญพันธุ์:

หากคุณได้รับการรักษาด้วย GnRH agonist (ยาที่ช่วยให้ฮอร์โมนที่เรียกว่า Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) ทำงานได้) ควรเริ่มใช้ BRAVELLE ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากเริ่มการรักษาด้วย GnRH agonist

ในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ GnRH agonist การรักษาด้วย BRAVELLE ควรเริ่มในวันที่ 2 หรือ 3 ของรอบประจำเดือน (วันที่ 1 คือวันแรกของรอบเดือน)

ควรให้การรักษาทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน ปริมาณเริ่มต้นของยาบีปกติคือ 150 - 225 IU (ผง 2 หรือ 3 ขวด) ปริมาณนี้อาจเพิ่มขึ้นตามการตอบสนองของคุณต่อการรักษาสูงสุด 450 IU (ผง 6 ขวด) ต่อวัน ไม่ควรเพิ่มขนาดยาเกิน 150 IU ต่อการปรับ โดยปกติการรักษาไม่ควรดำเนินต่อไปเกิน 12 วัน

หากมีถุงไข่เพียงพอ คุณจะได้รับยาที่เรียกว่า human chorionic gonadotrophin (hCG) เพียงครั้งเดียวในขนาดสูงถึง 10,000 IU เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ (การปล่อยไข่)

แพทย์ของคุณจะติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากที่คุณได้รับการฉีด hCG

แพทย์ของคุณจะติดตามผลของการรักษา BRVELLE แพทย์ของคุณอาจตัดสินใจหยุดการรักษาด้วย BRVELLE และไม่ให้การฉีดเอชซีจีแก่คุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของคุณ ในกรณีนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร (เช่น ถุงยางอนามัย) หรือไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าคุณจะเริ่มมีประจำเดือนครั้งถัดไป

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน E


หากคลินิกของคุณขอให้คุณฉีดยานี้ด้วยตนเอง คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้

การฉีดยาครั้งแรกควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์


เนื่องจากความหลากหลาย:

ยานี้เป็นยาผง และต้องเจือจางก่อนที่จะฉีด ของเหลวที่คุณควรใช้เพื่อเจือจางยานี้จะได้รับผง ยานี้ควรเจือจางทันทีก่อนใช้เท่านั้น

เพื่อทำดังนี้:



- ตัดเข็มยาวหนา (ดึงขึ้น / เข็มสร้างใหม่) เข้ากับกระบอกฉีดยาให้แน่น



- แบ่งส่วนบนออกจากหลอดด้วยของเหลว
- ดึงของเหลวทั้งหมดจากหลอดบรรจุเข้าไปในหลอดฉีดยา
- สอดเข็มเข้าไปในลูกยางของขวดผง BRVELLE แล้วค่อยๆ ฉีดของเหลวทั้งหมด เล็งไปที่ด้านข้างของขวด เพื่อไม่ให้เกิดฟอง




- ผงควรละลายอย่างรวดเร็ว (ภายใน 2 นาที) เพื่อสร้างสารละลายใส โดยปกติเกิดขึ้นเมื่อเติมตัวทำละลายเพียงไม่กี่หยด
- เพื่อช่วยให้ผงละลาย ให้หมุนสารละลาย **อย่าเขย่า** เพราะจะทำให้เกิดฟองอากาศ *ถ้าสารละลายไม่ชัดเจนหรือมีอนุภาคอยู่ไม่ควรนำมาใช้*
- ดึงสารละลายกลับเข้าไปในกระบอกฉีดยา

หากคุณได้รับผง BRVELLE มากกว่าหนึ่งขวดต่อการฉีด คุณสามารถวาดสารละลาย (การเจือจาง BRVELLE แรก) กลับเข้าไปในหลอดฉีดยาแล้วฉีดลงในขวดผงที่สอง คุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยใช้ขวดมากถึง 6 ขวด ของแข็งทั้งหมด - แต่ทำตามคำแนะนำของแพทย์ของคุณทุกครั้งเท่านั้น

หากคุณได้รับการส่งจ่าย MENOPUR พร้อมกันกับ BRVELLE คุณอาจผสมยาทั้งสองโดยเจือจาง BRVELLE แล้วฉีดสารละลายลงในผง MENOPUR ปล่อยให้สารละลายนี้ละลายและวาดสารละลายที่รวมกันนี้ขึ้นมา จากนั้นให้ฉีดเข้าด้วยกันแทน ของการฉีดแต่ละอย่างแยกกัน

การฉีดกล้ามเนื้อ:



- เมื่อคุณดึงขนาดยาที่กำหนดลงในกระบอกฉีดยาแล้ว ให้เปลี่ยนเข็มเป็นเข็มสั้นและบาง (เข็มฉีดยา)

- แพทย์หรือพยาบาลจะบอกคุณว่าต้องฉีดตรงไหน (เช่น บริเวณหน้าต้นขา หน้าท้อง เป็นต้น)
- ในการฉีด บีบผิวเพื่อให้เกิดรอยพับ และสอดเข็มเข้าไปในร่างกายอย่างรวดเร็วหนึ่งครั้งที่ 90 องศา กดลูกสูบลงเพื่อฉีดสารละลาย แล้วดึงเข็มออก



- หลังจากถอดกระบอกฉีดยาแล้ว ให้กดบริเวณที่ฉีดเพื่อห้ามเลือด การนวดบริเวณที่ฉีดเบาๆ จะช่วยกระจายสารละลายใต้ผิวหนัง
- ห้ามนำสิ่งที่ใช้แล้วทิ้งลงในขยะมูลฝอยทั่วไป ควรกำจัดสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม

หากคุณใช้ BRVELLE มากกว่าที่ควรจะเป็น

กรุณาแจ้งพยาบาลหรือแพทย์

หากคุณลืมใช้ BRVELLE

อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณที่ลืม กรุณาแจ้งพยาบาลหรือแพทย์

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับก็ตาม

การรักษาด้วยยานี้อาจทำให้เกิด **กิจกรรมระดับสูงในรังไข่** โดยเฉพาะในผู้หญิงที่มีถุงน้ำหลายใบ อาการรวมถึง: **ปวดท้อง ท้องบวม คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย น้ำหนักขึ้น หายใจลำบาก และปัสสาวะน้อยลง.**

เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของกิจกรรมระดับสูงในรังไข่ สีมเลือดและการบิดของรังไข่อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณทันที แม้ว่าจะมีอาการขึ้นหลังจากฉีดครั้งสุดท้ายไม่กี่วันก็ตาม

แพ้ (แพ้) ปฏิกริยาอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ยานี้ อาการของปฏิกริยาเหล่านี้อาจรวมถึง: **ผื่น คัน บวมที่คอ และหายใจลำบาก.** หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้ติดต่อแพทย์ทันที

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยมากดังต่อไปนี้ อาจส่งผลกระทบต่อมากกว่า 10 ในทุก ๆ 100 ผู้ป่วยที่รับการรักษา:

- ปวดท้อง
- ปวดศีรษะ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยต่อไปนี้ อาจส่งผลกระทบต่อระหว่าง 1 ถึง 10 ในทุก ๆ 100 ผู้ป่วยที่รับการรักษา:

- การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
- การอักเสบของลำคอและจมูก
- ร้อนวูบวาบ
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- รู้สึกไม่สบายท้อง
- ท้องอืด
- ท้องเสีย
- อาการท้องผูก
- ผื่น
- กล้ามเนื้อกระตุก

* อาการปวดกระดูกเชิงกราน

• การกระตุ้นรังไข่มากเกินไป (กิจกรรมระดับสูง)

- ความอ่อนโยนของเต้านม
- เลือดออกทางช่องคลอด
- ตกขาว

* ความเจ็บปวด

• ความเจ็บปวดและปฏิกริยาในบริเวณที่ฉีด (รอยแดง ช้ำ บวมและ/หรือคัน)

การรายงานผลข้างเคียง

หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้ทาง:

สหราชอาณาจักร: โครงการใบเหลือง เว็บไซต์: www.mhra.gov.uk/yellowcard
ไอร์แลนด์: HPRA Pharmacovigilance, Earlsfort Terrace, IRL - ดับลิน 2; โทร: +353 1 6764971; โทรสาร: +353 1 6762517. เว็บไซต์: www.hpra.ie; อีเมล: medsafety@hpra.ie

โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

5. วิธีจัดเก็บ BRVELLE

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่อง โดยวันหมดอายุหมายถึงถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

อย่าเก็บที่อุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส อย่างเช่นแข็ง

เก็บในภาชนะเดิมเพื่อป้องกันแสง

อย่าทิ้งยาผ่านทางน้ำเสียหรือของเสียในครัวเรือน ตามเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาที่คุณไม่ต้องการแล้ว มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

สิ่งที่ BRVELLE ประกอบด้วย

สารออกฤทธิ์คือ urofollitropin

ขวดผงแต่ละขวดประกอบด้วยฮอร์โมนกระตุ้นรูชมชนที่บริสุทธิ์สูง (FSH) 82.5 IU urofollitropin เมื่อสร้างใหม่ด้วยตัวทำละลายที่จัดเตรียมไว้ขวดแต่ละใบจะให้ FSH 75 IU

ส่วนผสมอื่นๆ ในแผงคือ:

- แลคโตสโมโนไฮเดรต
- โซเดียม ฟอสเฟต dibasic heptahydrate
- โพสโซรเบต 20
- กรดฟอสฟอริก
- น้ำ

ส่วนผสมในตัวทำละลายคือ:

- เกลือแกง
- น้ำ
- กรดไฮโดรคลอริก

BRVELLE หน้าตาและเนื้อหาภายในแพ็คเป็นอย่างไร ยานี้เป็น

ผงและตัวทำละลายสำหรับสารละลายสำหรับฉีด

กล่องบรรจุประกอบด้วยขวดแก้วใสหรือสีบขวดซึ่งมีผงสีอ่อน กล่องบรรจุยังมีหลอดแก้วใสที่มีตัวทำละลายไม่มีสีจำนวนเท่ากัน

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต

ผู้มีอำนาจการตลาดของสหราชอาณาจักร:

Ferring Pharmaceuticals Ltd, Drayton Hall, Church Road, West Drayton UB7 7PS.
PL 03194/0087 - Bravelle
PL 03194/0060 - สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% w/v

ผู้มีอำนาจการตลาดของไอร์แลนด์:

Ferring Ireland Ltd, United Drug House, Magna Drive, Magna Business Park, Citywest Road, ดับลิน 24
PA 1009/19/1

ผู้ผลิต

Ferring GmbH
Wittland 11, D-24109 คีล, เยอรมนี

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อ 04/2016