

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605021.html>

## فالفانسيكلوفير (val gan sye 'kloh veer) تنطق

### تحذيرهام:

قد يقلل فالفانسيكلوفير من عدد خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية في جسمك ، مما يتسبب في مشاكل خطيرة ومهددة للحياة. أخبر طبيبك إذا كان لديك أو كان لديك عدد أقل من خلايا الدم الحمراء أو خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية ؛ أو غيرها من مشاكل الدم أو النزيف. أخبر طبيبك إذا كنت قد عانيت من أي وقت مضى من مشاكل في الدم كأثر جانبي لدواء مشابه لفالفانسيكلوفير مثل جانسيكلوفير (سيتوفين). أخبر طبيبك والصيدلي أيضاً إذا كنت تتناول أو تناولت أيّاً من الأدوية التالية: أدوية العلاج الكيميائي مثل دوكسوروبيسين (دوكسيل) ، فينيلستين ، وفينكريستين ؛ دابسون. فلوسيتوزين (أنكوبون) ؛ هيدروكسي يوريا (دروكسيا ، سيكلوس) ؛ مثبطات المناعة مثل السيكلوسبورين (Neoral و Sandimmune) و (Prograf) tacrolimus ؛ الأدوية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بما في ذلك ديدانوزين (Videx) أوزيدوفودين (AZT ، Retrovir) ؛ البنتاميدين (نيبو بنتام ، بنتام) ؛ تريمتوبريم / سلفاميثوكسازول (باكترم ، سيبترا) ؛ أو إذا كنت قد تلقيت أو تتلقى العلاج الإشعاعي (الأشعة السينية). إذا واجهت أيّاً من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور: التعب المفرط ؛ ضعف ؛ جلد شاحب ؛ دوخة ؛ ارتباك ؛ ضربات قلب سريعة صعوبة في النوم أو البقاء نائماً ؛ ضيق في التنفس ؛ نزيف غير عادي أو كدمات. أو التهاب الحلق أو الحمى أو القشعريرة أو السعال أو علامات العدوى الأخرى. أو إذا كنت قد تلقيت أو تتلقى العلاج الإشعاعي (الأشعة السينية). إذا واجهت أيّاً من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور: التعب المفرط ؛ ضعف ؛ جلد شاحب ؛ دوخة ؛ ارتباك ؛ ضربات قلب سريعة صعوبة في النوم أو البقاء نائماً ؛ ضيق في التنفس ؛ نزيف غير عادي أو كدمات. أو التهاب الحلق أو الحمى أو القشعريرة أو السعال أو علامات العدوى الأخرى.

فالفانسيكلوفير قد يؤدي الجنين. لا تأخذي فالفانسيكلوفير إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. إذا كنت أنثى ، فستحتاجين إلى إجراء اختبار الحمل قبل بدء العلاج واستخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة 30 يوماً بعد الجرعة النهائية. إذا كنت ذكراً ويمكن لشريكك الحمل ، فيجب عليك استخدام الواقي الذكري أثناء تناول هذا الدواء ولمدة 90 يوماً بعد جرعتك النهائية. تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول تحديد النسل. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول فالفانسيكلوفير ، فاتصل بطبيبك على الفور.

قد يقلل Valganciclovir بشكل مؤقت أو دائم من الخصوبة لدى الرجال والنساء. تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تناول فالفانسيكلوفير.

أصبحت حيوانات المختبر التي أعطيت عقار فالفانسيكلوفير بالسرطان. من غير المعروف ما إذا كان عقار فالفانسيكلوفير يزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر.

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك وطبيب العيون والمختبر. قد يطلب طبيبك (أطباؤك) فحوصات منتظمة للعين واختبارات معينة للتحقق من استجابة جسمك لفالفانسيكلوفير.

تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تناول فالغانسيكلوفير.

اطلب من الصيدلي أو الطبيب الحصول على نسخة من معلومات الشركة المصنعة للمريض وقراءتها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء وفي كل مرة تحصل على إعادة التعبئة.

## لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم Valganciclovir لعلاج التهاب الشبكية الفيروسي المضخم للخلايا (CMV) (عدوى العين التي يمكن أن تسبب العمى) في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). يستخدم Valganciclovir أيضاً للوقاية من مرض الفيروس المضخم للخلايا (CMV) لدى الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع القلب أو الكلى أو الكلى والبنكرياس والذين لديهم فرصة للإصابة بمرض CMV. ينتمي Valganciclovir إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات الفيروسات. وهو يعمل عن طريق منع انتشار مرض الفيروس المضخم للخلايا أو إبطاء نمو الفيروس المضخم للخلايا.

## كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Valganciclovir على شكل أقراص ومحلول فموي (سائل) يؤخذ عن طريق الفم. عادة ما يتم تناوله مع الطعام مرة أو مرتين في اليوم. لمساعدتك على تذكر تناول عقار فالغانسيكلوفير ، تناوله في نفس الوقت (الأوقات) تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ فالغانسيكلوفير بالضبط حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

يمكن للأطفال تناول الأقراص أو المحلول الفموي. ومع ذلك ، يجب على البالغين فقط تناول الأقراص.

سيقوم الصيدلي بإعداد المحلول الفموي وسيعطيك أيضاً جهازاً لقياس جرعتك. استخدم فقط جهاز القياس المقدم لك لقياس الحل الخاص بك.

يُرجى المحلول الفموي جيداً قبل كل استخدام.

ابتلاع الأقراص كاملة. لا تقسمها أو تمضغها أو تكسرها أو تسحقها.

كن حذراً عند التعامل مع أقراص فالغانسيكلوفير أو محلول فموي. لا تدع جلدك أو عينيك أو فمك أو أنفك يتلامس مع أقراص فالغانسيكلوفير المكسورة أو المحلول الفموي. في حالة حدوث مثل هذا التلامس ، اغسل بشرتك جيداً بالماء والصابون أو اشطف عينيك جيداً بالماء العادي.

يساعد Valganciclovir على التحكم في CMV لكنه لا يعالجها. لا تتوقف عن تناول عقار فالغانسيكلوفير دون التحدث مع طبيبك. قد يؤدي التوقف عن تناول عقار فالغانسيكلوفير في وقت قريب جداً إلى زيادة كمية الفيروس المضخم للخلايا في الدم أو أن يصبح الفيروس مقاوماً لهذا الدواء.

## هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

## قبة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل تناول فالغانسيكلوفير ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه فالغانسيكلوفير ، غانسيكلوفير (سيتوفين) ، أو أي أدوية أخرى ، أو أي من مكونات أقراص فالغانسيكلوفير أو محلول فموي. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها. تأكد من ذكر الأدوية المدرجة في قسم "تحذير هام" وأي مما يلي: أمفوتيريسين ب (أيليسيت ، أمبيسوم) ؛ إيميبينيم سيلاستاتين (بريماكسين) ؛ ميكوفينولات موفيتيل (سيلسيبت) ؛ وبروينسيد. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من الحالات المذكورة في قسم تحذير هام أو أي من الحالات التالية: أمراض الكلى أو الكبد ، أو إذا كنت تعالج بغسيل الكلى (جهاز خاص يزيل الفضلات من الدم).
- أخبر طبيبك إذا كنت مرضعة. يجب أن لا ترضع أثناء تناول فالغانسيكلوفير. تحدث إلى طبيبك حول موعد بدء الرضاعة الطبيعية بأمان بعد التوقف عن تناول عقار فالغانسيكلوفير.
- إذا كنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول فالغانسيكلوفير.
- يجب أن تعلم أن فالغانسيكلوفير قد يجعلك تشعر بالنعاس أو الدوار أو عدم الثبات أو الارتباك أو أقل يقظة أو يسبب النوبات. لا تقود السيارة أو تشغيل الآلات حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء عليك.

## قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

اشرب الكثير من السوائل أثناء تناول فالغانسيكلوفير.

## قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

خذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ثم تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد المحدد. ومع ذلك ، إذا حان وقت الجرعة التالية تقريباً ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

## الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

**فالغانسيكلوفير قد يسبب آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:**

- إسهال
- غثيان
- التقيؤ
- ألم أو حنان أو تورم في البطن
- ألم في العين
- إمساك
- صداع الراس
- فقدان الوزن
- آلام الظهر أو المفاصل أو العضلات
- قرحة الفم

- كآبة

- القلق

## بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض أو تلك المذكورة في قسم تحذير هام ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- رؤية بقع أو ومضات من الضوء أو ستارة داكنة فوق كل شيء
- انخفاض التبول
- دم في البول
- مشاكل في الرؤية
- تورم في اليدين والذراعين والقدمين والكاحلين أو أسفل الساقين
- قشعريرة
- متسرع
- متلهف، متشوق
- اصفرار الجلد أو العينين. فقدان الشهية؛ البول الداكن؛ و / أو حركات الأمعاء ذات الألوان الفاتحة
- حركات ارتعاش أو اهتزاز غير مقصودة
- خدر أو ألم أو حرق أو وخز في اليدين أو القدمين
- النوبات

قد يتسبب فالغانسيكلوفير في آثار جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

## قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزين الأجهزة اللوحية في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام). قم بتخزين المحلول الفموي في الثلجة لمدة تصل إلى 49 يوماً عند 2-8 درجة مئوية ؛ لا تجمد.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أعطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم.

[http://www.upandaway.org] [http://www.upandaway.org]

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك

أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>) لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

## ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

### قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة ما يلي:

- معدده مضطربه
- التقيؤ
- آلام في المعدة
- إسهال
- المصافحة التي لا يمكنك السيطرة عليها
- النوبات
- انخفاض التبول
- بول دموي
- التهاب الحلق والحمى والقشعريرة والسعال أو علامات العدوى الأخرى
- التعب المفرط
- جلد شاحب
- اصفرار الجلد أو العينين
- دوخة
- ضربات قلب سريعة
- ضعف
- نزيف أو كدمات غير عادية

### قبعة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

لا تدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. لا تدع إمداد فالغانسيكلوفير الخاص بك ينفد. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

## أسماء راند

آخرمراجعة - 15/10/2018

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



### إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض <sup>TM</sup>. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة.  
الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland.  
للاستخدامالتجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبةالوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهدالوطنية للصحة

آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022