Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606024.html

vareniclina

pronunțat ca (var en' I kleen)

de ce este prescris acest medicament?

Vareniclina este utilizată împreună cu educația și consilierea pentru a ajuta oamenii să renunțe la fumat. Vareniclina face parte dintr-o clasă de medicamente numite ajutoare pentru renunțarea la fumat. Acționează prin blocarea efectelor plăcute ale nicotinei (din fumat) asupra creierului.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Vareniclina vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi la început și apoi de două ori pe zi dimineața și seara. Luați vareniclină cu un pahar plin de apă (8 uncii [240 ml]) după masă. Luați vareniclină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați vareniclină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil cu o doză mică de vareniclină și vă va crește treptat doza în prima săptămână de tratament.

Există 3 moduri prin care puteți lua vareniclină pentru a vă ajuta să renunțați la fumat.

- Puteți stabili o dată pentru a renunța la fumat și a începe să luați vareniclină cu 1 săptămână înainte de acea dată. Puteți continua să fumați în această primă săptămână de tratament cu vareniclină, dar asigurați-vă că încercați să renunțați la fumat la data pe care ați ales-o.
- Puteți începe să luați vareniclină și apoi să vă lăsați de fumat între 8 și 35 de zile după începerea tratamentului cu vareniclină.
- Dacă nu sunteți sigur că sunteți în stare sau dacă nu doriți să renunțați brusc la fumat, puteți începe să luați vareniclină și să renunțați încet la fumat pe parcursul a 12 săptămâni de tratament. Pentru săptămânile 1-4, ar trebui să încercați să fumați doar jumătate din numărul normal de țigări în fiecare zi. În săptămânile 5-8, ar trebui să încercați să fumați doar un sfert din numărul zilnic de țigări inițial. În săptămânile 9-12, ar trebui să continuați să încercați să fumați mai puține țigări în fiecare zi până când nu mai fumați deloc. Încercați să renunțați complet până la sfârșitul a 12 săptămâni sau mai devreme dacă vă simțiți pregătit.

Poate dura câteva săptămâni pentru a simți beneficiul complet al vareniclinei. Este posibil să aluneci și să fumați în timpul tratamentului. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să renunțați la fumat. Continuați să luați vareniclină și să încercați să nu fumați.

Probabil veți lua vareniclină timp de 12 săptămâni. Dacă ați renunțat complet la fumat la sfârșitul a 12 săptămâni, medicul dumneavoastră vă poate spune să luați vareniclină pentru încă 12 săptămâni. Acest lucru vă poate ajuta să nu reîncepeți să fumați.

Dacă nu ați renunțat la fumat la sfârșitul a 12 săptămâni, discutați cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră poate încerca să vă ajute să înțelegeți de ce nu ați reușit să renunțați la fumat și să facă planuri pentru a încerca să renunțați din nou.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci când începeți tratamentul cu vareniclină și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al Food and Drug Administration (FDA). (http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/ucm088569.pdf [http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/ucm088569.pdf]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua vareniclină,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la vareniclină sau la orice alte medicamente.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante (''diluanți ai sângelui'') precum warfarina (Coumadin, Jantoven); insulină; alte medicamente care să vă ajute să renunțați la fumat, cum ar fi bupropion (Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, Zyban, în Contrave) și gumă de nicotină, inhalator, pastile, spray nazal sau plasturi pentru piele; și teofilină (Elixophyllin, Theo-24, Theocron). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele unora dintre medicamentele dumneavoastră odată ce vă opriți de fumat.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată simptome de sevraj când ați încercat să renunțați la fumat în trecut și dacă aveți sau ați avut vreodată epilepsie (convulsii); sau boli ale inimii, ale vaselor de sânge sau ale rinichilor
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați vareniclină, adresați-vă medicului dumneavoastră. Dacă alăptați în timp ce luați vareniclină, urmăriți-vă copilul cu atenție pentru convulsii și vărsături sau scuipat mai des decât de obicei. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă copilul dumneavoastră prezintă oricare dintre aceste simptome.
- trebuie să știți că vareniclina vă poate provoca somnolență, amețeală, pierderea cunoștinței sau dificultăți de concentrare. Au existat rapoarte de accidente de circulație, accidente aproape de accident și alte tipuri de răni la persoanele care luau vareniclină. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.
- trebuie să știți că unii oameni au avut modificări de comportament, ostilitate, agitație, stare depresivă și gânduri de sinucidere (gândindu-se să vă rănească sau să se sinucidă sau să planifice sau să încerce să facă acest lucru) în timp ce au luat vareniclină. Rolul vareniclinei în provocarea acestor schimbări de dispoziție este neclar, deoarece persoanele care renunță la fumat cu sau fără medicamente pot experimenta modificări în sănătatea mintală din cauza sevrajului de nicotină. Cu toate acestea, unele dintre aceste simptome au apărut la persoanele care luau vareniclină și continuau să fumeze. Unii oameni au avut aceste simptome când au început să ia vareniclină, iar alții le-au dezvoltat după câteva săptămâni de tratament sau după oprirea vareniclinei.

Aceste simptome au apărut la persoanele fără antecedente de boală mintală și s-au agravat la persoanele care aveau deja o boală mintală. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată depresie, tulburare bipolară (dispoziție care se schimbă de la deprimat la anormal de excitat), schizofrenie (o boală mintală care provoacă gândire tulburată sau neobișnuită, pierderea interesului pentru viață și emoții puternice sau nepotrivite), sau alte boli psihice. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, încetați să luați vareniclină și sunați imediat medicul dumneavoastră: gânduri sau acțiuni suicidare; depresie, anxietate sau atacuri de panică noi sau agravate; agitaţie; nelinişte; comportament furios sau violent; acționează periculos; manie (dispoziție frenetică, anormal de excitată sau vorbire); gânduri sau senzații anormale; halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există); simțind că oamenii sunt împotriva ta; simțindu-se confuz; sau orice alte schimbări bruște sau neobișnuite de comportament, gândire sau dispoziție. Asigurați-vă că familia sau îngrijitorul dumneavoastră știe ce simptome pot fi grave, astfel încât să poată apela medicul dacă nu puteți căuta singur tratament. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza îndeaproape până când simptomele dumneavoastră se ameliorează.

- întrebați medicul despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați vareniclină. Vareniclina poate crește efectele alcoolului,
- cereți sfatul medicului dumneavoastră și informații scrise care să vă ajute să renunțați la fumat. Este mai probabil să renunțați la fumat în timpul tratamentului cu vareniclină dacă obțineți informații și sprijin de la medicul dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Vareniclina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

- greaţă
- constipație
- diaree
- gaz
- durere abdominală
- vărsături
- arsuri la stomac
- gust prost în gură
- gură uscată
- apetit crescut sau scazut
- durere de dinţi

- probleme de a adormi sau de a rămâne adormit
- vise sau coșmaruri neobișnuite
- durere de cap
- lipsa de energie
- dureri de spate, articulații sau musculare
- cicluri menstruale anormale

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în secțiunile PRECAUȚII SPECIALE, opriți administrarea vareniclinei și sunați imediat la medicul dumneavoastră sau solicitați ajutor medical:

- umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, gingiilor, ochilor, gâtului, mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare
- răguşeală
- dificultate la înghițire sau la respirație
- eczemă
- piele umflată, roșie, decojită sau formată de vezicule
- vezicule în gură
- durere, strângere sau presiune în piept
- durere sau disconfort la unul sau ambele brațe, spate, gât, maxilar sau stomac
- dificultăți de respirație
- transpiraţie
- greață, vărsături sau amețeli cu dureri în piept
- vorbire lentă sau dificilă
- slăbiciune sau amorțeală bruscă a unui braț sau picior, în special pe o parte a corpului
- dureri de gambe în timpul mersului
- convulsii
- somnambulism

În studiile clinice, persoanele care au luat vareniclină au avut mai multe șanse de a avea un atac de cord, un accident vascular cerebral sau alte probleme grave cu inima sau vasele de sânge decât persoanele care nu au primit acest medicament. Cu toate acestea, persoanele care fumează au, de asemenea, un risc mai mare de a dezvolta aceste probleme. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile și beneficiile luării vareniclinei, mai ales dacă aveți sau ați avut vreodată boli ale inimii sau ale vaselor de sânge.

Vareniclina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Chantix®

Ultima revizuire - 15.07.2017

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022