Source : New Zealand Medicines Authority

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

VARENICLINE PFIZER

(var-ren-ee-cline fi-zer)

Вареиклин тартарат

Какво има в тази листовка

Тази листовка отговаря на някои често срещани въпроси относно Varenicline Pfizer. Той не съдържа цялата налична информация. Това не замества разговора с Вашия лекар или фармацевт.

Всички лекарства имат рискове и ползи. Вашият лекар е преценил рисковете от приема на Varenicline Pfizer спрямо ползите, които се очаква да има за Вас.

Ако имате някакви притеснения относно приема на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Съхранявайте тази листовка с лекарството. Може да се наложи да го прочетете отново.

Какъв Варенцилин Pfizer се използва за

Varenicline Pfizer е лекарство, което помага на възрастните да спрат пушенето. Може да помогне за намаляване на жаждата и симптомите на отнемане, които могат да се появят, докато спрете да пушите.

Хората, които се отказват от тютюнопушенето, често са засегнати от отнемане на никотина. Симптомите на отнемане на никотин могат да включват жажда за тютюн, раздразнителност, фрустрация, чувство на гняв, проблеми със съня, депресивно настроение, чувство на тревожност, затруднения
концентрация, безпокойство, намален пулс, повишен апетит или наддаване на тегло. Не всеки е засегнат от симптоми на отнемане на никотин.

Въпреки че не се препоръчва да пушите след датата на отказване, Varenicline Pfizer ще намали удоволствието от цигарите, ако пушите по време на лечението.

Как Varenicline Pfizer

върши работа

Varenicline Pfizer съдържа активната съставка вареиклин и действа като блокира ефектите на никотина в тялото ви. В мозъка има рецептори за никотин. Когато се вдишва цигарен дим, никотинът се прикрепя към тези рецептори. Това изпраща съобщение до различна част на мозъка да освободи химикал, наречен допамин. Допаминът дава усещане за удоволствие, което продължава само за кратко време. Тялото иска да повтори това чувство, засилвайки необходимостта от запазване
пушене. Смята се, че Varenicline Pfizer действа чрез активиране на тези рецептори и блокиране на прикрепването на никотина към тях. Varenicline Pfizer не съдържа никотин и не предизвиква пристрастяване.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако имате въпроси относно това защо това лекарство Ви е предписано.

Вашият лекар може да го е предписал по друга причина.

Varenicline Pfizer се предлага само с лекарско предписание.

Употреба при деца

Наличната информация не подкрепя употребата на това лекарство при деца на възраст под 18 години.

Решавайки да спре пушене

Varenicline Pfizer ви помага да откажете пушенето. Други неща, от които се нуждаете, включват:

- сила на волята
- план за отказване
- подкрепа от вашето семейство и приятели
- консултации, съвети или допълнителна подкрепа
- промени в поведението ви, така че избягвате ситуации, в които има вероятност да пушите.

Повечето хора не могат да се откажат от тютюнопушенето без подкрепа. Вашият лекар и фармацевт могат да Ви дадат съвети, подкрепа и източници на информация, които да Ви помогнат да спрете
пушене. Можете също така да получите безплатни съвети и подкрепа от Quitline, като се обадите на 0800 778 778 или онлайн на www.quit.org.nz.

Преди да вземете Варенцилин Пфайзер

Когато не трябва да го приемате

Не приемайте Varenicline Pfizer, ако имате алергия към:

- всяко лекарство, съдържащо вареиклин тартарат
- някоя от съставките, изброени в края на тази листовка.

Някои от симптомите на алергична реакция могат да включват:

- задух, хрипове или затруднено дишане
- подуване на лицето, устните, езика или други части на тялото
- обрив, сърбеж или копривна треска по кожата.

Не приемайте Varenicline Pfizer след срока на годност, отпечатан върху опаковката или ако опаковката е скъсана или показва признаци на подправяне.

Ако срокът му е изтекъл или е повреден, върнете го на вашия фармацевт за изхвърляне.

Говорете с Вашия лекар, ако не сте сигурни дали трябва да приемате това лекарство.

Преди да започнете да го приемате

Уведомете Вашия лекар, ако имате или сте имали чувство на лошо настроение, тревожност, смущения в мисленето, емоционални реакции или поведение, което е попречило или пречи на ежедневния Ви живот.

За някои хора спирането на тютюнопушенето, със или без лечение, е свързано с промени в поведение, мислене или настроение, които не са типични за тях, напр. развиване на суицидни мисли или действия, тревожност, паника, агресия, гняв, мания, необичайни усещания, халюцинации, параноя или объркване.

Някои хора са имали тези симптоми, когато са започнали да приемат Varenicline Pfizer, а други са ги развили след няколко седмици лечение или след спиране на Varenicline Pfizer.

Вашето семейство и приятели трябва да бъдат помолени да наблюдават всякакви промени във вашето поведение, мислене или настроение, които не са типични за вас, напр. развиват суицидни мисли или действия, тревожност, паника, агресия, гняв, мания, необичайни усещания, халюцинации, параноя или объркване.

Обсъдете с Вашия лекар ползите и рисковете от приема на Varenicline Pfizer, за да решите дали е подходящ за Вас.

Уведомете Вашия лекар, ако имате или сте имали някое от следните медицински състояния:

- **състояния на психичното здраве като депресия, мисли за самоубийство или самонараняване**
- **проблеми с бъбреците**
- **повтарящи се припадъци или конвулсии (епилепсия)**

  Някои хора съобщават за конвулсии или припадъци, докато приемат Varenicline Pfizer.
- **проблеми със сърцето и кръвоносните съдове като инфаркт, болка в гърдите или инсулт.**

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, забременеете или кърмите.

- не се препоръчва да приемате Varenicline Pfizer, докато сте бременна или кърмите.
- ако планирате да забременеете, лечението ви трябва да бъде насрочено така, че да сте завършили курс преди да забременеете.

Ако не сте казали на Вашия лекар за някое от изброените по-горе, кажете му/я, преди да започнете да приемате Varenicline Pfizer.

Уведомете Вашия лекар, ако имате алергии към други лекарства, храни, консерванти или оцветители.

Приемане на други лекарства

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства, включително:

- всички лекарства с рецепта
- всички лекарства, витамини, билкови добавки или естествени терапии, които купувате без рецепта от аптека, супермаркет, натуропат или магазин за здравословни храни.

Това включва други лекарства, които да ви помогнат да спрете да пушите, като:

- никотинова заместителна терапия (NRT), която включва пластири, дъвки, таблетки за смучене, сублингвални таблетки и инхалатори (като Nicorette, Nicabate, QuitX)
- бупропион (напр. Zyban).

Прием на Varenicline Pfizer в комбинация с друго пушене терапиите за спиране не се препоръчват.

Безопасността и ползите от приема на Varenicline Pfizer в комбинация с други лекарства за спиране на тютюнопушенето не са проучени.

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следното:

- инсулин
- теофилин, лекарство, използвано за лечение на астма
- варфарин, лекарство, използвано за разреждане на кръвта.

Ефектите от промените във Вашето тяло, произтичащи от спиране на тютюнопушенето, със или без Varenicline Pfizer, може да променят начина, по който действат тези лекарства. В някои случаи може да се наложи коригиране на дозата.

Вашият лекар и фармацевт имат повече информация относно лекарствата, с които трябва да внимавате или да избягвате, докато приемате това лекарство.

Как да приемате Варенцилин Пфайзер

Следвайте внимателно всички указания, дадени Ви от Вашия лекар или фармацевт.

Те може да се различават от информацията в тази листовка.

Ако не разбирате инструкциите на опаковката, помолете Вашия лекар или фармацевт за помощ.

Как да започнете

Има 3 начина да се откажете от пушенето с Varenicline Pfizer:

1. Изберете дата за отказване, когато ще спрете да пушите.

- **Отбележете тази дата. Можете да напишете тази дата на картонена кутия с Initiation Pack като напомняне.**
- **Започнете да приемате Varenicline Pfizer от 1 до 2 седмици (7 до 14 дни) преди датата на напускане.**

- През това време можете да продължите да пушите.
- **Уверете се, че се опитвате да спрете цигарите на датата на отказване. Ако се подхлъзнете и пушите, опитайте отново.**

2. Започнете да приемате Varenicline Pfizer.

- **Изберете дата за отказване, когато ще спрете цигарите между 8-ия и 35-ия ден от започването на Varenicline Pfizer.**
- **Отбележете тази дата. Можете да напишете тази дата на картонена кутия с Initiation Pack като напомняне.**
- **Уверете се, че се опитвате да спрете цигарите на датата на отказване. Ако се подхлъзнете и пушите, опитайте отново.**

3. Започнете да приемате Varenicline Pfizer.

- **Намалете броя на цигарите, които пушите всеки ден през първите 12 седмици от приема на Varenicline Pfizer.**
- **Спрете пушенето в последния ден от 12-седмичния период на лечение. Това е вашата дата за напускане.**
- **Продължете да приемате Varenicline Pfizer 1 mg таблетки за още 12 седмици.**

Колко да приемате

Започнете с бялата таблетка от 0,5 mg и след това увеличете дозата до светлосиня таблетка от 1 mg.

Започването с ниска доза помага на тялото ви да свикне с Varenicline Pfizer.

Ако имате тежко бъбречно заболяване, Вашият лекар може да Ви предпише различна доза.

Обичайните инструкции за дозиране са изброени по-долу.

- Дни 1 - 3: Приемайте една бяла таблетка от 0,5 mg веднъж дневно.
- Дни 4 - 7: Приемайте една бяла таблетка от 0,5 mg сутрин и една вечер.
- Седмици 2 - 4: Приемайте една светлосиня таблетка от 1 mg сутрин и една вечер.
- Седмици 5 - 12: Приемайте една светлосиня таблетка от 1 mg сутрин и една вечер.
- Седмици 13 - 24: Приемайте една светлосиня таблетка от 1 mg сутрин и една вечер.

Как да го приемам

Поглъщайте таблетките цели с пълна чаша вода.

Кога да го приемате

Приемайте лекарството си приблизително по едно и също време всеки ден.

Това ще има най-добър ефект и ще ви помогне да запомните кога да го приемате.

Няма значение дали приемате Varenicline Pfizer преди или след хранене.

Някои хора намират за полезно да приемат Varenicline Pfizer с храна.

Колко време да го приемате

Ако опции 1 или 2 са избраният начин за отказване от тютюнопушенето, приемайте Varenicline Pfizer в продължение на 12 седмици.

Вашият лекар може да Ви посъветва да приемате Varenicline Pfizer още 12 седмици след първото лечение. Това може да увеличи шансовете ви за спиране в дългосрочен план.

Ако опция 3 е избраният начин за отказване от тютюнопушенето, приемайте Varenicline Pfizer в продължение на 12 седмици.

След това трябва да приемате Varenicline Pfizer още 12 седмици (общо 24 седмици).

Ако не спрете да пушите през първите 12 седмици от лечението или ако започнете да пушите отново след лечението, можете да направите още един опит да спрете цигарите.

Въпреки това, преди да направите нов опит, трябва да се опитате да разберете причините, поради които опитът ви да спрете цигарите е неуспешен, така че следващият ви опит да има по-голям шанс за успех.

Ако забравите да го вземете

Ако има по-малко от 6 часа преди следващата доза, пропуснете дозата, която сте пропуснали, и вземете следващата си доза, когато Ви е предназначено.

В противен случай го вземете веднага щом се сетите и след това се върнете към приема на лекарството, както обикновено.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате дозата, която сте пропуснали.

Ако не сте сигурни какво да правите, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате проблеми да си спомните да вземете лекарството си, попитайте Вашия фармацевт за някои съвети.

Ако приемете твърде много (предозиране)

Незабавно се обадете на Вашия лекар или се свържете с Информационния център за отравяния за съвет (телефон 0800 POISON или 0800 764 766) или отидете на спешна помощ в най-близката болница, ако смятате, че вие или някой друг може да сте приели твърде много Varenicline Pfizer. Правете това, дори ако няма признаци на дискомфорт или отравяне.

Може да се нуждаете от спешна медицинска помощ.

Вземете таблетките със себе си в болницата.

Докато приемате Varenciline Pfizer

Уверете се, че се опитвате да спрете цигарите на датата си за отказване.

Ако се подхлъзнете и пушите, опитайте отново.

Неща, които трябва да направите

Спрете приема на Varenicline Pfizer и незабавно уведомете Вашия лекар, ако Вие или Вашето семейство/приятели забележите възбуда, враждебност, депресия или промени в поведението, мисленето или настроението, които не са типични за Вас, или развиете суицидни мисли или действия, тревожност, паника, агресия,

гняв, мания, необичайни усещания, халюцинации, параноя или объркване.

Всички споменавания за самоубийство или насилие трябва да се приемат сериозно. Това са много сериозни странични ефекти. Може да се нуждаете от спешна медицинска помощ или хоспитализация.

Не е известно дали тези промени са свързани с Varenicline Pfizer, тъй като е известно, че промените в настроението могат да се дължат и на ефектите от спирането на тютюнопушенето.

Ако имате съществуващи проблеми със сърцето или кръвоносните съдове, уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако забележите някакви промени в симптомите, докато приемате Varenicline Pfizer.

Вашият лекар може да проверява кръвното Ви налягане и нивата на кръвната захар от време на време, за да се увери, че не сте развили нежелани странични ефекти.

Важно е да спазвате всички назначения на Вашия лекар, за да може да се проверява напредъкът Ви.

Ако ви предстои да започнете да приемате някое ново лекарство, напомнете на Вашия лекар и фармацевт, че приемате Varenicline Pfizer.

Кажете на всички други лекари, зъболекари и фармацевти, които Ви лекуват, че приемате това лекарство.

Ако ви предстои операция, кажете на хирурга или анестезиолога, че приемате това лекарство.

Може да повлияе на други лекарства, използвани по време на операция.

Ако забременеете, докато приемате това лекарство, незабавно уведомете Вашия лекар.

Неща, които не трябва да правите

Не приемайте Varenicline Pfizer за лечение на други оплаквания, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

Не давайте вашето лекарство на никого, дори ако той също се опитва да спре да пуши.

Неща, за които трябва да се внимава

Внимавайте да шофирате или да работите с машини, докато разберете как Varenicline Pfizer Ви влияе.

Varenicline Pfizer може да причини замаяност и сънливост при някои хора. Ако имате някой от тези симптоми, не шофирайте, не работете с машини и не правете нещо друго, което може да бъде опасно.

Бъдете внимателни, ако пиете алкохол, докато приемате това лекарство.

Има съобщения за повишено чувство на пиянство, докато приемате Varenicline Pfizer. Консумирането на алкохол по време на приема на Varenicline Pfizer може също да увеличи риска от изпитвате промени в поведението, мисленето или настроението си, които не са типични за вас, например развитие на суицидни мисли или действия, тревожност, паника, агресия, гняв, мания, необичайни усещания, халюцинации, параноя или объркване.

Странични ефекти

Уведомете Вашия лекар или фармацевт възможно най-скоро, ако не се чувствате добре, докато приемате Varenicline Pfizer.

Отказването от тютюнопушенето със или без лечение може да причини различни симптоми. Те могат да включват промени в настроението, безсъние, затруднена концентрация, намален пулс, повишен апетит или наддаване на тегло. Това лекарство помага на много хора да се откажат от тютюнопушенето, но може да има нежелани странични ефекти при някои хора. Всички лекарства могат да имат странични ефекти. Може да се нуждаете от медицинска помощ, ако получите някои от нежеланите реакции.

Не се тревожете от следните списъци със странични ефекти.

Може да не изпитате нито един от тях.

Помолете Вашия лекар или фармацевт да отговори на всички въпроси, които може да имате.

Спрете приема на Varenicline Pfizer, ако...

Спрете приема на Varenicline Pfizer и незабавно уведомете Вашия лекар, ако Вие или Вашето семейство/приятели забележите възбуда, враждебност, депресия или промени в поведението, мисленето или настроението, които не са типични за Вас, или развиете суицидни мисли или действия, тревожност, паника, агресия, гняв, мания, необичайни усещания, халюцинации, параноя или объркване.

Някои хора са имали промени в поведението, мисленето или настроението, които не са типични за тях, когато започнат да приемат Varenicline Pfizer. Те могат да включват суицидни мисли или действия, тревожност, паника, агресия, гняв, мания, необичайни усещания, халюцинации, параноя или объркване.

Тези симптоми са се появили при хора с предишни проблеми с психичното здраве, както и при такива без предишна анамнеза.

Кажете на Вашия лекар, ако...

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако имате гадене (повръщане), докато приемате Varenicline Pfizer и това Ви тревожи.

Около 3 от 10 души изпитват гадене, обикновено започващо през първата седмица. Повечето хора, които имат гадене, могат да продължат да приемат лекарството. Някои хора намират за полезно да приемат Varenicline Pfizer с храна.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някое от следните и те ви тревожат:

- проблеми със стомаха или червата
  - запек
  - диария
  - усещане за подуване
  - лошо храносмилане
  - вятър
  - гадене, повръщане
  - стомашен дискомфорт
- сухота в устата, зъбобол
- главоболие

- световъртеж
- проблеми със съня
  - затруднения със съня
  - сънливост
  - необичайни сънища
- чувство на умора, умора
- признаци и симптоми на настинка
- промяна в апетита, наддаване на тегло
- промени във вкуса
- мускулни или ставни болки.

Това са най-честите нежелани реакции на Varenicline Pfizer. Обикновено са леки.

Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако...

Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако забележите някое от следните:

- треперене, припадъци или конвулсии
- проблеми със зрението или болка в очите
- червена кръв в изпражненията
- стомашни болки
- прекомерна жажда, сухота в устата и кожата, отделяне на големи количества урина.

Този списък включва сериозни нежелани реакции, които може да изискват медицинска помощ.

Отидете в болница, ако...

Незабавно уведомете Вашия лекар или отидете при злополуки и спешни случаи в най-близката болница и спрете приема на Varenicline Pfizer, ако получите някое от следните:

- самонараняване или мисли за самонараняване
- промени в поведението, мисленето или настроението, които не са типични за Вас, напр. ако развиете суицидна склонност мисли или действия, тревожност, паника, агресия, гняв, мания, необичайни усещания, халюцинации, параноя или объркване
- обрив или внезапно силно сърбящо подуване по кожата
- тежки болезнени червени мехури по кожата с втрисане, треска, болка мускули и общо неразположение
- проблеми с дишането
  - хрипове
  - затруднено дишане
  - недостиг на въздух
- подуване на лицето, устните, устата, езика, гърлото, ръцете или краката

  Някои хора съобщават за подуване на части от лицето и тялото си след прием на Varenicline Pfizer.

- болка в гърдите, която може да се разпространи до врата и раменете, изтръпване или слабост на ръцете или краката, главоболие, замаяност и объркване, зрителни нарушения, затруднено преглъщане, неясна реч или загуба на говор, колапс
- необичаен или бърз пулс
- кръв в повръщано.

Този списък включва много сериозни странични ефекти. Може да се нуждаете от спешна медицинска помощ или хоспитализация. Много сериозни нежелани реакции са редки.

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако забележите нещо друго, което Ви кара да се чувствате зле.

Други нежелани реакции, които не са изброени по-горе, могат да се появят при някои хора. Някои от тези нежелани реакции (например промени в кръвното налягане или нивата на кръвната захар) могат да бъдат открити само когато Вашият лекар направи тестове, за да провери напредъка Ви.

След приемане Варенцилин Пфайзер

Съхранение

Съхранявайте таблетките си в опаковката, докато дойде време да ги приемете.

Ако извадите таблетките от опаковката, те може да не се съхраняват добре.

Съхранявайте таблетките на сухо и хладно място, където температурата остава под 30°C.

Не съхранявайте Varenicline Pfizer или друго лекарство в баня или близо до мивка.

Не го оставяйте на перваза на прозореца или в колата.

Топлината и влагата могат да унищожат някои лекарства.

Дръжте го там, където децата не могат да го достигнат.

Заключен шкаф на поне метър и половина над земята е добро място за съхранение на лекарства.

Изхвърляне

Върнете нежеланите лекарства в аптеката за безопасно изхвърляне.

Вашият лекар може да Ви каже да спрете приема на това лекарство или може да е изтекъл срокът на годност.

Описание на продукта

Как изглежда

Varenicline Pfizer се предлага в 2 степени:

- Таблетките Varenicline Pfizer 0,5 mg са бели, филмирани, модифицирани таблетки с форма на капсула с надпис "Pfizer" от едната страна и "CHX 0,5" от другата.
- Таблетките Varenicline Pfizer 1 mg са светлосини, филмирани, модифицирани таблетки с форма на капсула, маркирани "Pfizer" от едната страна и "CHX 1.0" от другата.

Налични опаковки

Налични са следните опаковки:

- Начална опаковка за започване на лечението съдържа 11 x 0,5 mg таблетки и 42 x 1 mg таблетки
- Продължаваща опаковка, съдържаща 56 x 1 mg таблетки за продължаване лечение.

Съставки

Активни съставки

Таблетките Varenicline Pfizer 0,5 mg съдържат еквивалента на 0,5 mg варениклин.

Таблетките Varenicline Pfizer 1 mg съдържат еквивалента на 1 mg варениклин.

неактивни съставки

Всяка таблетка Varenicline Pfizer съдържа следните неактивни съставки:

- Целулоза - микрокристална
- Калциев хидроген фосфат
- Кроскармелоза натрий
- Силициев диоксид-колоиден безводен
- Магнезиев стеарат
- Opadry Blue (таблетка от 1 mg), Opadry White (таблетка от 0,5 mg) и Opadry Clear.

Varenicline Pfizer не съдържа глутен.

Доставчик

Pfizer New Zealand Limited

пощенска кутия 3998

Окланд, Нова Зеландия.

Безплатен номер: 0800 736 363.

Тази листовка е изготвена през октомври 2018 г.

© Pfizer Australia Pty Ltd 2018.