



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [ベルテポルフィン注射](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607060.html>

ベルテポルフィン注射

(ver'' tepore'fin) と発音します

なぜこの薬が処方されているのですか？

ベルテポルフィン注射は、光力学療法（PDT;レーザー光による治療）と組み合わせて使用 され、湿性加齢性黄斑変性症（AMD;の喪失を引き起こす進行中の眼の疾患によって引き起こされる眼の漏出性血管の異常な成長を治療します真っ直ぐ前を見る能力であり、読書、運転、または他の日常活動の実行をより困難にする可能性があります）、病的近視（時間とともに悪化する深刻な近視）、または眼の組織質症（真菌感染症）。ベルテポルフィン注射は、光増感剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。ベルテポルフィン注射が光によって活性化されると、漏れている血管を閉じます。

わあ、この薬を使うべきですか？

ベルテポルフィン注射は、医師が静脈内（静脈内）に注射するための溶液にされる固体粉末ケーキとして提供されます。ベルテポルフィン注射は通常10分かけて注入されます。ベルテポルフィン注射の開始から15分後、医師はあなたの目に特別なレーザー光を投与します。両方の目が治療を必要とする場合、医師は最初の目の直後にあなたの2番目の目にレーザー光を投与します。これまでにベルテポルフィン注射を使用したことがなく、両眼の治療が必要な場合、医師は最初の訪問時に片方の眼だけをレーザー光で治療します。治療による深刻な問題がない場合、医師は1週間後に別のベルテポルフィン注射とレーザー光線治療で2番目の目を治療します。

ベルテポルフィン注射とPDT治療の3か月後に医師が目を調べて、別の治療が必要かどうかを判断します。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ベルテポルフィン注射を受ける前に、

- ベルテポルフィン、他の薬、またはベルテポルフィン注射の成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。

- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、および服用中または服用予定のハーブ製品を伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。抗凝固剤（「抗凝血剤」）。抗ヒスタミン薬;アスピリンまたは他の鎮痛剤;ベータカロチン;アムロジピン（Norvasc）、ジルチアゼム（Cardizem、Dilacor、Tiazacなど）、フェロジピン（Plendil）、イスラジピン（DynaCirc）、ニカルジピン（Cardene）、ニフェジピン（Adalat、Procardia）、ニモジピン（Nimotop）、nisoldipineなどのカルシウムチャンネル遮断薬Sular）、およびベラパミル（Calan、Isoptin、Verelan）;利尿薬（「水の丸薬」）;グリセオフルビン（フルビシン-U/F、グリセオフルビンV、グリセオフルビン）;糖尿病、精神疾患、および吐き気のための薬;ポリミキシンB;サルファ剤抗生物質;およびデメクロサイクリン（デクロマイシン）などのテトラサイクリン抗生物質、ドキシサイクリン（Doryx、Vibramycin）、ミノサイクリン（Dynacin、ミノシン）、およびテトラサイクリン（Sumycin）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- ポルフィリン症（光に敏感になる状態）があるかどうかを医師に伝えてください。あなたの医者はおそらくベルテポルフィン注射を使用しないようにあなたに言うでしょう。
- 放射線療法で治療を受けているかどうか、胆嚢や肝臓の病気、またはその他の病状を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。ベルテポルフィン注射を使用しているときに妊娠した場合は、医師に連絡してください。
- ベルテポルフィンの注入から5日以内に歯科手術を含む手術を受けている場合は、ベルテポルフィンを使用したことを医師または歯科医に伝えてください。
- ベルテポルフィンは視力の問題を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにどのような影響を与えるかわかるまで、車を運転したり機械を操作したりしないでください。
- ベルテポルフィンは肌を日光に非常に敏感にすることを知っておく必要があります（日焼けする可能性があります）。ベルテポルフィン注入後5日間は、リストバンドを着用して、直射日光や明るい室内光（日焼けサロン、明るいハロゲン照明、手術室や歯科医院で使用される高出力照明など）に皮膚や目をさらさないように注意してください。ベルテポルフィン注入後の最初の5日間、日光の下で屋外に出なければならない場合は、つばの広い帽子や手袋、濃いサングラスなどの保護服を着用して、体のすべての部分を保護してください。この間、日焼け止めは日光からあなたを守りません。この間、光を完全に避けないでください。肌を柔らかな室内光にさらす必要があります。
- 治療中に自宅で視力をテストすることについて医師に相談してください。医師の指示に従って両眼の視力を確認し、視力に変化があった場合は医師に連絡してください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ベルテポルフィン注射は副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 注射部位の痛み、発赤、腫れ、または変色
- 注入中の腰痛
- ドライアイ
- かゆい目
- 乾燥したかゆみのある肌

- 便秘
- 吐き気
- 筋肉痛または脱力感
- タッチに対する感度の低下
- 難聴

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- ぼやけた視界
- 視力の低下または変化
- 光の点滅を見る
- 視界の黒い斑点
- まぶたの発赤と腫れ
- ピンク目の目
- 胸痛
- 失神
- 発汗
- めまい
- 発疹
- 呼吸困難
- フラッシング
- 急速または不整脈
- 頭痛
- エネルギーの欠乏
- じんましんとかゆみ

ベルテポルフィン注射は他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の使用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とのすべての約束を守ってください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- ヴィスダイン®

最終レビュー-2010年9月1日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日