Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682848.html

Vinblastina

pronunciado como (adolescente de vin blas)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

La vinblastina debe administrarse únicamente en una vena. Sin embargo, puede filtrarse al tejido circundante causando irritación o daño severo. Su médico o enfermero controlará su lugar de administración para detectar esta reacción. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: dolor, picazón, enrojecimiento, hinchazón, ampollas o llagas en el lugar donde se inyectó el medicamento.

La vinblastina debe administrarse únicamente bajo la supervisión de un médico con experiencia en el uso de medicamentos de quimioterapia.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La vinblastina se usa en combinación con otros medicamentos de quimioterapia para tratar el linfoma de Hodgkin (enfermedad de Hodgkin) y el linfoma no Hodgkin (tipos de cáncer que comienzan en un tipo de glóbulo blanco que normalmente combate las infecciones) y el cáncer de testículos. También se usa para tratar la histiocitosis de células de Langerhans (histiocitosis X; enfermedad de Letterer-Siwe; una afección en la que crece demasiado cierto tipo de glóbulos blancos en partes del cuerpo). También se puede usar para tratar el cáncer de mama que no ha mejorado después del tratamiento con otros medicamentos y los tumores trofoblásticos gestacionales (un tipo de tumor que se forma dentro del útero de una mujer durante el embarazo) que no ha mejorado después de la cirugía o el tratamiento con otros medicamentos. La vinblastina pertenece a una clase de medicamentos llamados alcaloides de la vinca.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La vinblastina viene en forma de polvo o solución (líquido) para ser inyectada por vía intravenosa (en una vena) por un médico o enfermera en un centro médico. Por lo general, se administra una vez por semana. La duración del tratamiento depende de los tipos de medicamentos que esté tomando, qué tan bien responda su cuerpo a ellos y el tipo de cáncer que tenga.

Es posible que su médico deba retrasar su tratamiento o cambiar su dosis si experimenta ciertos efectos secundarios. Es importante que informe a su médico cómo se siente durante su tratamiento con la inyección de vinblastina.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

La vinblastina también se usa a veces para tratar el cáncer de vejiga, ciertos tipos de cáncer de pulmón, el sarcoma de Kaposi y ciertos tumores cerebrales. Hable con su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir vinblastina,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la vinblastina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de la inyección de vinblastina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: aprepitant (Emend), ciertos antimicóticos como itraconazol (Sporanox) y ketoconazol (Nizoral); claritromicina (Biaxin, en Prevpac); eritromicina (EES, E-Mycin, otros); inhibidores de la proteasa del VIH, incluidos indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) y ritonavir (Norvir, en Kaletra); fenitoína (Dilantin), tolterodina (Detrol, Detrol LA). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- Informe a su médico si tiene una infección. Su médico querrá tratar su infección antes de recibir la inyección de vinblastina.
- Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos, incluidas las venas varicosas (hinchazón, enrojecimiento o dolor en una vena de los brazos o las piernas), o enfermedad pulmonar o hepática.
- Debe saber que la vinblastina puede interferir con el ciclo menstrual normal (período) en las mujeres y puede detener temporal o permanentemente la producción de esperma en los hombres. Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. No debe quedar embarazada ni amamantar mientras recibe la inyección de vinblastina. Si queda embarazada mientras recibe la inyección de vinblastina, llame a su médico. La vinblastina puede dañar al feto.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La vinblastina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- constipación
- náuseas
- vómitos
- pérdida de apetito o peso

- dolor de estómago
- Diarrea
- dolor de cabeza
- mareo
- dolor de mandíbula, dolor de huesos y otros dolores
- perdida de cabello

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los que se enumeran en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- fiebre, dolor de garganta, escalofríos u otros signos de infección
- sangrado o moretones inusuales
- llagas en la boca
- cansancio o debilidad inusual
- dolor, entumecimiento, ardor u hormigueo en las manos o los pies
- dificultad para caminar o caminar inestable
- respiración dificultosa
- pérdida de la audición
- convulsiones
- Dolor de pecho

La vinblastina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono (1-800-332-1088).

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

- confusión
- convulsiones
- constipación

- dolor de estómago
- sangrado o moretones inusuales
- fiebre, dolor de garganta, escalofríos u otros signos de infección

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la vinblastina.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Velban®¶

otros nombres

- Sulfato de vincaleucoblastina
- VLB

¶-Este producto de marca ya no está en el mercado. Es posible que haya alternativas genéricas disponibles.

Última revisión - 15/06/2013

Aprende a citar esta página

Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022