



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Vinblastin

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682848.html>

## Vinblastin

uttalas som (vin blas tonåring)

### VIKTIG VARNING:

Vinblastin ska endast administreras i en ven. Det kan dock läcka in i omgivande vävnad och orsaka allvarlig irritation eller skada. Din läkare eller sjuksköterska kommer att övervaka din administreringsplats för denna reaktion. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: smärta, klåda, rodnad, svullnad, blåsor eller sår på den plats där medicinen injicerades.

Vinblastin ska endast ges under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av kemoterapimedieiner.

### hur är denna medicin utskriven?

Vinblastin används i kombination med andra kemoterapiläkemedel för att behandla Hodgkins lymfom (Hodgkins sjukdom) och non-Hodgkins lymfom (typer av cancer som börjar i en typ av vita blodkroppar som normalt bekämpar infektion) och cancer i testiklarna. Det används också för att behandla Langerhans cellhistiocytos (histiocytos X; Letterer-Siwes sjukdom; ett tillstånd där för många av en viss typ av vita blodkroppar växer i delar av kroppen). Det kan också användas för att behandla bröstcancer som inte har förbättrats efter behandling med andra mediciner och trofoblastiska gestationstumörer (en typ av tumör som bildas inuti en kvinnas livmoder när hon är gravid) som inte har förbättrats efter operation eller behandling med andra mediciner. Vinblastin är i en klass av mediciner som kallas vinca-alkaloider.

### hur ska detta läkemedel användas?

Vinblastin kommer som ett pulver eller en lösning (vätska) som ska injiceras intravenöst (i en ven) av en läkare eller sjuksköterska på en medicinsk anläggning. Det ges vanligtvis en gång i veckan. Behandlingslängden beror på vilken typ av läkemedel du tar, hur väl din kropp reagerar på dem och vilken typ av cancer du har.

Din läkare kan behöva skjuta upp behandlingen eller ändra din dos om du upplever vissa biverkningar. Det är viktigt att du berättar för din läkare hur du mår under din behandling med vinblastininjektion.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

### **användningsområdena för detta läkemedel**

Vinblastin används också ibland för att behandla cancer i urinblåsan, vissa typer av lungcancer, Kaposi sarkom och vissa hjärntumörer. Tala med din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordinerats för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

### **bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?**

#### **Innan du får vinblastin,**

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot vinblastin, andra mediciner eller något av ingredienserna i vinblastininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: aprepitant (Emend), vissa antimykotika som itrakonazol (Sporanox) och ketokonazol (Nizoral); klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); erytromycin (EES, E-Mycin, andra); HIV-proteashämmare inklusive indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) och ritonavir (Norvir, i Kaletra); fenytoin (Dilantin), tolterodin (Detrol, Detrol LA). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- tala om för din läkare om du har en infektion. Din läkare kommer att vilja behandla din infektion innan du får vinblastininjektion.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive åderbräck (svullnad, rodnad eller smärta i en ven i dina armar eller ben), eller lung- eller leversjukdom.
- du bör veta att vinblastin kan störa den normala menstruationscykeln (mens) hos kvinnor och kan tillfälligt eller permanent stoppa spermieproduktionen hos män. Tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du ska inte bli gravid eller amma medan du får vinblastininjektion. Om du blir gravid medan du får vinblastininjektion, kontakta din läkare. Vinblastin kan skada fostret.

### **hatt speciella kostråd ska jag följa?**

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

### **hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?**

**Vinblastin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:**

- förstoppning
- illamående
- kräkningar
- förlust av aptit eller vikt

- magont
- diarre
- huvudvärk
- yrsel
- käksmärta, skelettsmärta och andra värk
- håravfall

**Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, ring din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:**

- feber, ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion
- ovanlig blödning eller blåmärken
- sår i munnen
- ovanlig trötthet eller svaghet
- smärta, domningar, sveda eller stickningar i händer eller fötter
- svårigheter att gå eller ostadig gång
- svårt att andas
- hörselnedsättning
- anfall
- bröstsmärta

Vinblastin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

## **n nödfall/överdos**

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

**Symtom på överdosering kan inkludera:**

- förvirring
- anfall
- förstoppning

- magont
- ovanlig blödning eller blåmärken
- feber, ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion

## hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps svar på vinblastin.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

## rand namn

- Velban®¶

## deras namn

- Vincalokoblastinsulfat
- VLB

¶-Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.

Senast reviderad - 2013-06-15

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

---

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022