Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a687007.html

ซิโดวูดีน

ออกเสียงว่า (zye doe 'vue deen)

คำเตือนที่สำคัญ:

ไซโดวูดีนอาจลดจำนวนเซลล์ในเลือดของคุณ รวมถึงเซลล์เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณเคยมีหรือเคยมีเซลล์เม็ดเลือดชนิดใดๆ หรือมีความผิดปกติของเลือด เช่น โรคโลหิตจาง (จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ) หรือปัญหาเกี่ยวกับไขกระดูกหรือไม่ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้: มีเลือดออกหรือช้ำผิดปกติ มีไข้ หนาวสั่น หรืออาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ เหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงผิดปกติ หรือผิวสีซีด

ไซโดวูดีนยังอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตต่อตับและภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตที่เรียกว่าแลคติกแอซิโดซิส (การสะสมของกรดแลคติกในเลือด) แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน: คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้องด้านขวาบน, เบื่ออาหาร, เหนื่อยล้ามาก, อ่อนแรง, เวียนศีรษะ, มึนหัว, หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ , หายใจลำบาก, ปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสีน้ำตาล, ลำไส้สีอ่อน, ผิวหรือตาเป็นสีเหลือง, รู้สึกหนาวโดยเฉพาะที่แขนหรือขา, หรือปวดกล้ามเนื้อที่แตกต่างจากอาการปวดกล้ามเนื้อที่คุณมักจะพบ

ไซโดวูดีนอาจทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานเป็นเวลานาน โทรหาแพทย์หากคุณมีอาการเหนื่อยล้า ปวดกล้ามเนื้อ หรืออ่อนแรง

สิ่งสำคัญคือต้องนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของคุณต่อ zidovudine

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาไซโดวูดีน

hy เป็นยานี้กำหนด?

Zidovudine ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) Zidovudine มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อไปยังทารก Zidovudine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) มันทำงานโดยการลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด แม้ว่า zidovudine ไม่สามารถรักษา HIV ได้ แต่ก็อาจ

ลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ที่ได้มา และโรคที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อรุนแรงหรือมะเร็ง การใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่ (แพร่) ไวรัสเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Zidovudine มาในรูปแบบแคปซูลแท็บเล็ตและน้ำเชื่อมที่รับประทานทางปาก โดยปกติผู้ใหญ่จะรับประทานวันละสองครั้งและทารกและเด็กสองถึงสามครั้งต่อวัน ทารกอายุไม่เกิน 6 สัปดาห์อาจใช้ยาไซโดวูดีนทุกๆ 6 ชั่วโมง เมื่อสตรีมีครรภ์ใช้ยาไซโดวูดีน อาจต้องรับประทานวันละ 5 ครั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ยาไซโดวูดีนตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

แพทย์ของคุณอาจหยุดการรักษาของคุณชั่วคราวหากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

Zidovudine ควบคุมการติดเชื้อ HIV แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานไซโดวูดีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานไซโดวูดีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เมื่อยาไซโดวูดีนของคุณเริ่มมีน้อยลง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้มากขึ้น หากคุณลืมรับประทานยาหรือหยุดทานยาไซโดวูดีน อาการของคุณอาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้น

ใช้สำหรับยานี้

ไซโดวูดีนยังใช้ร่วมกับยาอื่นๆ ในบางสถานการณ์เพื่อรักษาบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลอื่นๆ ที่ติดเชื้อเอชไอวีหลังจากสัมผัสกับเลือด เนื้อเยื่อ หรือของเหลวอื่นๆ ในร่างกายที่ปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สำหรับสภาพของคุณ

ยานี้บางครั้งมีกำหนดสำหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไซโดวูดีน

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาไซโดวูดีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ไซโดวูดีน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาที่สั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์อื่นใด อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาเคมีบำบัดสำหรับโรคมะเร็ง doxorubicin (Doxil), ganciclovir (Cytovene, Valcyte), interferon alfa, ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere) และ stavudine (Zerit) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยาไซโดวูดีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ คุณไม่ควรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือถ้าคุณกำลังใช้ยาไซโดวูดีน
- คุณควรรู้ว่าคุณอาจสูญเสียไขมันในร่างกายจากใบหน้า ขา และแขน ปรึกษาแพทย์หากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้

- คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสู้กับการติดเชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทำให้คุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลงหลังจากเริ่มการรักษาด้วยยาไซโดวูดีน อย่าลืมบอกแพทย์

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไม่ได้รับและดำเนินการตามกำหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

ไซโดวูดีนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ปวดท้องหรือตะคริว
- อิจฉาริษยา
- ท้องร่วง (โดยเฉพาะในเด็ก)
- ท้องผูก
- ปวดหัว
- นอนหลับยากหรือหลับยาก

หากคุณพบอาการดังต่อไปนี้ หรืออาการใดๆ ที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- ผื่น
- พุพองหรือลอกของผิวหนัง
- ลมพิษ
- อาการคัน
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
- บวมที่ตา ใบหน้า ลิ้น ริมฝีปาก หรือลำคอ

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยานี้?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เก็บยาไซโดวูดีนไว้ให้พร้อม อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- เรโทรไวรัส®

ชื่อของเธอ

- AZT
- ZDV

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ

สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022