Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617015.html

Abakavir, Dolutegravir ve Lamivudin

(a bak' a vir) (doe" loo teg' ra vir) (la miv' ue deen) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Abacavir, dolutegravir ve lamivudin, ciddi veya yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyona neden olabilir. Aşağıdaki gruplardan iki veya daha fazlasından bir semptom geliştirirseniz, abakavir, dolutegravir ve lamivudin almayı bırakmanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için hemen doktorunuzu arayın:

- Grup 1: ateş
- Grup 2: döküntü
- Grup 3: mide bulantısı, kusma, ishal veya mide bölgesi ağrısı
- Grup 4: genel olarak hasta hissetme, aşırı yorgunluk veya ağrı
- Grup 5: nefes darlığı, öksürük veya boğaz ağrısı

Ayrıca, aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız hemen doktorunuzu arayın: baş ağrısı; kas veya eklem ağrısı; yüz, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi; ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma; kaşıntı; cildin kabarması veya soyulması; yutma veya nefes almada zorluk; kırmızı, şişmiş, kaşıntılı veya ağlamaklı gözler; veya ağızda yaralar.

İlaçlarınızı yanınıza aldığınızda eczacınız size bir Uyarı Kartı verecektir. Uyarı Kartı, sizin ve çevrenizdeki kişilerin alerjik reaksiyonunuz olup olmadığını anlamasını kolaylaştırmak için yukarıda listelenen semptom gruplarını içerir. Bu Uyarı Kartını her zaman yanınızda taşıdığınızdan emin olun.

Bazı kişilerin kalıtım veya genetik yapılarına bağlı olarak abakavir, dolutegravir ve lamivudine karşı alerjik reaksiyon gösterme olasılığı daha yüksek olabilir. Doktorunuz abakavir, dolutegravir ve lamivudine başlamadan önce veya bu ilaca karşı alerjik reaksiyon gösterme olasılığınızın daha yüksek olup olmadığını belirlemek için daha önce test yaptırmadıysanız, bir genetik laboratuvar testi isteyebilir. abakavir, dolutegravir ve lamivudine veya abakavir veya dolutegravir içeren diğer ilaçlara alerjiniz varsa veya bu genetik yapıya sahip olduğunuzu biliyorsanız, doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Daha önce abakavire (Epzicom'da, Trizivir'de, Ziagen'de) veya dolutegravir'e (Tivicay) veya abakavir veya dolutegravir içeren başka bir ilaca karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa, doktorunuz muhtemelen size abakavir, dolutegravir ve lamivudin kullanmamanızı söyleyecektir.

tekrar dolutegravir ve lamivudin veya abakavir veya dolutegravir içeren bir ilaç. Abakavir, dolutegravir ve lamivudin'i art arda birkaç dozun atlanması veya ilaçlarınızın bitmesi dahil olmak üzere başka herhangi bir nedenle keserseniz, önce doktorunuzla konuşmadan tekrar almaya başlamayın. Bu ilacı yeniden başlattığınızda, gerekirse acil tıbbi bakım sağlayabilecek veya arayabilecek kişilerin yanında olmanız gerekecektir.

Hepatit B virüsü enfeksiyonunuz (HBV; devam eden bir karaciğer enfeksiyonu) veya hepatit C virüsü enfeksiyonunuz (HCV; devam eden bir karaciğer enfeksiyonu) varsa veya sahip olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. HBV'niz varsa ve abakavir, dolutegravir ve lamivudin alıyorsanız, abakavir, dolutegravir ve lamivudin almayı bıraktığınızda durumunuz aniden kötüleşebilir. Abacavir, dolutegravir ve lamivudin almayı bıraktıktan sonra, HBV'nizin kötüleşip kötüleşmediğini görmek için doktorunuz sizi birkaç ay boyunca düzenli olarak muayene edecek ve laboratuvar testleri isteyecektir.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun abakavir, dolutegravir ve lamivudine yanıtını kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Abacavir, dolutegravir ve lamivudin ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar doldurduğunuzda doktorunuz veya eczacınız size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz. (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Abacavir, dolutegravir ve lamivudin almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Abacavir, dolutegravir ve lamivudin kombinasyonu, belirli yetişkinlerde ve en az 40 kg ağırlığındaki çocuklarda HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Abakavir ve lamivudin, nükleozid analog ters transkriptaz inhibitörleri (NRTI'ler) adı verilen bir ilaç sınıfındadır ve dolutegravir, bütünleşik zincir transfer inhibitörleri (INSTI'ler) adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanınızdaki HIV miktarını azaltarak ve vücudunuzdaki enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan bağışıklık hücrelerinin sayısını artırarak çalışırlar. Abacavir, dolutegravir ve lamivudin HIV'i tedavi etmeyecek olsa da, bu ilaçlar edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) ve ciddi enfeksiyonlar veya kanser gibi HIV ile ilgili hastalıklar geliştirme şansınızı azaltabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Abacavir, dolutegravir ve lamivudin kombinasyonu, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez yemekle birlikte veya yemeksiz alınır. Abacavir, dolutegravir ve lamivudin'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve doktorunuza veya

Eczacı, anlamadığınız herhangi bir yeri açıklamak için. Abacavir, dolutegravir ve lamivudin'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Abacavir, dolutegravir ve lamivudin, HIV enfeksiyonunu kontrol etmeye yardımcı olur, ancak onu iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile abakavir, dolutegravir ve lamivudin almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan abakavir, dolutegravir ve lamivudin almayı kesmeyin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Abacavir, dolutegravir ve lamivudin almadan önce,

- abakavir, dolutegravir ve lamivudine, diğer ilaçlara veya abakavir, dolutegravir ve lamivudin tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.
- dofetilid (Tikosyn) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı alıyorsanız doktorunuz muhtemelen size abakavir, dolutegravir ve lamivudin almamanızı söyleyecektir.
- doktorunuza ve eczacınıza, aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, diğerleri); dalfampridin (Ampira); abakavir (Epzicom'da, Trizivir'de, Ziagen'de), dolutegravir (Tivicay'de), efavirenz (Sustiva'da, Atripla'da), emtrisitabin (Emtriva, Atripla'da, Complera'da, Truvada'da, diğerleri), etravirin (Intelence) dahil olmak üzere HIV için diğer ilaçlar, ritonavir (Norvir), lamivudin (Epivir, Combivir, Epzicom, Trizivir ve diğerleri), nevirapin (Viramune) ve tipranavir (Aptivus) ile birlikte alınan fosamprenavir (Lexiva) ritonavir (Norvir) ile birlikte alınır; metformin (Glumetza, Glucophage, Riomet); metadon (Dolophine, Metadose); okskarbazepin (Oxtellar XR, Trileptal); fenobarbital; fenitoin (Dilantin, Fenitek); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); ve sorbitol veya sorbitol içeren ilaçlar. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
- Alüminyum, magnezyum veya kalsiyum içeren antasitler, laksatifler veya multivitaminler alıyorsanız; kalsiyum takviyeleri; demir takviyeleri; sukralfat (Carafate); veya tamponlu aspirin gibi tamponlu ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 6 saat sonra abakavir, dolutegravir ve lamivudin alın.
- Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin. Abacavir, dolutegravir ve lamivudin alırken sarı kantaron almamalısınız.
- Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size abakavir, dolutegravir ve lamivudin almamanızı söyleyecektir.
- sigara veya alkol kullanıyorsanız veya yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya kalp veya böbrek hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmanız gerekecektir. Abacavir, dolutegravir ve lamivudin kullanırken hamile kalmamalısınız. Tedaviniz sırasında kullanabileceğiniz etkili doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Abacavir, dolutegravir ve lamivudin kullanırken hamile kalırsanız hemen doktorunuzu arayın. Dolutegravir fetüse zarar verebilir.

- emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. HIV ile enfekte iseniz veya abakavir, dolutegravir ve lamivudin kullanıyorsanız emzirmemelisiniz.
- abakavir, dolutegravir ve lamivudin alırken alkollü içeceklerin ve alkol içeren ilaçların güvenli kullanımı hakkında doktorunuza danışın.
- HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için ilaç alırken, bağışıklık sisteminizin güçlenebileceğini ve halihazırda vücudunuzda bulunan diğer enfeksiyonlarla savaşmaya başlayabileceğini bilmelisiniz. Bu, bu enfeksiyonların semptomlarını geliştirmenize neden olabilir. Abacavir, dolutegravir ve lamivudin ile tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda yeni veya kötüleşen semptomlar yaşarsanız, doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilenleri yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

- aşırı yorgunluk; halsizlik, baş dönmesi veya baş dönmesi; hızlı veya düzensiz kalp atışı; kas ağrısı; mide bulantısı ve kusma ile mide ağrısı; nefes darlığı veya nefes almada zorluk; ateş, titreme veya öksürük gibi grip benzeri semptomlar; veya özellikle kollarda veya bacaklarda üşüme hissi
- açık renkli bağırsak hareketleri; cilt veya gözlerin sararması; iştah kaybı; olağandışı kanama veya morarma; koyu sarı veya kahverengi idrar; veya midenin sağ üst kısmında ağrı

Abacavir, dolutegravir ve lamivudin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz. (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Kurutucuyu (nemi emmek için ilaçla birlikte verilen küçük paket) şişenizden çıkarmayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin.

ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun – yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Elinizde bir miktar abakavir, dolutegravir ve lamivudin bulundurun. Reçetenizi tekrar doldurmak için ilaçlarınızın bitmesini beklemeyin.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- triumeq®

Son Revize - 05/15/2020

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022