Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617015.html

Abacavir, dolutegravir en lamivudine

uitgesproken als (a bak' a vir) (doe" loo teg' ra vir) (la miv' ue deen)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Abacavir, dolutegravir en lamivudine kunnen een ernstige of levensbedreigende allergische reactie veroorzaken. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u één symptoom uit twee of meer van de volgende groepen krijgt om te zien of u moet stoppen met het gebruik van abacavir, dolutegravir en lamivudine:

- Groep 1: koorts
- Groep 2: uitslag
- Groep 3: misselijkheid, braken, diarree of pijn in de maagstreek
- Groep 4: algemeen ziek gevoel, extreme vermoeidheid of pijn
- Groep 5: kortademigheid, hoesten of keelpijn

Bel ook onmiddellijk uw arts als u een van de volgende symptomen ervaart: hoofdpijn; spier- of gewrichtspijn; zwelling van het gezicht, handen, voeten, enkels of onderbenen; pijn, branderigheid of tintelingen in de handen of voeten; jeuk; blaarvorming of vervelling van de huid; moeite met slikken of ademen; rode, gezwollen, jeukende of tranende ogen; of zweren in de mond.

Uw apotheker zal u een waarschuwingskaart geven wanneer u uw medicatie ontvangt om mee te nemen. De waarschuwingskaart bevat de groepen symptomen die hierboven zijn opgesomd, zodat u en de mensen om u heen gemakkelijk kunnen herkennen of u een allergische reactie heeft. Zorg ervoor dat u deze Waarschuwingskaart altijd bij u draagt.

Sommige mensen hebben een grotere kans op een allergische reactie op abacavir, dolutegravir en lamivudine op basis van hun erfelijkheid of genetische samenstelling. Uw arts kan een genetische laboratoriumtest bestellen voordat u begint met abacavir, dolutegravir en lamivudine of als u niet eerder bent getest om te bepalen of u een grotere kans heeft op een allergische reactie op dit medicijn. Vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor abacavir, dolutegravir en lamivudine of voor andere geneesmiddelen die abacavir of dolutegravir bevatten, of als u weet dat u die specifieke genetische samenstelling heeft. Als u ooit eerder een allergische reactie heeft gehad op abacavir (in Epzicom, in Trizivir, Ziagen) of dolutegravir (Tivicay) of enig ander medicijn dat abacavir of dolutegravir bevat, zal uw arts u waarschijnlijk vertellen geen abacavir, dolutegravir en lamivudine te gebruiken.

dolutegravir en lamivudine of een geneesmiddel dat weer abacavir of dolutegravir bevat. Als u om een andere reden stopt met het innemen van abacavir, dolutegravir en lamivudine, zoals het missen van meerdere doses achter elkaar of het opraken van medicatie, begin dan niet opnieuw met het innemen ervan zonder eerst met uw arts te overleggen. U moet in de buurt zijn van mensen die, indien nodig, medische noodhulp kunnen bieden of bellen wanneer u dit medicijn opnieuw start.

Vertel het uw arts als u een infectie met het hepatitis B-virus (HBV; een aanhoudende leverinfectie) of een infectie met het hepatitis C-virus (HCV; een aanhoudende leverinfectie) heeft of denkt te hebben. Als u HBV heeft en abacavir, dolutegravir en lamivudine gebruikt, kan uw toestand plotseling verslechteren als u stopt met het gebruik van abacavir, dolutegravir en lamivudine. Uw arts zal u onderzoeken en enkele maanden nadat u stopt met het gebruik van abacavir, dolutegravir en lamivudine regelmatig laboratoriumtests bestellen om te zien of uw HBV is verergerd.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde tests bestellen om de reactie van uw lichaam op abacavir, dolutegravir en lamivudine te controleren.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint met de behandeling met abacavir, dolutegravir en lamivudine en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook de website van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van abacavir, dolutegravir en lamivudine.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

De combinatie van abacavir, dolutegravir en lamivudine wordt alleen of samen met andere medicijnen gebruikt om een hiv-infectie te behandelen bij bepaalde volwassenen en kinderen die ten minste 40 kg wegen. Abacavir en lamivudine zitten in een klasse van geneesmiddelen die nucleoside-analoge reverse transcriptaseremmers (NRTI's) worden genoemd en dolutegravir zit in een klasse van medicijnen die integrase-strengtransferremmers (INSTI's) worden genoemd. Ze werken door de hoeveelheid hiv in uw bloed te verminderen en het aantal immuuncellen te verhogen die infecties in uw lichaam helpen bestrijden. Hoewel abacavir, dolutegravir en lamivudine hiv niet genezen, kunnen deze medicijnen uw kans op het ontwikkelen van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids) en hiv-gerelateerde ziekten zoals ernstige infecties of kanker verkleinen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

De combinatie van abacavir, dolutegravir en lamivudine wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal daags met of zonder voedsel ingenomen. Neem abacavir, dolutegravir en lamivudine elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel zorgvuldig op en vraag uw arts of

apotheker om elk onderdeel dat u niet begrijpt uit te leggen. Neem abacavir, dolutegravir en lamivudine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Abacavir, dolutegravir en lamivudine helpen de hiv-infectie onder controle te houden, maar genezen deze niet. Blijf abacavir, dolutegravir en lamivudine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van abacavir, dolutegravir en lamivudine zonder met uw arts te overleggen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u abacavir, dolutegravir en lamivudine inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor abacavir, dolutegravir en lamivudine, voor andere medicijnen of voor één van de bestanddelen in tabletten abacavir, dolutegravir en lamivudine. Vraag uw apotheker of raadpleeg de Medicatiegids voor een lijst van de ingrediënten.
- vertel het uw arts als u dofetilide (Tikosyn) gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen abacavir, dolutegravir en lamivudine te gebruiken als u dit medicijn gebruikt.
- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, andere); dalfampridine (Ampyra); andere medicijnen tegen hiv, waaronder abacavir (in Epzicom, in Trizivir, Ziagen), dolutegravir (Tivicay), efavirenz (Sustiva, in Atripla), emtricitabine (Emtriva, in Atripla, in Complera, in Truvada, anderen), etravirine (Intelence), fosamprenavir (Lexiva) ingenomen met ritonavir (Norvir), lamivudine (Epivir, in Combivir, in Epzicom, in Trizivir, anderen), nevirapine (Viramune) en tipranavir (Aptivus) ingenomen met ritonavir (Norvir); metformine (Glumetza, Glucophage, Riomet); methadon (Dolophine, Methadose); oxcarbazepine (Oxtellar XR, Trileptal); fenobarbital; fenytoïne (Dilantin, fenytek); rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater); en sorbitol of medicijnen die sorbitol bevatten. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
- als u maagzuurremmers, laxeermiddelen of multivitaminen gebruikt die aluminium, magnesium of calcium bevatten; calciumsupplementen; ijzersupplementen; sucralfaat (Carafaat); of gebufferde medicijnen zoals gebufferde aspirine, neem abacavir, dolutegravir en lamivudine ten minste 2 uur vóór of 6 uur nadat u deze medicijnen heeft ingenomen.
- vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid. U mag geen sint-janskruid gebruiken terwijl u abacavir, dolutegravir en lamivudine gebruikt.
- vertel het uw arts als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen abacavir, dolutegravir en lamivudine te gebruiken.
- vertel het uw arts als u rookt of alcohol drinkt, of als u een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, diabetes of hart- of nierziekte heeft of ooit heeft gehad.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U moet een zwangerschapstest doen voordat u met de behandeling begint. U mag niet zwanger worden terwijl u abacavir, dolutegravir en lamivudine gebruikt. Praat met uw arts over effectieve anticonceptiemethoden die u tijdens uw behandeling kunt gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u abacavir, dolutegravir en lamivudine gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Dolutegravir kan de foetus schaden.

- vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven als u geïnfecteerd bent met hiv of als u abacavir, dolutegravir en lamivudine gebruikt.
- vraag uw arts naar het veilige gebruik van alcoholische dranken en medicijnen die alcohol bevatten terwijl u abacavir, dolutegravir en lamivudine gebruikt.
- u moet weten dat terwijl u medicijnen gebruikt om een hiv-infectie te behandelen, uw immuunsysteem sterker kan worden en andere infecties die al in uw lichaam aanwezig waren, kan gaan bestrijden. Dit kan ertoe leiden dat u symptomen van die infecties ontwikkelt. Als u op enig moment tijdens uw behandeling met abacavir, dolutegravir en lamivudine nieuwe symptomen krijgt of deze verergeren, vertel dit dan aan uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, of de symptomen die worden genoemd in het gedeelte BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag een medische spoedbehandeling:

- overmatige vermoeidheid; zwakte, duizeligheid of duizeligheid; snelle of onregelmatige hartslag; spierpijn; maagpijn met misselijkheid en braken; kortademigheid of moeite met ademhalen; griepachtige symptomen zoals koorts, koude rillingen of hoesten; of het koud hebben, vooral in de armen of benen
- lichtgekleurde stoelgang; geel worden van de huid of ogen; verlies van eetlust; ongewone bloedingen of blauwe plekken; donkergele of bruine urine; of pijn in de rechterbovenhoek van de maag

Abacavir, dolutegravir en lamivudine kunnen andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Verwijder het droogmiddel (klein pakje meegeleverd met medicatie om vocht op te nemen) niet uit uw fles.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, altijd de veiligheidsdoppen vergrendelen

en plaats de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats - een die omhoog en weg is en buiten hun zicht en bereik.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Houd een voorraad abacavir, dolutegravir en lamivudine bij de hand. Wacht niet tot uw medicatie op is om uw recept bij te vullen.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Triumeq®

Laatst herzien - 15-05-2020

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022