TITLE - ABACAVIR / ZIAGEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Institutes of Health

Ontvang de laatste informatie over de volksgezondheid van CDC

Informatie over medicijnen

Uitspreken: Abacavir

Merknaam: Ziagen

Andere namen:ABC, abacavirsulfaat

Geneesmiddelklasse: Nucleoside reverse transcriptase-remmer (NRTI's)

Medicijnafbeelding(en): (Klik om te vergroten)

Wat zijn de belangrijkste dingen om te weten over abacavir?

Abacavir kan ernstige, levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Deze omvatten allergische reacties, een opeenhoping vanmelkzuurin het bloed (lactaatacidose), enleverproblemen.

Mensen die abacavir gebruiken, kunnen een ernstige allergische reactie krijgen (overgevoeligheidsreactie) die de dood kan veroorzaken. Uw risico op deze allergische reactie is veel groter als u eengenvariant genaamd HLA-B*5701. Uw zorgverlener kan met een bloedtest bepalen of u deze genvariatie heeft.

Als u symptomen krijgt van twee of meer van de volgende groepen terwijl u abacavir gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw zorgverzekeraar om te weten te komen of u moet stoppen met het gebruik van abacavir.

*Groep 1 Symptomen:*Koorts

*Groep 2 Symptomen:*Uitslag

*Groep 3 Symptomen:*Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn (buikpijn)

*Groep 4 Symptomen:*Algemeen ziek gevoel, extreme vermoeidheid of pijn

*Groep 5 Symptomen:*Kortademigheid, hoesten, keelpijn

Uw apotheker zal u een waarschuwingskaart geven met een lijst van deze symptomen.**Draag deze Waarschuwingskaart altijd bij u.**

Als u stopt met het innemen van abacavir vanwege een allergische reactie, neem dan nooit meer abacavir of een ander abacavir-bevattend geneesmiddel in.(Deze combinatie van hiv-geneesmiddelen bevatten ook abacavir: abacavir/lamivudine [merknaam:Epzicom], abacavir/lamivudine/zidovudine [merknaam: Trizivir] en abacavir/dolutegravir/lamivudine [merknaam:Triumeq])

Als u abacavir of een ander abacavir-bevattend geneesmiddel opnieuw inneemt nadat u een allergische reactie op abacavir heeft gehad, kunt u binnen enkele uren**levensbedreigende symptomen**dat kan omvatten:**zeer lage bloeddruk of overlijden**.

Als u om een andere reden stopt met het innemen van abacavir, zelfs voor een paar dagen, en u bent niet allergisch voor abacavir, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar voordat u het opnieuw inneemt. Het opnieuw innemen van abacavir kan een ernstige allergische of levensbedreigende reactie veroorzaken, zelfs als u er nooit eerder een allergische reactie op heeft gehad.**Als uw zorgverlener u vertelt dat u abacavir weer kunt gebruiken, begin dan met het innemen wanneer u in de buurt bent van medische hulp of mensen die een zorgverlener kunnen bellen als u er een nodig heeft.**

Neem onmiddellijk contact op met uw zorgverzekeraar als u een van de volgende symptomen heeft die kunnen wijzen op lactaatacidose:

Zwakte of vermoeidheid

Ongewone spierpijn

Kortademigheid of snelle ademhaling

Maagpijn met misselijkheid en braken

Koude of blauwe handen en voeten

Duizeligheid of licht gevoel in het hoofd

Snelle of abnormale hartslag

Neem onmiddellijk contact op met uw zorgverzekeraar als u een van de volgende symptomen heeft die op leverproblemen kunnen wijzen:

Geel worden van uw huid of het wit van uw ogen (geelzucht)

Donkergekleurde urine

Lichtgekleurde stoelgang

Verlies van eetlust gedurende meerdere dagen of langer

Misselijkheid of braken

Pijn, pijn of gevoeligheid aan de rechterkant van uw maag/buikgebied

jeuk

Tijdens het gebruik van abacavir is het belangrijk om al uw afspraken met uw zorgverzekeraar na te komen.

Wat is abacavir?

Abacavir (merknaam: Ziagen) is een receptgeneesmiddel dat is goedgekeurd door de VSFood and Drug Administration(FDA) voor de behandeling van HIVinfectiebij volwassenen, kinderen en zuigelingen. Abacavir wordt altijd gebruikt in combinatie met andere hiv-geneesmiddelen.

Voor meer informatie over het gebruik van abacavir bij mensen met hiv, zie de*Richtlijnen voor het gebruik van antiretrovirale middelen bij volwassenen en adolescenten die leven met hiv*en de*Richtlijnen voor het gebruik van antiretrovirale middelen bij pediatrische hiv-infectie.*

Hiv-medicijnen kunnen hiv/aids niet genezen, maar het dagelijks innemen van hiv-medicijnen helpt mensen met hiv langer en gezonder te leven. Hiv-medicijnen verminderen ook het risico op hivoverdragen. Als u hiv-geneesmiddelen gebruikt, moet u deze niet minderen, overslaan of stoppen, tenzij uw zorgverlener u dat zegt.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik abacavir inneem?

Vertel uw zorgverlener voordat u abacavir inneemt:

Als u allergisch bent voor abacavir of voor andere geneesmiddelen.

Als u bent getest en weet of u een bepaalde genvariant heeft, genaamd HLA-B*5701.

Als u leverproblemen heeft of heeft gehad, waaronder:hepatitis B-virusinfectie(HBV) ofhepatitis C-virusinfectie(HCV).

Als u hartproblemen heeft, rookt of ziekten heeft die het risico op hartaandoeningen verhogen, zoals: hoge bloeddruk, hoogcholesterol, ofsuikerziekte.

Als u alcohol drinkt of medicijnen gebruikt die alcohol bevatten.

Als u andere medische aandoeningen heeft.

Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Praat met uw zorgverzekeraar over de risico's en voordelen van het gebruik van abacavir tijdens de zwangerschap. Voor meer informatie over het gebruik van abacavir tijdens de zwangerschap, zie de:*Aanbevelingen voor het gebruik van antiretrovirale geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en interventies om perinatale HIV-overdracht in de Verenigde Staten te verminderen.*

Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Voor vrouwen met hiv in de Verenigde Staten is de Richtlijnraadt borstvoeding af. Voordat uw baby wordt geboren, of als u al borstvoeding geeft, moet u met uw zorgverlener praten om alternatieve opties voor het voeden van uw baby te bespreken.

Als u gebruik maakt vanhormoon-gebaseerde anticonceptie (zoals pillen, implantaten of vaginale ringen). Voor meer informatie over gelijktijdig gebruik van anticonceptie en hiv-medicijnen, bekijk de hivinfoHIV en anticonceptieinfografisch.

Over andere geneesmiddelen op recept en zonder recept, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten die u gebruikt of van plan bent te gebruiken. Abacavir kan de werking van andere geneesmiddelen of producten beïnvloeden, en andere geneesmiddelen of producten kunnen de werking van abacavir beïnvloeden.**Het gebruik van abacavir samen met bepaalde geneesmiddelen of producten kan ernstige bijwerkingen veroorzaken.**

Hoe moet ik abacavir gebruiken?

Abacavir is er in de volgende vormen en sterktes:

300 mg tabletten

20 mg/ml drank (een vloeistof met aardbei-banaansmaak beschikbaar voor zuigelingen, kinderen en volwassenen die geen tabletten kunnen doorslikken)

Neem abacavir in volgens de instructies van uw zorgverzekeraar. Mis geendosisvan abacavir, en verander uw dosis niet of stop niet met het gebruik van abacavir zonder eerst met uw zorgverlener te overleggen.

Neem abacavir via de mond in met of zonder voedsel.

Als uw kind abacavir krijgt voorgeschreven, zal de zorgverlener van uw kind de juiste dosis abacavir bepalen op basis van het gewicht van uw kind. De zorgverlener zal ook beslissen of uw kind de tablet- of vloeibare vorm van abacavir moet nemen.

Gebruik abacavir altijd in combinatie met andere hiv-geneesmiddelen.

Als u te veel abacavir heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw zorgverzekeraar of plaatselijk antigifcentrum (1-800-222-1222), of ga naar de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling van het ziekenhuis.

Voor meer informatie over hoe u abacavir moet gebruiken, zie deFDA-medicijnlabel.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Als u een dosis abacavir bent vergeten, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem uw volgende dosis gewoon op het normale tijdstip in. Neem geen twee doses tegelijk om een vergeten dosis in te halen.

Welke bijwerkingen kan abacavir veroorzaken?

Abacavir kan bijwerkingen veroorzaken. Sommige bijwerkingen van abacavir kunnen ernstig zijn, zoals hierboven vermeld. Veel bijwerkingen van hiv-medicatie, zoals misselijkheid of af en toe duizeligheid, zijn beheersbaar. Zie de HIVinfo-factsheet overHIV-medicijnen en bijwerkingenvoor meer informatie.

Andere mogelijke bijwerkingen van abacavir zijn onder meer:

Wijzigingen in uwimmuunsysteem(genaamdimmuunreconstitutie inflammatoir syndroomof IRIS). IRIS is een aandoening die soms optreedt wanneer het immuunsysteem begint te herstellen na behandeling met een hiv-medicijn. Naarmate het immuunsysteem sterker wordt, kan het een verhoogde respons hebben op een eerder verborgen infectie.

Verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct).

Vertel het uw zorgverzekeraar als u een bijwerking heeft die u hindert of die niet weggaat.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van abacavir. Voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen van abacavir, lees demedicijn etiketofbijsluiter:of praat met uw zorgverzekeraar of apotheker.

U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) ofonline.

Hoe moet abacavir worden bewaard?

Bewaar abacavir-tabletten bij kamertemperatuur, 20 °C tot 25 °C (68 °F tot 77 °F).

Abacavir drank kan worden gekoeld of bewaard bij kamertemperatuur. Vries abacavir drank niet in.

Bewaar abacavir in de container waarin het is geleverd en houd de container goed gesloten.

Gebruik abacavir niet als de originele verzegeling over de opening van de container verbroken is of ontbreekt.

Gooi abacavir weg dat niet langer nodig is of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken (verouderd). VolgenFDA-richtlijnenover het veilig weggooien van ongebruikte geneesmiddelen.

Houd abacavir en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Waar kan ik meer informatie vinden over abacavir?

Voor meer informatie over het gebruik van abacavir bij mensen met hiv, zie de*Richtlijnen voor het gebruik van antiretrovirale middelen bij volwassenen en adolescenten die leven met hiv*en de*Richtlijnen voor het gebruik van antiretrovirale middelen bij pediatrische hiv-infectie*.

Deze samenvatting van het geneesmiddel voor de patiëntversie is gebaseerd op de volgende FDA-label(s): Oplossing, tablet (filmomhuld). Het gedeelte Patiëntenadvies op het etiket bevat informatie voor mensen die abacavir gebruiken.

Abacavir-gerelateerdonderzoeksstudies, van*ClinicalTrials.gov*

Een lijst vanFDA-goedgekeurde hiv-medicijnen, van HIVinfo.

Fabrikantinformatie:

ViiV Gezondheidszorg

Hoofdnummer: 877-844-8872
Patiëntenbijstand (ViiV Connect): 844-588-3288

Laatst beoordeeld: 7 januari 2022

Afdrukken

Patiëntversie:HTML

FDA-label: oplossing, tablet (filmomhuld)PDF