

Source : Medicines Org UK

**סינתרום® 1 מ"ג טבליות Acenocoumarol**  
**חשוב עבורך קרא בעיון את כל העלון הזה לפני שתתחיל ליטול את התרופה מכיוון שהוא מכיל מידע**  
קח תמיד את התרופה בדיוק כפי שמתואר בעלון זה או כפי שהרופא או הרוקח אמרו לך.

- שמור עלון זה. ייתכן שתצטרך לקרוא אותו שוב.
- אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא או הרוקח.
- תרופה זו נרשמה עבורך בלבד. אל תעביר את זה לאחרים. יכול להיות
- להזיק להם, גם אם סימני המחלה שלהם זהים לשלך.
- אם אתה מקבל תופעות לוואי כלשהן, שוחח עם הרופא או הרוקח שלך. זה כולל כל תופעות לוואי אפשריות שאינן מופיעות בעלון זה. ראה סעיף 4.

## מה יש בעלון זה

1. מהו סינתרום ולמה הוא משמש
2. מה עליך לדעת לפני נטילת סינתרום
3. כיצד לקחת סינתרום
4. תופעות לוואי אפשריות
5. כיצד לאחסן סינתרום
6. תוכן החבילה ומידע נוסף

### 1. מהו סינתרום ולמה הוא משמש

שייכת לקבוצת תרופות הנקראות נוגדי קרישה (תרופות לדילול דם  
(acenocoumarol) (Sinthrome 1 mg Tablets)

סינתרום משמש לטיפול ומניעה של קרישי דם החוסמים את כלי הדם, למשל פקקת ורידים עמוקים (DVT).

סינתרום אינו ממיס קרישי דם שכבר נוצרו אך הוא עלול לעצור את הגדלת הקרישים ולגרום לבעיות חמורות יותר.

### 2. מה שאתה צריך לדעת לפני שאתה לוקח Sinthrome

בצע את כל הוראות הרופא בקפידה. הם עשויים להיות שונים מהמידע הכללי הכלול בעלון זה.

- **אל תיקח סינתרום אם אתה:** הם אלרגיים (רגישים יתר) לאצנוקומרול, או תרופות דומות לדילול הדם הנקראות נגזרות קומרין (למשל וורפרין, פנפרוקומון), או לכל אחד מהמרכיבים בסינתרום (ראה סעיף 6, תוכן האריזה ומידע נוסף)
- נמצאים בהריון, מתכננים להיכנס להריון או מניקים (ראה הריון, הנקה ופוריות).
- הם אלכוהוליסטים
- יש מחלת נפש כלשהי, למשל, סכיזופרניה או דמנציה

- עברו לאחרונה, או עומדים לעבור ניתוח בעמוד השדרה, במוח, בעיניים או בכל ניתוח גדול
- עבר אירוע מוחי שנגרם על ידי דימום לתוך המוח שלך
- סובלים מלחץ דם גבוה מאוד
- יש לך כיב קיבה או כל דימום מעי
- להעביר דם למים או להשתעל דם
- סובלים מהפרעות דימום כלשהן, בעיות דימום או חבלות בלתי מוסברות
- מרגיש כאב חד במרכז החזה או בצד שמאל של החזה שעלול להיות מלווה בקוצר נשימה (אלה עשויים להיות סימנים של הצטברות נוזלים או דלקת סביב הלב הנקראת פריקרדיטיס) או אם אתה חווה תסמינים דמויי שפעת, אוושה בלב, פריחה וכאבים בחזה (אלה עשויים להיות סימנים של זיהום בדופן הפנימית של הלב הנקרא אנדוקרדיטיס)
- יש לנתק המחלת כבד או כליות.

אם אחד מהדברים לעיל חל עליך, או אם אינך בטוח, שוחח עם הרופא או הרוקח לפני נטילת סינתרום.

### אזהרות ואמצעי זהירות

- שוחח עם הרופא או הרוקח לפני נטילת טבליות סינתרום. לפני נטילת Sinthrome ספר לרופא או לרוקח אם אתה:
- יש סרטן
  - יש זיהום או דלקת (נפיחות)
  - יש הפרעה המשפיעה על ספיגת המזון מהקיבה ו/או המעי
  - יש אי ספיקת לב (הגורמת לנפיחות ולקוצר נשימה) - זה עלול להפחית את זרימת הדם בכבד, אשר בתורו יפחית את קרישת הדם
  - יש בעיות כבד - זה עלול להפחית את קרישת הדם
  - יש בעיות בכליות - זה עלול להוביל להצטברות של תוצרי הפירוק של סינתרום
  - יש פעילות יתר של בלוטת התריס
  - הם קשישים
  - סובלים מהפרעת דם כמו חלבון C או מחסור בחלבון S - זה יגרום לדימום ארוך מהרגיל לאחר חתך או פציעה.
  - יש לך סיכון גבוה יותר לדימום, למשל אם יש לך:
    - היסטוריה של תוצאות בדיקות דם משתנות עבור היחס הבינלאומי המנורמל (INR)
    - כיב בקיבה או בתריסריון או שהיה לי אי פעם כזה
    - לחץ דם גבוה
    - בעיות במחזור הדם למוח (מחלת כלי דם במוח)
    - אִנְמִיָה
    - פצע או פציעה לאחרונה
    - נוטל כל אחת מהתרופות המוזכרות להלן או נוטל סינתרום במשך תקופה ארוכה

אתה לא אמור לקבל זריקות כלשהן לשרירים שלך בזמן שאתה נוטל סינתרום.

אם אתה זקוק לזריקות כלשהן לעמוד השדרה שלך או כחלק מסריקה או בדיקת רנטגן או אם אתה זקוק לניתוח קל, כולל ניתוח שיניים, הקפד לדון תחילה בטיפול שלך עם הרופא שלך.

אם אתה מעורב בתאונה בזמן השימוש בסינתרום, אתה צפוי לדמם יותר מהרגיל. יש ליידע את הרופא או צוות בית החולים שאתה נוטל סינתרום **מיד**. נשא תמיד את כרטיס הנוגד קרישה האישי שלך (תעודת זיהוי מהרוקח המציינת שאתה משתמש בתרופה זו).

קלציפיליקסיס, מצב שבו מצטבר סידן בכלי דם בעור, קורה לפעמים כאשר חולים נוטלים תרופות לדילול דם כולל סינתרום. זה נדיר, אבל זה גורם לגושים או כיבים בעור כואבים שעלולים להוביל לזיהום חמור ולמוות. זה בדרך כלל קורה רק אם לאדם יש מחלת כליות חמורה, או אם כבר יש לו משהו לא בסדר עם רמות הסידן, אלבומין, פוספט או חלבונים מסוימים בדם.

אם אחד מהדברים לעיל חל עליך, או אם אינך בטוח, שוחח עם הרופא או הרוקח לפני נטילת סינתרום.

### **תרופות אחרות וסינתרום**

ספר לרופא או לרוקח אם אתה נוטל או נטלת לאחרונה או עשוי ליטול תרופות אחרות כלשהן, כולל תרופות המתקבלות ללא מרשם (ללא מרשם). זה חל במיוחד על התרופות הבאות מכיוון שהן עלולות להפריע לסינתרום:

### **תרופות המגבירות את פעילות סינתרום כגון:**

- הפריין (כולל צורה מעשה ידי אדם בשם הפריין בעל משקל מולקולרי נמוך) - לדילול הדם בטיפול בפקקת ורידים עמוקים, קרישי דם או לאחר ניתוח
- אנטיביוטיקה (למשל קלינדמיצין)
- חומצה סליצילית וחומרים נלווים (למשל חומצה אצטיל סליצילית, חומצה אמינוסליצילית, דיפלוניסל) (תרופה המשמשת נגד כאב)
- תרופות שעוצרות טסיות דם (אלה חלקיקים בדם המעורבים בקרישת הדם) מלהתקבץ יחד (למשל דיפירידמול, קלופידוגרל, טיקלופידין)
- פנילבוטזון או נגזרות אחרות של פירזולון (למשל סולפינפירזון), תרופות אנטי דלקתיות אחרות שאינן סטרואידיות (אלה משמשות להפחתת כאב, חום ודלקת), כולל אלו המכוונות למולקולה ספציפית בשם COX-2, למשל, celecoxib, methylprednisolone (זה מוזרק לפעמים לווריד במינון גבוה לטיפול במצבים דלקתיים או אלרגיים שונים).

כאשר רושמים סינתרום בשילוב עם תרופות אלו, יהיה צורך במעקב תכוף יותר (כולל בדיקות דם).

### **תרופות אחרות העלולות להגביר את פעילות סינתרום כגון:**

- אלופורינול או סולפינפירזון - לטיפול בגאווט ולהורדת רמות חומצת שתן
- סטרואידים אנבוליים - משמשים כטיפול חלופי
- אנדרוגנים כגון טסטוסטרון ומסטרולון - משמשים כטיפול חלופי
- תרופות נגד הפרעות קצב כמו אמיודרון וקינידין - תרופות לטיפול בקצב לב לא סדיר
- אנטיביוטיקה (למשל אריתרומיצין, קלריתרמיצין, טטרציקלינים, ניומיצין, כלורמפניקול, אמוקסיצילין, קומוקסיקל, חלק מהצפלוספורינים, חלק מהפלוואורוקווינולונים כגון ציפרלקס, נורפלוקסצין ואופלוקסצין) - תרופות המשמשות נגד זיהומים
- וילוקסזין וסרוטונין סלקטיבי מחדש
- כלופיברט וחומרים נלווים (למשל פנופיברט, גמפיברוזיל) - תרופות המשמשות נגד כולסטרול גבוה
- לתלות באלכוהול - disulfiram
- חומצה אטקרינית - לאגירת מים או לחץ דם גבוה
- גלוקגון - משמש לטיפול ברמות סוכר נמוכות בדם
- נגזרות של אימידאזול (למשל מטרונידזול, ואפילו במתן מקומי, כמו אקונאזול, פלוקונאזול, קטוקונאזול ומיקונאזול) - תרופה המשמשת נגד זיהום
- טרמדול - משכך כאבים חזק
- טמוקסיפן - לסרטן השד ולפוריות
- מעכבי משאבת פרוטון (למשל אומפרזול) - משמש לטיפול ברפלקס חומצי, קיבה או כיבים במעי

- מעכבי ספיגה כגון ציטלופרם, פלווקסטין, סרטורלין ופרוקסטין - משמשים לטיפול בחרדה ודיכאון
- אקמול - תרופה המשמשת לכאב
- סולפנאמידים כגון קו-טרימוקסזול - משמשים לטיפול בזיהומים
- סולפונילאוריאה כגון טולבוטמיד, כלורפרומיד וגליבנקלמיד - תרופות דרך הפה לסוכרת
- הורמוני בלוטת התריס כגון לבותירוקסין או דקסטרותירוקסין - משמשים לטיפול תת פעילות בלוטת התריס
- סטטינים כגון atorvastatin, fluvastatin ו-1 simvastatin - משמשים להורדת דם רמות כולסטרול
- תרופות אנטי-נאופלסטיות כגון 5-fluorouracil - לסרטן השד, מערכת העיכול וסרטן העור
- ח2-אגוניסטים כגון סימטידין או רניטידין - משמשים לטיפול בכיבים בקיבה או במעי
- מפעילי פלסמינוגן (למשל אורוקינאז; סטרפטוקינאז ואלטפלז, מעכבי תרומבין) (למשל ארגאטרובן) - תרופות המשמשות לפירוק קרישי דם במהלך שבץ לב.
- סוכנים פרוקינטיים (למשל ציספריד) -תרופות המשמשות להאצת ריקון הקיבה
- נוגדי חומצה (למשל מגנזיום הידרוקסיד) - תרופות המשמשות נגד חומציות הקיבה.
- גלוקוזאמין (עבור דלקת מפרקים ניוונית) עשוי להגביר את ההשפעה של סינתרום.

#### תרופות שעשויות להפחית את ההשפעה של סינתרום כגון:

- משמש לטיפול בסרטן או - aminoglutethimide • תסמונת קושינג
- מרקפטופורין - משמש לטיפול בסרטן או במחלות אוטואימוניות (סוג של מחלות כאשר המערכת החיסונית שלך תוקפת את התאים שלך)
- מעכבי פרוטאז כגון ritonavir או nelfinavir - משמשים לטיפול ב-HIV
- משמש לאחר השתלת איברים או למחלות דלקתיות ומחלות אוטואימוניות כרוניות - azathioprine
- ברביטורטים כגון נתן אמיטל או פנוברביטל וקרמזפין - לטיפול באפילפסיה או כדי לעזור לך לישון
- ויטמין E
- תרופות ידועות כמגבירות את הפעילות של אנזימי כבד מסוימים (כלומר, CYP2C19, CYP2C9 או CYP3A4) - שאל את הרופא או הרוקח אם אינך בטוח אם לאף אחת מהתרופות שלך יש השפעה כזו.
- אמצעי מניעה דרך הפה כגון פמודן, לוגינון ו-cilest - למניעת הריון
- תרופה המשמשת נגד זיהום - rifampicin
- תרופות משתנות תיאזיד (למשל, בנדרופלומתיאזיד או מטולזון) - תרופות המשמשות לטיפול באצירת מים ולחץ דם גבוה
- קורטיקוסטרואידים כגון פרדניזולון - סטרואידים המשמשים לטיפול במחלות מעי דלקתיות, דלקת פרקים ומחלות עור מסוימות
- סנט ג'ון וורט - לדיכאון
- כולסטירמין - תרופה המשמשת נגד רמות כולסטרול גבוהות
- משמש לטיפול בזיהומים פטרייתיים - griseofulvin
- תרופות אנטי-נאופלסטיות (למשל אזתיופריין, 6-מרקפטופורין)
- ויטמין K (עלייה בכמות הצריכה של ויטמין K יכולה להפחית את ההשפעה של acenocoumarol)

#### תרופות שעשויות להגביר או להפחית את ההשפעות של סינתרום:

- מעכבי פרוטאז (כגון אינדינביר, נלפינביר, ריטונביר, סקווינאביר) - תרופות המשמשות לטיפול בזיהום ב-HIV.
- קורטיקוסטרואיד המשמש לטיפול במצבים דלקתיים שונים, methylprednisolone.

#### השפעות של סינתרום על תרופות אחרות

- סינתרום עלול להגביר את הסיכון לרעילות על ידי נגזרות הידנטואין כגון פניטואין - תרופות המשמשות לטיפול באפילפסיה.

- סינתרום עשוי לשפר את ההשפעה של הורדת רמת הסוכר בדם של תרופות נגד סוכרת כגון גליבנקלמיד או גלימפיריד.

### **סינתרום עם מזון, שתייה ואלכוהול**

היזהר בעת שתיית אלכוהול מכיוון שהוא עלול להשפיע על האופן שבו סינתרום מדלל את הדם שלך. בדוק תחילה עם הרופא שלך.

עליך להימנע משתיית מיץ חמוציות או נטילת מוצרי חמוציות אחרים, כגון כמוסות או תרכיזים, מכיוון שמשמעות הדבר היא שאינך מקבל את הכמות הנכונה של acenocoumarol.

### **קשיש**

אם אתה בן 65 ומעלה אתה עלול להיות רגיש יותר להשפעות של סינתרום ולכן צריך בדיקות תכופות יותר. ייתכן שתצטרך גם מינונים נמוכים יותר.

### **ילדים ובני נוער**

הניסיון עם סינתרום בילדים ובמתבגרים מוגבל ולכן חולים אלו זקוקים לבדיקות תכופות יותר (ראה סעיף 3).

### **הריון, הנקה ופוריות**

אין ליטול סינתרום אם את בהריון. סינתרום, כמו נוגדי קרישה אחרים, עלול לגרום לנזק חמור לתינוקך. ספר לרופא שלך אם אתה בהריון או מנסה להיכנס להריון. הרופא שלך ידון איתך בסיכון הפוטנציאלי של נטילת סינתרום במהלך ההריון.

יש לשקול היטב את ההחלטה להניק בזמן נטילת סינתרום עם הרופא שלך. אתה וילדך עשויים לדרוש בדיקות דם אם את מניקה בזמן שאת נוטלת סינתרום. עם זאת, כאמצעי זהירות, הרופא שלך צריך לרשום ויטמין K לילדך כדי למנוע את דילול הדם שלו.

לא ידוע אם סינתרום יכול להשפיע על הפוריות שלך.

אם הינך בגיל הפוריות, הרופא שלך עשוי לבצע בדיקת הריון כדי לשלול הריון לפני מתן סינתרום. עליך להשתמש באמצעי מניעה בזמן נטילת סינתרום.

אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת ללדת, שאל את הרופא או הרוקח לייעוץ לפני נטילת התרופה.

### **נהיגה ושימוש במכונות**

לסינתרום אין השפעה על היכולת לנהוג או להשתמש במכונות. עם זאת, מומלץ לשמור את כרטיס נוגדי הקרישה שלך איתך.

### **סינתרום מכיל לקטוז**

אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא או לרוקח לפני נטילת תרופה זו.

## **3. כיצד לקחת סינתרום**

קח תמיד את Sinthrome בדיוק כפי שהרופא שלך אמר לך. בדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

יש ליטול סינתרום כמנה בודדת באותה שעה בכל יום. יש לבלוע את הטבליט בשלמותן עם משקה מים.

הרופא שלך יארגן בדיקות דם סדירות במהלך הטיפול בסינטרום כדי לבדוק באיזו מהירות הדם שלך נקשר. זה יעזור לרופא להחליט על המינון שלך.

המינון של סינתרום ישתנה ממטופל למטופל ומיום ליום. ניתן להשתמש בדברים הבאים כמדריך:

#### **מבוגרים וקשישים:**

המינון ההתחלתי הרגיל הוא בין 2 מ"ג ליום ל-4 מ"ג ליום ללא מתן מנת העמסה. ניתן להתחיל את הטיפול במשטר מינון העמסה, בדרך כלל 6 מ"ג ביום הראשון ואחריו 4 מ"ג ביום השני.

חולים מבוגרים, חולים עם מחלת כבד או אי ספיקת לב חמורה (המאיטה את זרימת הדם בכבד ועלולה לגרום לפציעתו) או חולים עם תת תזונה עשויים להזדקק למינונים נמוכים יותר.

#### **שימוש בילדים ובני נוער:**

הניסיון עם תרופות לדילול דם כולל סינתרום בילדים ובני נוער מוגבל. אם משתמשים ב-Sinthrome בילדים או מתבגרים, יש לבצע בדיקות דם לעתים קרובות יותר כדי לראות עד כמה התרופה פועלת.

ספר לרופא או לרופא השיניים או לרוקח בכל ביקור שאתה משתמש בסינטרום.

#### **אם אתה לוקח יותר סינתרום ממה שאתה צריך**

אם אתה לוקח בטעות יותר מדי טבליות, או שמישהו אחר לוקח את התרופה שלך, עליך לספר לרופא שלך **מידא**ו ליצור קשר עם מחלקת התאונות והמינון הקרובה ביותר. הסימפטומים של מנת יתר שונים בין אנשים. הם עשויים להופיע 1 עד 5 ימים לאחר נטילת התרופה וכוללים דימום מהאף, דימום מהחניכיים, הקאות או שיעול דם, דם בשתן, צואה מזפת דמית או שחורה, דימום איברי המין, דימום וסתי בשפע, חבורות גדולות או דימום לתוך מפרקים שגורמים ללחץ, נפיחות וכאב. פעימות הלב שלך עשויות להאיץ, לחץ הדם שלך עשוי לרדת מה שגורם לך להרגיש סחרחורת, והעור שלך עשוי להיראות חיוור, קר ומיוזע. אתה עלול לחוות מחלה, הקאות, שלשולים וכאבי בטן. ייתכן שתידרש בדיקות דם כדי לעקוב אחר מצבך וייתכן שיידרש טיפול. הצג לרופא את כל התרופות שנתת או את החבילה הריקה.

#### **אם שכחת ליטול סינתרום**

אל תדאג. אם שכחת ליטול מנה, קח אותה בהקדם האפשרי, אלא אם כמעט הגיע הזמן לקחת את המנה הבאה. אין ליטול מנה כפולה. אז תמשיך כמו קודם.

#### **אם תפסיק ליטול סינטרום**

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי השימוש בתרופה זו, שאל את הרופא או הרוקח.

#### **4. תופעות לוואי אפשריות**

כמו כל התרופות, סינתרום עלול לגרום לתופעות לוואי, אם כי לא כולם מקבלים אותן.

ספר לרופא שלך מיד אם יש לך אחת מתופעות הלוואי הבאות:

**משותף** (עשוי להשפיע על עד 1 מכל 10 אנשים):

• **מדמם:**

דימום מהחניכיים, חבורות בלתי מוסברות או דימום מהאף, מחזור כבד, דימום כבד מחתכים או פצעים

דימום מאיברים שונים: קיבה, מעיים, כיס מרה (כאבי בטן), דם הקאות, צואה מדממת או שחורה), דרכי השתן (כאבי גב, דם בשתן), מוח (סחרחורת, כאב ראש חזק, חולשה בזרוע או ברגל, ראייה מטושטשת), ועיניים (שלולית דם גלויה)

**נדיר** (עשוי להשפיע על עד 1 מתוך 1000 אנשים):

- תגובה אלרגית (רגישות יתר) בצורה של כוורות, פריחה בעור, דלקת, גירוד וחום

- אובדן תיאבון
- להרגיש או להיות חולה
- הקאה
- נשירת שיער חריגה

**נדיר מאוד** (עשוי להשפיע על עד 1 מתוך 10,000 אנשים):

- דלקת של כלי דם (וסקוליטיס) שעלולה לגרום לחבלות או דימום מתחת לעור
- נמק עור (מוות של רקמות) עם שלפוחיות בעור עם או בלי צלקות, בדרך כלל באזורי ירכיים, ישבן או שדיים. מצב זה קשור בדרך כלל למחסור מולד של חלבונים מסוימים בדם
- פגיעה בכבד שעלולה לגרום לצהבת, כאבי בטן, נפיחות ועייפות

**תדירות לא ידועה:** פריחה כואבת בעור. סינתרום יכול לגרום למצב עור נדיר חמור הנקרא קלציפילקסיס שיכול להתחיל בפריחה עורית כואבת אך יכול להוביל לסיבוכים רציניים. תגובה שלילית זו מתרחשת לרוב בחולים עם מחלת כליות כרונית אומשהו לא בסדר ברמות הסיידן, האלבומין, הפוספט או חלבונים מסוימים בדם שלהם. מצב של מספר נמוך מהרגיל של תאי דם אדומים או מופחת המוגלובין (אנמיה).

### **דיווח על תופעות לוואי**

אם אתה מקבל תופעות לוואי כלשהן, שוחח עם הרופא או הרוקח שלך. זה כולל כל תופעות לוואי אפשריות שאינן מופיעות בעלון זה. אתה יכול גם לדווח על תופעות לוואי ישירות דרך תוכנית הכרטיס הצהוב בכתובת: [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard) או חפש את MHRA Yellow Card ב-Play Store או Google App Store. על ידי דיווח על תופעות לוואי אתה יכול לעזור לספק מידע נוסף על הבטיחות של תרופה זו.

### **5. כיצד לאחסן סינתרום**

הרחק את התרופה מטווח הראייה וההישג של ילדים. אין ליטול את Sinthrome לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי הקרטון לאחר EXP. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. אם הרופא שלך מחליט להפסיק את הטיפול, החזר כל תרופה שאינה בשימוש לרוקח. שמור אותו רק אם הרופא שלך אומר לך לעשות זאת. אין לזרוק תרופות כלשהן דרך שפכים או פסולת ביתית. שאל את הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאינן משתמש בהן יותר. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

### **6. תוכן החבילה ומידע נוסף**

**מה סינתרום מכיל**  
החומר הפעיל הוא acenocoumarol 1mg. זהו השם החדש לניקומאלון. המרכיב עצמו לא השתנה. שאר חומרי העזר הם: אירוסול 200 (אירוג'ל סיליקה), לקטוז, היפרומלוז, מגנזיום סטארט, עמילן תירס וטלק.

### **איך נראה סינתרום ותכולת האריזה**

טבליות סינתרום הן טבליות לבנות, עגולות ושטוחות עם קצוות משופעים מעט, עם "CG"  
מוטבע בצד אחד ו-"AA" בצד השני. הם מגיעים באריזות שלפוחיות של 100 טבליות.

### **בעל אישור שיווק ויצרן**

#### **בעל אישור שיווק**

Place, Moorhall Road, Harefield,  
Limited, Norgine House, Widewater  
Norgine Pharmaceuticals  
Uxbridge, UB9 6NS, בריטניה.

#### **יצרן**

FAMARAVE  
שדרת אנתוסה 7  
אנתוסה אטיקי, 15344  
יין

#### **יצרן**

Services, SA, Via Complutense, 140,  
Rovi Pharma Industrial  
אלקלה דה הנארס,  
מדריד, 28805,  
ספרד

המידע בעלון זה מתייחס רק לסינטרום. אם יש לך שאלות או שאינך בטוח במשהו, שאל את  
הרופא או הרוקח.

### **עלון זה עודכן לאחרונה ביולי 2020**

Sinthrome הוא סימן מסחרי רשום של Novartis Pharmaceuticals Limited