



[Дом](#) → [Лекарства, травы и добавки](#) → Алискирен

Source : U.S. National Library of Medicine

URL этой страницы: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607039.html>

Алискирен

произносится как (a lis kye' ren)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не принимайте алискирен, если вы беременны. Если вы забеременели во время приема алискирена, немедленно обратитесь к врачу. Алискирен может нанести вред плоду.

зачем назначают это лекарство?

Алискирен используется отдельно или в сочетании с некоторыми лекарствами для лечения высокого кровяного давления. Алискирен относится к классу препаратов, называемых прямыми ингибиторами ренина. Он работает, уменьшая количество определенных природных химических веществ, которые сужают кровеносные сосуды, поэтому кровеносные сосуды расслабляются, и сердце может более эффективно перекачивать кровь.

Высокое кровяное давление является распространенным заболеванием и, если его не лечить, может привести к повреждению головного мозга, сердца, кровеносных сосудов, почек и других частей тела. Повреждение этих органов может вызвать болезни сердца, сердечный приступ, сердечную недостаточность, инсульт, почечную недостаточность, потерю зрения и другие проблемы. Помимо приема лекарств, изменение образа жизни также поможет контролировать артериальное давление. Эти изменения включают в себя диету с низким содержанием жира и соли, поддержание здорового веса, физические упражнения не менее 30 минут в день, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя.

Как следует использовать это лекарство?

Алискирен выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день. Алискирен следует принимать либо всегда во время еды, либо всегда независимо от еды. Принимайте алискирен примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте алискирен точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Ваш врач, вероятно, назначит вам низкую дозу алискирена и может увеличить дозу после того, как вы будете принимать это лекарство в течение как минимум 2 недель.

Алискирен контролирует высокое кровяное давление, но не лечит его. Продолжайте принимать алискирен, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием алискирена, не посоветовавшись с врачом.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать алискирен,

- сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на алискирен, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), такой как беназеприл (лотензин, в Lotrel), каптоприл (Capoten), эналаприл (вазотек, вазеретик), фозиноприл, лизиноприл (в Prinzipid, в Zestoretic), мозексиприл (Univasc, в Uniretic), периндоприл (Aceon), квинаприл (Accupril, в Accuretic, в Quinaretic), рамиприл (Altace) и трандолаприл (Mavik, в Tarka); любые другие лекарства или любые ингредиенты в таблетках алискирена. Спросите своего фармацевта или проверьте информацию о пациенте для получения списка ингредиентов.
- сообщите своему врачу, если у вас диабет (высокий уровень сахара в крови) и вы принимаете блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), такие как азилсартан (Эдарби, Эдарбиклор), кандесартан (Атаканд, в Atacand НСТ), эпросартан (Teveten, в Teveten НСТ), ирбесартан (Авапро, в Авалиде), лозартан (Козаар, в Хизааре), олмесартан (Беникар, в Азоре, Беникар НСТ), телмисартан (Микардис, в Микардис НСТ) и валсартан (Диован, в Диоване НСТ, Эксфорж); или ингибитор АПФ. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать алискирен, если у вас диабет и вы принимаете одно из этих лекарств.
- Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: некоторые противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Sporanox); аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин) и напроксен (Алив, Напросин); аторвастатин (Липитор, Кадузет, Липтрузет); цефекоксиб (Целебрекс); циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун); диуретики («водяные таблетки»), добавки калия или препараты, содержащие калий, а также любые другие лекарства от болезней сердца или высокого кровяного давления. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.
- Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были диабет, судороги, сердечный приступ или сердечная недостаточность или заболевание почек.
- Расскажите своему врачу, если вы планируете забеременеть или кормите грудью. Не кормите грудью, принимая алискирен.
- следует знать, что диарея, рвота, недостаточное употребление жидкости и обильное потоотделение могут вызвать падение артериального давления, что может вызвать головокружение и обмороки. Сообщите своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из этих проблем или они возникнут во время лечения.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Вы должны стараться избегать употребления пищи с высоким содержанием жира (таких как жареная пища или фаст-фуд) при приеме алискирена во время еды. Вы не должны использовать заменители соли, содержащие калий, или принимать добавки калия без предварительной консультации с врачом.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Алискирен может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

- диарея
- боль в животе
- изжога
- кашель
- сыпь
- головокружение
- Головная боль
- боль в спине

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов, прекратите прием алискирена и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

- головокружение и обмороки
- отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней
- волдыри или шелушение кожи
- охриплость
- трудности с глотанием или дыханием
- захват
- медленное, слабое или нерегулярное сердцебиение

Алискирен может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной). Не удаляйте осушитель (влагопоглотитель) из бутылки, если он был предоставлен.

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной утилизации лекарственных средств (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) для получения дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — вверх, подальше, вне поля их зрения и досягаемости.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

п экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в Интернете по адресу <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

- обморок
- головокружение
- затуманенное зрение
- тошнота

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить лабораторные анализы, чтобы проверить реакцию вашего организма на алискирен.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

- Текстура®

случайные названия комбинированных продуктов

- Текстура®НСТ (содержащий алискирен, гидрохлоротиазид)
- Валтурна®(содержит Алискирен, Валсартан)¶

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.

[Научитесь цитировать эту страницу](#)



[Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности](#)

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.