



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Inyección de amifostina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696014.html>

Inyección de amifostina

pronunciado como (soy'' i fos' adolescente)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La amifostina se usa para proteger los riñones de los efectos nocivos del medicamento de quimioterapia cisplatino en pacientes que reciben este medicamento para el tratamiento del cáncer de ovario. La amifostina también se usa para disminuir la sequedad en la boca causada por el tratamiento de radiación después de la cirugía por cáncer de cabeza y cuello. La amifostina pertenece a una clase de medicamentos llamados citoprotectores. Actúa protegiendo contra los efectos nocivos de los medicamentos de quimioterapia y la radioterapia.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La amifostina viene en forma de polvo que se mezcla con líquido para que un médico o una enfermera la inyecten por vía intravenosa (en una vena) en un centro médico. Cuando se usa amifostina para proteger los riñones contra los efectos dañinos del cisplatino, generalmente se administra durante 15 minutos comenzando 30 minutos antes de recibir su tratamiento de quimioterapia. Cuando la amifostina se usa para reducir la boca seca severa causada por el tratamiento con radiación, generalmente se administra durante 3 minutos comenzando 15 a 30 minutos antes de su tratamiento con radiación.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

La amifostina también se usa a veces para prevenir y disminuir los efectos secundarios asociados con ciertos medicamentos de quimioterapia o radioterapia y en el tratamiento de algunos tipos de enfermedades de las células sanguíneas.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir amifostina,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la amifostina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de la inyección de amifostina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar los medicamentos para la presión arterial alta. Su médico le indicará que deje de tomarse la presión arterial.

medicamento 24 horas antes de recibir la inyección de amifostina. Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con la amifostina, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando.

- Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad cardíaca, latidos cardíacos irregulares, insuficiencia cardíaca o un accidente cerebrovascular o un mini accidente cerebrovascular.
- informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada, o si está amamantando. Si queda embarazada mientras recibe amifostina, llame a su médico. No debe amamantar durante su tratamiento con amifostina.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La amifostina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- náuseas
- vómitos
- enrojecimiento o sensación de calor
- escalofríos o sensación de frío
- sensación general de cansancio
- fiebre
- somnolencia
- estornudo
- hipo

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato:

- dificultad para respirar
- mareo
- visión borrosa
- desmayo
- convulsiones
- opresión en el pecho
- Dolor de pecho
- erupción
- urticaria
- Comezón
- dificultad para respirar o tragar

- descamación o ampollas en la piel
- latidos cardíacos rápidos, lentos o fuertes

La amifostina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

- mareo
- aturdimiento
- desmayo

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la amifostina.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- etiol®

otros nombres

- etiofós

Última revisión - 15/12/2012

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA® Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022