



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → การฉีดอะมิฟอสทีน

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696014.html>

การฉีดอะมิฟอสทีน

ออกเสียงว่า (am " i fos' teen)

hy เป็นยานี้กำหนด?

Amifostine ใช้ปกป้องไตจากผลร้ายของยาเคมีบำบัด cisplatin ในผู้ป่วยที่ได้รับยานี้เพื่อรักษามะเร็งรังไข่ อะมิฟอสทีนยังใช้เพื่อลดความแห้งในปากที่เกิดจากการรักษาด้วยรังสีหลังการผ่าตัดมะเร็งศีรษะและลำคอ Amifostine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า cytoprotectants ทำงานโดยป้องกันผลร้ายของยาเคมีบำบัดและการฉายรังสี

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Amifostine มาในรูปแบบผงสำหรับผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาล เมื่อใช้อะมิฟอสทีนเพื่อปกป้องไตจากผลร้ายของซิสพลาติน มักจะให้มากกว่า 15 นาที โดยเริ่มตั้งแต่ 30 นาทีก่อนที่คุณจะได้รับการบำบัดด้วยเคมีบำบัด เมื่อใช้อะมิฟอสทีนเพื่อลดอาการปากแห้งอย่างรุนแรงที่เกิดจากการฉายรังสี มักจะให้เวลามากกว่า 3 นาที โดยเริ่มตั้งแต่ 15-30 นาทีก่อนการฉายรังสี

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสำเนาข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

ใช้สำหรับยานี้

บางครั้งก็ใช้ Amifostine เพื่อป้องกันและลดผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับยาเคมีบำบัดบางชนิดหรือการฉายรังสีและในการรักษาโรคเซลล์เม็ดเลือดบางชนิด

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวด ข้อควรระวังพิเศษ ฉันทควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับอะมิฟอสทีน

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้อะมิฟอสทีน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดอะมิฟอสทีน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงการรักษาโรคความดันโลหิตสูง แพทย์ของคุณจะบอกให้คุณหยุดใช้ความดันโลหิตของคุณ

ยา 24 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะได้รับการฉีด amifostine ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับอะมิฟอสทีน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจล้มเหลว หรือโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดสมอง
- แจ้งแพทย์หากกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับอะมิฟอสทีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ คุณไม่ควรให้นมบุตรระหว่างการรักษาด้วยอะมิฟอสทีน

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

อะมิฟอสทีนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- แดงหรือรู้สึกอบอุ่น
- หนาวสั่นหรือรู้สึกหนาว
- ความรู้สึกเหนียวล้าทั่วไป
- ไข้
- อาการง่วงนอน
- จาม
- อาการระคายเคือง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- หายใจถี่
- อาการเวียนศีรษะ
- มองเห็นภาพซ้อน
- เป็นลม
- อาการชัก
- แน่นหน้าอก
- อาการเจ็บหน้าอก
- ผื่น
- ลมพิษ
- อาการคัน
- หายใจลำบากหรือคลื่นไส้

- ผีวลอกหรือพุงพอง
- หัวใจเต้นเร็ว ช้ำ หรือเต้นแรง

อะมิฟอสทีนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ <https://www.poisonhelp.org/help> [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

- อาการเวียนศีรษะ
- มึนหัว
- เป็นลม

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่ออะมิฟอสทีน

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- เอทิล®

ชื่อของเธอ

- Ethiofos

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2555

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้า](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบธesda, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022