Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682643.html

Inyección de anfotericina B

pronunciado como (am foe ter' i sin)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

La inyección de anfotericina B puede causar efectos secundarios graves. Solo debe usarse para tratar infecciones fúngicas potencialmente mortales y no para tratar infecciones fúngicas menos graves de la boca, la garganta o la vagina en pacientes con un sistema inmunitario normal (la protección natural del cuerpo contra las infecciones).

Hable con su médico acerca de los riesgos de recibir la inyección de anfotericina B.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de anfotericina B se usa para tratar infecciones fúngicas graves y potencialmente mortales. La inyección de anfotericina B pertenece a una clase de medicamentos llamados antimicóticos. Actúa retardando el crecimiento de hongos que causan infecciones.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de anfotericina B viene como una torta de polvo sólido que se convierte en una solución y luego una enfermera o un médico la inyecta por vía intravenosa (en una vena). La inyección de anfotericina B generalmente se infunde (inyecta lentamente) por vía intravenosa durante un período de 2 a 6 horas una vez al día. Antes de recibir su primera dosis, puede recibir una dosis de prueba durante 20 a 30 minutos para ver si puede tolerar el medicamento. La duración de su tratamiento depende de su salud general, cómo tolera el medicamento y el tipo de infección que tiene.

Es posible que experimente una reacción mientras recibe una dosis de anfotericina B inyectable. Estas reacciones generalmente ocurren de 1 a 3 horas después de comenzar la infusión y son más graves con las primeras dosis. Su proveedor de atención médica puede recetarle otros medicamentos para disminuir estos efectos secundarios. Informe a su médico de inmediato si experimenta cualquiera de estos síntomas mientras recibe la inyección de anfotericina B: fiebre, escalofríos, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, mareos, problemas para respirar o dolor de cabeza.

Puede recibir la inyección de anfotericina B en un hospital o puede usar el medicamento en casa. Si va a usar la inyección de anfotericina B en casa, su proveedor de atención médica le mostrará cómo infundir el medicamento. Asegúrese de entender estas instrucciones y pregúntele a su proveedor de atención médica si tiene

alguna pregunta. Pregúntele a su proveedor de atención médica qué hacer si tiene algún problema con la infusión de la inyección de anfotericina B.

Si sus síntomas no mejoran o empeoran mientras recibe anfotericina B, informe a su médico. Si aún tiene síntomas de infección después de terminar la inyección de anfotericina B, informe a su médico.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir la inyección de anfotericina B,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la anfotericina B, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de la inyección de anfotericina B. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: antibióticos aminoglucósidos como amikacina, gentamicina o tobramicina (Bethkis, Kitabis Pak, Tobi); antifúngicos como clotrimazol, fluconazol (Diflucan), itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Extina, Nizoral, Xolegel) y miconazol (Oravig, Monistat); corticotropina (HP Acthar Gel); ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); digoxina (Lanoxin); flucitosina (Ancobon); medicamentos para el tratamiento del cáncer como la mostaza nitrogenada; pentamidina (Nebupent, Pentam); y esteroides orales como dexametasona, metilprednisolona (Medrol) y prednisona (Rayos).
- Informe a su médico si está recibiendo transfusiones de leucocitos (glóbulos blancos).
- Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad renal.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras recibe la inyección de anfotericina B, llame a su médico. No amamante mientras recibe la inyección de anfotericina B.
- Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está recibiendo una inyección de anfotericina B.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de anfotericina B puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- dolor de estómago o calambres
- acidez
- Diarrea
- pérdida de peso
- dolor de huesos, músculos o articulaciones

- falta de energía
- enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección
- piel pálida
- dificultad para respirar
- mareo
- dolor de cabeza
- frialdad en las manos y los pies

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- erupción
- ampollas o urticaria
- enrojecimiento
- sibilancias
- respiración dificultosa
- Comezón
- coloración amarillenta de la piel o los ojos
- disminución de la micción

La inyección de anfotericina B puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras recibe este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono (1-800-332-1088).

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

- Dolor de pecho
- dificultad para respirar
- mareo
- pérdida de consciencia

- latidos cardíacos rápidos, irregulares o fuertes

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio durante su tratamiento para verificar la respuesta de su cuerpo a la inyección de anfotericina B.

No dejes que nadie más use tu medicación. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

Última revisión - 15/05/2016

Aprende a citar esta página

Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022