Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613032.html

Apixaban

prononcé comme (un pix' une interdiction)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Si vous souffrez de fibrillation auriculaire (une condition dans laquelle le cœur bat de manière irrégulière, ce qui augmente le risque de formation de caillots dans le corps et peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux) et que vous prenez apixaban pour aider à prévenir les accidents vasculaires cérébraux ou les caillots sanguins graves, vous courez un risque plus élevé de avoir un accident vasculaire cérébral après avoir cessé de prendre ce médicament. N'arrêtez pas de prendre apixaban sans en parler à votre médecin. Continuez à prendre apixaban même si vous vous sentez bien. Assurez-vous de renouveler votre ordonnance avant de manquer de médicaments afin de ne manquer aucune dose d'apixaban. Si vous devez arrêter de prendre apixaban, votre médecin peut vous prescrire un autre anticoagulant (« anticoagulant ») pour aider à prévenir la formation d'un caillot sanguin et à provoquer un accident vasculaire cérébral.

Si vous subissez une anesthésie péridurale ou rachidienne ou une ponction lombaire pendant que vous prenez un « anticoagulant » tel que l'apixaban, vous risquez de former un caillot sanguin dans ou autour de votre colonne vertébrale qui pourrait vous rendre paralysé. Informez votre médecin si vous avez un cathéter épidural qui reste dans votre corps ou si vous avez ou avez déjà eu des ponctions épidurales ou vertébrales répétées, une déformation de la colonne vertébrale ou une chirurgie de la colonne vertébrale. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants : anagrélide (Agrylin); l'aspirine et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l'ibuprofène (Advil, Motrin, autres), l'indométhacine (Indocin, Tivorbex), le kétoprofène et le naproxène (Aleve, Anaprox, autres); le cilostazol (Pletal); clopidogrel (Plavix); dipyridamole (Persantin); l'eptifibatide (Integrilin); héparine; prasugrel (Effient); ticagrélor (Brilinta); ticlopidine; tirofiban (Aggrastat) et warfarine (Coumadin, Jantoven). Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : faiblesse musculaire (en particulier dans les jambes et les pieds), engourdissement ou picotement (en particulier dans les jambes) ou perte de contrôle de vos intestins ou de votre vessie.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) au début du traitement par apixaban et à chaque renouvellement de votre ordonnance. Lisez attentivement les informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le site Web de la Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) ou le site Web du fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise d'apixaban.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Apixaban est utilisé pour aider à prévenir les accidents vasculaires cérébraux ou les caillots sanguins chez les personnes atteintes de fibrillation auriculaire (une affection dans laquelle le cœur bat de manière irrégulière, augmentant le risque de formation de caillots dans le corps et pouvant provoquer des accidents vasculaires cérébraux) qui n'est pas causée par une maladie des valves cardiaques. Apixaban est également utilisé pour prévenir la thrombose veineuse profonde (TVP ; un caillot sanguin, généralement dans la jambe) et l'embolie pulmonaire (EP ; un caillot sanguin dans le poumon) chez les personnes qui subissent une arthroplastie de la hanche ou du genou. Apixaban est également utilisé pour traiter la TVP et l'EP et peut être poursuivi pour éviter que la TVP et l'EP ne se reproduisent après la fin du traitement initial. Apixaban appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs du facteur Xa. Il agit en bloquant l'action d'une certaine substance naturelle qui aide à la formation de caillots sanguins.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Apixaban se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris avec ou sans nourriture deux fois par jour. Lorsqu'apixaban est pris pour prévenir la TVP et l'EP après une chirurgie de remplacement de la hanche ou du genou, la première dose doit être prise au moins 12 à 24 heures après la chirurgie. Apixaban est généralement pris pendant 35 jours après une arthroplastie de la hanche et pendant 12 jours après une arthroplastie du genou. Prenez apixaban à peu près aux mêmes heures chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez apixaban exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Si vous ne parvenez pas à avaler les comprimés, vous pouvez les écraser et les mélanger avec de l'eau, du jus de pomme ou de la compote de pommes. Avalez le mélange juste après l'avoir préparé. Apixaban peut également être administré dans certains types de sondes d'alimentation. Demandez à votre médecin si vous devez prendre ce médicament dans votre tube d'alimentation. Suivez attentivement les instructions de votre médecin.

Continuez à prendre apixaban même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre apixaban sans en parler à votre médecin.
Si vous arrêtez de prendre apixaban, votre risque de caillot sanguin peut augmenter.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre apixaban,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'apixaban, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés d'apixaban. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des médicaments pour une liste des ingrédients.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines et des suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : carbamazépine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril) ; clarithromycine (Biaxin, dans Prevpac); itraconazole (Onmel, Sporanox); kétoconazole (Nizoral); phénytoïne (Dilantin, Phenytek); rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifadin, dans Rifater); ritonavir (Norvir, à Kaletra); les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) tels que le citalopram (Celexa), la fluoxétine (Prozac, Sarafem, Selfemra, dans Symbyax), la fluvoxamine (Luvox), la paroxétine (Brisdelle, Paxil, Pexeva) et la sertraline (Zoloft) ; et la sérotonine et

les inhibiteurs du recaptage de la noradrénaline (IRSN) tels que la duloxétine (Cymbalta), la desvenlafaxine (Khedezla, Pristiq), le milnacipran (Fetzima, Savella) et la venlafaxine (Effexor). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec l'apixaban, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

- dites à votre médecin quels produits à base de plantes vous prenez, en particulier le millepertuis.
- vous devez savoir qu'apixaban peut interagir avec certains médicaments qui peuvent être utilisés pour vous traiter si vous avez un accident vasculaire cérébral ou une autre urgence médicale. En cas d'urgence, vous ou un membre de votre famille devez informer le médecin ou le personnel de la salle d'urgence qui vous traite que vous prenez apixaban.
- informez votre médecin si vous avez une valve cardiaque artificielle ou si vous avez des saignements abondants n'importe où dans votre corps qui ne peuvent pas être arrêtés. Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre d'apixaban.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un problème de saignement, un syndrome des antiphospholipides (APS, une maladie qui provoque des caillots sanguins) ou une maladie des reins ou du foie.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez apixaban, appelez votre médecin.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez apixaban. Votre médecin peut vous dire d'arrêter de prendre apixaban avant la chirurgie ou la procédure. Si vous devez arrêter de prendre apixaban parce que vous subissez une intervention chirurgicale, votre médecin peut vous prescrire un médicament différent pour prévenir la formation de caillots sanguins pendant cette période. Votre médecin vous dira quand vous devrez recommencer à prendre apixaban après votre chirurgie. Suivez attentivement ces instructions.
- Appelez immédiatement votre médecin si vous tombez ou si vous vous blessez, surtout si vous vous cognez la tête. Votre médecin devra peut-être vous contrôler.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

- saignement des gencives
- saignements de nez
- saignements vaginaux abondants
- urine rouge, rose ou brune
- selles rouges ou noires, goudronneuses
- tousser ou vomir du sang ou des matières ressemblant à du marc de café

- gonflement ou douleur articulaire
- mal de crâne
- éruption
- douleur ou oppression thoracique
- gonflement du visage ou de la langue
- difficulté à respirer
- respiration sifflante
- sensation de vertige ou d'évanouissement

Apixaban empêche le sang de coaguler normalement, il peut donc vous falloir plus de temps que d'habitude pour arrêter de saigner si vous vous coupez ou vous blessez. Ce médicament peut également provoquer des ecchymoses ou des saignements plus facilement. Appelez immédiatement votre médecin si le saignement ou les ecchymoses sont inhabituels, graves ou ne peuvent pas être contrôlés.

Apixaban peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la lumière, de la chaleur excessive et de l'humidité (pas dans la salle de bain).

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

- saignements ou ecchymoses inhabituels
- urine rouge, brune ou rose
- selles rouges ou noires, goudronneuses
- tousser ou vomir du sang ou des matières ressemblant à du marc de café

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Équis®

Dernière révision - 15/06/2020

Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022