Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604003.html

阿瑞匹坦

发音为 (ap re' pi tant)

为什么要开这种药?

阿瑞匹坦与其他药物一起用于成人和 6 个月及以上的儿童，以预防接受癌症化疗治疗后可能发生的恶心和呕吐。它还与其他药物一起用于成人和 6 个月及以上的儿童，以防止在接受某些化疗药物后几天可能出现的延迟性恶心和呕吐。阿瑞匹坦不用于治疗您已经患有的恶心和呕吐。阿瑞匹坦属于一类称为止吐药的药物。它通过阻断神经激肽的作用起作用，神经激肽是大脑中引起恶心和呕吐的一种天然物质。

这个药应该怎么用?

阿瑞匹坦以胶囊和口服混悬液（液体）的形式口服。为防止癌症化疗引起的恶心和呕吐，通常在癌症化疗治疗的前几天每天服用一次阿瑞匹坦，有或没有食物。在治疗的第 1 天、第 2 天和第 3 天，您可能会在化疗前 1 小时服用阿瑞匹坦。如果您在第 2 天和第 3 天没有接受化疗，那么您将在这些天早上服用阿瑞匹坦。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用阿瑞匹坦。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

阿瑞匹坦胶囊有两种不同的优势。您的医生可能会为您在不同时间服用这两种药物。您应该小心按照医生的指示在正确的时间服用正确的力量。

吞下整个胶囊；不要分裂、咀嚼或压碎它们。

口服混悬液将由您的医疗保健提供者制备并在口服分配器中给予您。将口服分配器存放在冰箱中，直到您服药的时间；但是，它可以在使用前在室温下储存长达 3 小时。准备好使用时，从分配器上取下盖子，然后将其放入口中以缓慢释放药物。

阿瑞匹坦仅用于预防恶心和呕吐。如果您已经出现这些症状并且不要开始服用阿瑞匹坦，请致电您的医生。

当用于预防癌症化疗引起的恶心和呕吐时，阿瑞匹坦通常仅在化疗治疗周期的前 3 天使用。不要继续服用阿瑞匹坦超过医生指示的时间。

向您的药剂师或医生索取患者的制造商信息副本。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在服用阿瑞匹坦之前，

- 如果您对阿瑞匹坦、任何其他药物或阿瑞匹坦胶囊或口服混悬液中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 如果您正在服用匹莫齐特 (Orap)，请勿服用阿瑞匹坦。如果您正在服用这种药物，您的医生可能会告诉您不要服用阿瑞匹坦。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：抗凝剂（“血液稀释剂”），例如华法林（Coumadin，Jantoven）；抗真菌药，例如伊曲康唑（Onmel，Sporanox）和酮康唑；苯二氮卓类药物，例如阿普唑仑 (Xanax)、地西泮 (Valium)、咪达唑仑和三唑仑 (Halcion)；癌症化疗药物，例如异环磷酰胺 (Ifex)、伊立替康 (Camptosar)、长春碱和长春新碱 (Marqibo Kit)；卡马西平（Equetro、Tegretol、Teril）；克拉霉素（Biaxin，在 Prevpac）；地尔硫卓（Cardizem，Cartia，Tiazac）；HIV蛋白酶抑制剂，例如奈非那韦（Viracept）和利托那韦（Norvir）；激素避孕药（避孕药、贴片、戒指、和注射）；奈法唑酮；口服类固醇，如地塞米松和甲基强的松龙（Medrol）；苯妥英（Dilantin，Phenytek）；利福平（Rifadin，Rimactane，在 Rifamate，在 Rifater）；和木霉霉素（TAO；在美国不再提供）。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。许多其他药物也可能与阿瑞匹坦相互作用，因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物，即使是未出现在此列表中的药物。
- 如果您患有或曾经患有肝病，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在阿瑞匹坦治疗期间正在服用或接受激素避孕药（避孕药、贴片、避孕环、植入物或注射剂），您还应该使用其他避孕方法（杀精剂、避孕套）以避免在阿瑞匹坦治疗期间怀孕，并且最后一次服药后一个月。在服用阿瑞匹坦期间和治疗后与您的医生讨论避孕方法。如果您在服用阿瑞匹坦期间怀孕，请致电您的医生。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

阿瑞匹坦可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 弱点
- 疲倦
- 头晕
- 腹泻
- 便秘
- 气体
- 肚子痛
- 胃灼热
- 恶心
- 打嗝
- 食欲不振
- 头痛
- 发烧
- 脱发

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状，请立即致电您的医生：

- 麻疹
- 皮疹
- 瘙痒
- 皮肤脱皮或水泡
- 呼吸或吞咽困难

阿瑞匹坦可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将胶囊存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。这

配制好的口服混悬剂必须在配制后 72 小时内使用；72 小时后丢弃任何未使用的剂量。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒，请始终锁上安全帽，并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括以下内容：

- 睡意
- 头痛

我应该知道其他信息吗？

与您的医生保持所有约会。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 订正®

最后修订 - 2020 年 2 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日