TITLE - ARGATROBAN / ACOVA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medicines Org UK

Argatroban 1 mg/ml Solusyon para sa Pagbubuhos

argatroban

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang paggamit ng gamot na ito.

- Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.
- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor.
- Kung lumala ang alinman sa mga side effect, o kung may napansin kang anumang side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito, mangyaring sabihin sa iyong doktor.

Sa leaflet na ito:

1. Ano ang Argatroban Infusion at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Argatroban Infusion
3. Paano gamitin ang Argatroban Infusion
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Argatroban Infusion
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Argatroban Infusion at para saan ito ginagamit

Ang Argatroban Infusion ay isang anticoagulant (isang gamot na tumutulong upang maiwasan ang pagbuo ng mga pamumuo ng dugo sa iyong sirkulasyon ng dugo). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng thrombin, isang sangkap sa iyong dugo na mahalaga sa pamumuo ng dugo.

Ang Argatroban Infusion ay ginagamit kung ikaw ay dumaranas ng isang karamdaman na kilala bilang heparin-induced thrombocytopenia type II (HIT type II). Kung ikaw ay may HIT type II, ikaw ay nasa panganib na magkaroon ng mga namuong dugo sa iyong sirkulasyon ng dugo na maaaring magdulot ng atake sa puso, stroke, mga problema sa paghinga at mga problema sa suplay ng dugo sa iyong mga paa. Maaaring pigilan ng Argatroban Infusion ang mga problemang ito o pigilan ang mga ito na lumala.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Argatroban Infusion

Huwag gumamit ng Argatroban Infusion

Ang Argatroban Infusion ay hindi ibibigay sa iyo:

- Kung mayroon kang hindi makontrol na pagdurugo.
- Kung ikaw ay allergic (hypersensitive) sa argatroban o sa alinman sa iba pang sangkap sa Argatroban Infusion.
- Kung mayroon kang malubhang kapansanan sa paggana ng atay.

Maging espesyal na pangangalaga sa Argatroban Infusion Ang Argatroban Infusion ay ibibigay sa iyo nang may espesyal na pangangalaga:

- Kung may mas mataas na panganib ng pagdurugo
- Kung kamakailan kang nagkaroon ng mga iniksyon o pagbubuhos ng iba pang anticoagulants tulad ng heparin
- Kung mayroon kang sakit sa atay

Iba pang mga gamot at Argatroban Infusion

Mangyaring sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka, o kamakailan lamang ay umiinom, ng anumang iba pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na nakuha nang walang reseta.

Ang pinagsamang paggamit sa iba pang mga gamot sa pagpapanipis ng dugo o pagtunaw ng namuong dugo ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo.

Pagbubuntis at pagpapasuso

Kung ikaw ay buntis, bibigyan ka lamang ng iyong doktor ng Argatroban Infusion kung ito ay talagang kinakailangan. Iwasan ang pagpapasuso habang binibigyan ka ng Argatroban Infusion.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang epekto ng paggamot na may Argatroban Infusion sa kakayahan ng pasyente na magmaneho o magpatakbo ng makinarya ay hindi pa nasusuri.

Ang Argatroban Infusion ay naglalaman ng sorbitol

Ang gamot na ito ay naglalaman ng sorbitol. Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi pagpaparaan sa ilang mga asukal. Makipag-ugnayan sa iyong doktor bago kunin ang produktong panggamot na ito.

Ang Argatroban Infusion ay naglalaman ng sodium

Ang produktong panggamot na ito ay naglalaman ng 3.54 mg ng sodium per ml
solution. Upang isaalang-alang ng mga pasyente sa kinokontrol na sodium diet.

3. Paano gamitin ang Argatroban Infusion

Ang Argatroban Infusion ay palaging ibibigay sa iyo ng mga medikal na tauhan. Ang Argatroban Infusion ay ibibigay sa iyo nang intravenously (sa ugat) sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pagbubuhos. Ang doktor ang magpapasya sa dosis at kung gaano katagal ka gagamutin.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang Argatroban Infusion ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagama't hindi lahat ay nakakakuha nito. **Ang pinakakaraniwang side effect ay ang pagdurugo.**Maaaring mangyari ang malaking pagdurugo sa humigit-kumulang 5% ng mga pasyente at menor de edad na pagdurugo sa humigit-kumulang 39% ng mga pasyente.**Dapat mong sabihin kaagad sa iyong doktor**kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas:

- Pagdurugo o pasa
- dugo sa ihi o dumi pagsusuka o
- pag-ubo ng dugong itim na
- dumi
- hirap huminga ng malamig
- na pawis na balat
- tuyong bibig
- dilat na mga mag-aaral at/o mahina, mabilis na pulso.

Ang mga sintomas na ito ay maaaring magpahiwatig na nakakaranas ka ng mga problema sa pagdurugo.

Karaniwang epekto*(nakakaapekto sa higit sa 1 user sa 100):*

- Anemia
- pamumuo ng dugo
- pagdurugo, kabilang ang maraming maliliit na pagdurugo sa balat at mucus membranes (purpura) na pagduduwal.
-

Mga hindi karaniwang epekto*(nakakaapekto sa higit sa 1 user sa 1,000):*

- Ang mga impeksyon tulad ng impeksyon sa ihi ay
- nagbabago sa mga halaga ng dugo
- pamumuo ng dugo
- walang gana
- mababang antas ng asukal sa dugo
- mababang antas ng sodium sa pagkalito sa
- dugo
- pagkahilo

- nanghihina
- sakit ng ulo
- stroke
- mga sakit sa kalamnan
- sakit sa pagsasalita
- mga problema sa paningin
- pagkabingi
- atake sa puso
- likido sa heart sac abnormal
- na ritmo ng puso
- mabilis na tibok ng puso
- mababang presyon ng dugo
- altapresyon
- pamamaga ng mga ugat
- pagkabigla
- nabawasan ang supply ng oxygen sa mga tisyu
- na nahihirapan sa paghinga
- likido sa paligid ng baga
- sinok
- dugo sa ubo, suka o dumi
- ng dumi
- pagtatae
- pamamaga ng tiyan
- kahirapan sa paglunok
- ng dila disorder
- abnormal na paggana ng atay
- paninilaw ng balat (pagninilaw ng balat at mata) mga
- pagbabago sa mga pagsusuri sa dugo para sa pantal sa
- paggana ng atay kabilang ang nettle rash
- nangangati,
- nadagdagan ang pagpapawis
- pagkalagas ng buhok
- kahinaan ng kalamnan
- pananakit ng kalamnan
- pagkabigo sa bato
- lagnat
- sakit
- pagkapagod
- reaksyon sa lugar ng iniksyon
- pamamaga ng mga binti nadagdagan
- ang paagusan ng sugat abnormal na
- mga resulta ng laboratoryo.

Kung lumala ang alinman sa mga side effect na ito o kung may napansin kang anumang side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito, mangyaring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko.

Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang mga side effect, makipag-usap sa iyong doktor. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng pambansang pag-uulat na Yellow Card Scheme Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard .Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Argatroban Infusion

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag mag-freeze. Panatilihin ang vial sa panlabas na karton upang maprotektahan mula sa liwanag. Ang produkto ay dapat gamitin kaagad pagkatapos buksan
Ang mga solusyon ay hindi dapat gamitin kung sila ay maulap o naglalaman ng anumang mga particle.

Huwag gamitin pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa label ng karton/vial. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Argatroban Infusion

Ang aktibong sangkap ay argatroban. Ang iba pang mga sangkap ay sorbitol, sodium chloride at tubig para sa mga iniksyon.
Ang 1 ml na solusyon para sa pagbubuhos ay naglalaman ng 0.966 mg ng argatroban na katumbas ng 1 mg argatroban monohydrate.
Ang 1 vial na may 50 ml na solusyon para sa pagbubuhos ay naglalaman ng 48.30 mg ng argatroban na katumbas ng 50 mg argatroban monohydrate.

Ano ang hitsura ng Argatroban Infusion at mga nilalaman ng pack

Ang produktong panggamot na ito ay isang malinaw na walang kulay hanggang maputlang dilaw na solusyon para sa pagbubuhos at ibinibigay sa isang malinaw na glass vial na selyadong may rubber stopper at isang aluminum seal na may flip-off cap.
Ang bawat vial ay naglalaman ng 50 ML ng solusyon at ang mga vial ay nakaimpake sa mga karton na kahon ng 1, 5 o 6 na vial pack.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing:

Accord Healthcare Limited Sage
House, 319 Pinner Road, North
Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United
Kingdom

Tagagawa:

Accord Healthcare Limited Sage
House, 319 Pinner Road, North
Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United
Kingdom

O kaya

Wessling Hungary Kft
Fòti ùt 56., Budapest 1047,
Hungary

O kaya
Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Poland

Huling binago ang leaflet na ito noong 02/2019.

Ang sumusunod na impormasyon ay inilaan para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan lamang:

Mga tagubilin para sa paggamit, paghawak at pagtatapon

Ang Argatroban Infusion ay ibinibigay bilang handa nang gamitin na solusyon para sa pagbubuhos na may konsentrasyon na 1 mg/ml (50 mg/50 ml).

Ang vial ay para sa isang gamit lamang. Ang pH ng intravenous infusion solution ay 3.2-7.5

Ang mga light resistant na hakbang tulad ng foil protection para sa intravenous lines ay hindi kailangan. Walang makabuluhang pagkawala ng potency ang nabanggit kasunod ng simulate na paghahatid ng solusyon sa pamamagitan ng intravenous tubing.

Ang anumang hindi nagamit na produkto o basura ay dapat itapon alinsunod sa mga lokal na pangangailangan.