

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Arsenik Trioksit Enjeksiyonu

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608017.html>

Arsenik Trioksit Enjeksiyonu

(ar' se nik trye ox' ide) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Arsenik trioksit, yalnızca lösemi (beyaz kan hücrelerinin kanseri) olan kişilerin tedavisinde deneyimli bir doktorun gözetiminde verilmelidir.

Arsenik trioksit, APL farklılaşma sendromu adı verilen ciddi veya yaşamı tehdit eden bir semptom grubuna neden olabilir. Doktorunuz bu sendromu geliştirip geliştirmediğinizi anlamak için sizi dikkatle izleyecektir. Kilo alımı APL farklılaşma sendromunun bir belirtisi olduğundan, doktorunuz tedavinizin ilk birkaç haftasında her gün kendinizi tartmanızı isteyebilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: ateş, kilo artışı, nefes darlığı, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya öksürük. APL farklılaşma sendromu geliştirdiğinizin ilk belirtisinde, doktorunuz sendromu tedavi etmek için bir veya daha fazla ilaç yazacaktır.

Arsenik trioksit, ciddi veya yaşamı tehdit eden kalp ritmi sorunlarına neden olabilen QT uzamasına (bir elektriksel bozukluk nedeniyle kalp kaslarının atımlar arasında yeniden şarj olması daha uzun sürer) neden olabilir. Arsenik trioksit ile tedaviye başlamadan önce, doktorunuz kalbinizde zaten bir elektriksel bozukluk olup olmadığını veya normalden daha yüksek risk altında olup olmadığını görmek için bir elektrokardiyogram (EKG; kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden test) ve diğer testleri isteyecektir. bu durumu geliştirmek. Doktorunuz sizi yakından izleyecek ve arsenik trioksit ile tedaviniz sırasında bir EKG ve diğer testler isteyecektir. Kanınızda QT uzaması, kalp yetmezliği, düzensiz kalp atışı veya düşük potasyum veya magnezyum düzeyleri olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Ayrıca aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: amiodaron (Nexterone, Pacerone), amfoterisin (Abelcet, Amphotec, Fungizone), sisaprid (Propulsid), disopiramid (Norpace), diüretikler ('su hapları'), dofetilid (Tikosyn), eritromisin (EES, E-Mycin, Eritrosin), moksifloksasin (Avelox), pimozid (Orap), prokainamid (Procanbid, Pronestyl), kinidin (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloksasin (Zagam), tioridazin (Mellaril) ve ziprasidon (Geodon). Arsenik trioksit ile tedaviniz sırasında düzensiz veya hızlı kalp atışınız varsa veya bayılırsanız hemen doktorunuzu arayın. Pronestyl), kinidin (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloksasin (Zagam), tioridazin (Mellaril) ve ziprasidon (Geodon). Arsenik trioksit ile tedaviniz sırasında düzensiz veya hızlı kalp atışınız varsa veya bayılırsanız hemen doktorunuzu arayın. Pronestyl), kinidin (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloksasin (Zagam), tioridazin (Mellaril) ve ziprasidon (Geodon). Arsenik trioksit ile tedaviniz sırasında düzensiz veya hızlı kalp atışınız varsa veya bayılırsanız hemen doktorunuzu arayın.

Arsenik trioksit enjeksiyonu, ensefalopatiye (kafa karışıklığı, hafıza sorunları ve anormal beyin fonksiyonunun neden olduğu diğer zorluklar) neden olabilir. Çok miktarda alkol içtiyseniz veya hiç içtiyseniz, malabsorpsiyon sendromunuz (yiyecekleri emme sorunları), beslenme ile ilgili bir sorunuz varsa doktorunuza söyleyiniz.

eksikliği veya furosemid (Lasix) alıyorsanız. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız hemen doktorunuzu arayın: kafa karışıklığı; bilinç kaybı; nöbetler; konuşma değişiklikleri; koordinasyon, denge veya yürüme ile ilgili sorunlar; veya azalmış görsel algı, okuma sorunları veya çift görme gibi görsel değişiklikler. Ailenizin veya bakıcınızın hangi semptomların ciddi olabileceğini bildiğinden emin olun, böylece kendi başınıza arayamıyorsanız tedaviye başvurabilirsiniz.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun arsenik trioksite tepkisini kontrol etmek için önce ve sonra bazı testler isteyecektir.

Arsenik trioksite almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Arsenik trioksite, bazı kişilerde ilk tedavi olarak akut promiyelositik lösemi (APL; kanda ve kemik iliğinde çok fazla olgunlaşmamış kan hücresinin bulunduğu bir kanser türü) tedavi etmek için tretinoin ile kombinasyon halinde kullanılır. Ayrıca, diğer kemoterapi türlerinin yardımcı olmayan veya bir retinoid ve diğer kemoterapi tedavi(ler)i ile tedaviyi takiben durumu düzelen ancak daha sonra kötüleşen belirli kişilerde APL'yi tedavi etmek için kullanılır. Arsenik trioksite, anti-neoplastikler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Arsenik trioksite, tıbbi bir ofis veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından damara enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Arsenik trioksite genellikle 1 ila 2 saatte enjekte edilir, ancak infüzyon sırasında yan etkiler görülürse 4 saate kadar enjekte edilebilir. Genellikle belirli bir süre için günde bir kez verilir.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Arsenik trioksite enjeksiyonu almadan önce,

- arsenik trioksite, diğer ilaçlara veya arsenik trioksite enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
- aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. **ÖNEMLİ UYARI** bölümünde listelenen ilaçları mutlaka belirtin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
- Karaciğer veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Kadınsanız, tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmanız ve tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonra en az 6 ay boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolü kullanmanız gerekecektir. Erkek iseniz, siz ve kadın partneriniz arsenik alırken etkili doğum kontrolü kullanmalısınız.

trioksit enjeksiyonu ve son dozdan 3 ay sonra. Bu ilacı kullanırken siz veya eşiniz hamile kalırsa doktorunuzu arayın. Arsenik trioksit ile tedaviniz sırasında hamileliği önlemek için doğum kontrolünün kullanılması hakkında doktorunuzla konuşun. Arsenik trioksit fetüse zarar verebilir.

- emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 2 hafta boyunca emzirmemenizi söyleyecektir.
- Bu ilacın erkeklerde doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. Arsenik trioksit almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.
- Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye arsenik trioksit aldığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Arsenik trioksit enjeksiyonu kan şekerinizin yükselmesine neden olabilir. Aşağıdaki hiperglisemi (yüksek kan şekeri) semptomlarından herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuzu arayın:

- aşırı susuzluk
- sık idrara çıkma
- aşırı açlık
- zayıflık
- bulanık görme

Yüksek kan şekeri tedavi edilmezse diyabetik ketoasidoz adı verilen ciddi, yaşamı tehdit eden bir durum gelişebilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz derhal tıbbi yardım alın:

- kuru ağız
- mide bulantısı ve kusma
- nefes darlığı
- meyveli kokan nefes
- azalmış bilinç

Arsenik trioksit enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- aşırı yorgunluk
- baş dönmesi
- baş ağrısı
- ishal
- kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

- döküntü
- kaşıntı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenenlerden herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuzu arayın:

- olağandışı morarma veya kanama
- kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma
- siyah ve katranlı veya parlak kırmızı kan içeren dışkı
- azalmış idrara çıkma
- kurdeşen

Arsenik trioksit enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşıyorsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz. (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

- nöbetler
- Kas Güçsüzlüğü
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Arsenik trioksit enjeksiyonu ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- trisenoks®

Son Revize - 08/15/2019

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmelidir.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022