Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

כתובת האתר של דף זה: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610015.html

אסנאפין

מבוטא בתור (a sen' a peen)

אזהרה חשובה:

שימוש במבוגרים מבוגרים:

מחקרים הראו כי מבוגרים עם דמנציה (הפרעה מוחית המשפיעה על היכולת לזכור, לחשוב בבהירות, לתקשר ולבצע פעולות יומיומיות ושעשוי לגרום לשינויים במצב הרוח ובאישיות) הנוטלים תרופות אנטי פסיכוטיות (תרופות למחלות נפש) כגון אסנאפין. יש סיכון מוגבר למוות במהלך הטיפול. מבוגרים יותר עם דמנציה עשויים גם להיות בעלי סיכוי גדול יותר ללקות בשבץ מוחי או מיני שבץ במהלך הטיפול.

אסנאפין אינו מאושר על ידי מינהל המזון והתרופות (FDA) לטיפול בבעיות התנהגות בקרב מבוגרים עם דמנציה. שוחח עם הרופא שרשם את התרופה אם אתה, בן משפחה או מישהו שאתה מטפל בו סובל מדמנציה ונוטל אסנאפין. למידע נוסף בקר באתר ה-FDA:[http://www.fda.gov/Drugs]http://www.fda.gov/Drugs.

שוחח עם הרופא שלך על הסיכון/ים של נטילת אסנאפין.

היי האם נרשמה תרופה זו?

אסנאפין משמש לטיפול בסימפטומים של סכיזופרניה (מחלת נפש הגורמת לחשיבה מופרעת או חריגה, אובדן עניין בחיים ורגשות חזקים או לא הולמים). אסנאפין משמש לבד או בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול או מניעת אפיזודות של מאניה (מצב רוח מטורף, נרגש בצורה חריגה) או מאניה מעורבת (מצב רוח מטורף, נרגש בצורה חריגה ותסמינים של דיכאון) במבוגרים וילדים מגיל 10 ומעלה עם דו קוטבי I disorder (הפרעת מאניה דפרסיה; מחלה הגורמת לאפיזודות של מאניה, אפיזודות של דיכאון ומצבי רוח חריגים אחרים). אסנאפין נמצא בקבוצת תרופות הנקראות אנטי פסיכוטיות לא טיפוסיות. זה פועל על ידי שינוי הפעילות של חומרים טבעיים מסוימים במוח.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

אסנאפין מגיע כטבליה תת לשונית להמסה מתחת ללשון. זה נלקח בדרך כלל פעמיים ביום. קח אסנאפין בערך באותן שעות בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך

בזהירות, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח אסנאפין בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך.

אל תוציא מהאריזה טבליות תת-לשוניות של אסנאפין עד רגע לפני שאתה מוכן לקחת אותן, וודא שהידיים שלך יבשות כשאתה מטפל בטבליות. כאשר אתה מוכן לקחת טבליה, עקוב אחר הוראות האריזה כדי להסיר את הטאבלט מהמארז מבלי לדחוף את הטאבלט דרך אריזת הטאבלט או לשבור את הטאבלט. לאחר הסרת הטבליה, הנח אותה מתחת ללשון והמתן עד שהיא תתמוסס. אין לבלוע, לפצל, ללעוס או לכתוש את הטבליה. אין לאכול או לשתות דבר במשך 10 דקות לאחר התמוססות הטבליה.

ייתכן שהרופא שלך יצטרך להגדיל או להקטין את המינון שלך בהתאם למידת היעילות של התרופה עבורך ולתופעות הלוואי שאתה חווה. ספר לרופא שלך איך אתה מרגיש במהלך הטיפול באסנאפין.

אסנאפין עשוי לסייע בשליטה על הסימפטומים שלך אך לא ירפא את מצבך. המשך לקחת אסנאפין גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק ליטול אסנאפין מבלי לדבר עם הרופא שלך.

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת אסנאפין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לאסנאפין, לכל תרופה אחרת או לאחד מהמרכיבים בטבליות תת-לשוניות של אסנאפין. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהדברים הבאים: אנטיביוטיקה מסויימת, לרבות גטיפוקסצין (Tequin) (לא זמין בארה"ב) ומוקסיפלוקסצין (Avelox); תרופות נוגדות דיכאון כולל
  ;paroxetine)Paxil, Pexeva(-ו,clomipramine)Anafranil(, duloxetine)Cymbalta(, fluvoxamine)Luvox(
  אנטיהיסטמינים; דקסטרומתורפן (בדלסים, ב-Mucinex); ipratropium; תרופות נגד חרדה ולחץ דם גבוה; תרופות מסוימות לדופק לא סדיר כמו אמיודרון (Cordarone, Pacerone), procainamide, quinidine ו
  -)Betapace, Sorine(sotalol;תרופות לגלאוקומה, מחלות מעי דלקתיות, מחלת תנועה, מיאסטניה גרביס, מחלת פרקינסון, כיבים או בעיות שתן; תרופות למחלות נפש כגון כלורפרומאזין (תורזין), תיאורידזין וזיפרזידון (Geodon); תרופות להתקפים; תרופות הרגעה; כדורי שינה; ותרופות הרגעה. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינוני התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם אתה או מישהו במשפחתך סבל או סבל אי פעם בסוכרת; אם יש לך שלשול חמור או הקאות או שאתה חושב שאתה עלול להיות מיובש; אם אי פעם השתמשת בסמי רחוב או השתמשת לרעה בתרופות מרשם; ואם יש לך או היו לך אי פעם מחשבות על פגיעה או הרג עצמך; מרווח QT ממושך (בעיית לב נדירה שעלולה לגרום לקצב לב לא סדיר, התעלפות או מוות פתאומי); לחץ דם נמוך; התקף לב; אי ספיקתַ הלבַ; דופק איטי או לא סדיר; שבץ או TIA (מיני-שבץ); התקפים; סרטן השד; רמה נמוכה של תאי דם לבנים בדם שלך או ירידה בתאי דם לבנים הנגרמת על ידי תרופה שנטלת; רמה נמוכה של אשלגן או מגנזיום בדם; דיסליפידמיה (רמות כולסטרול גבוהות); בעיות בשמירה על שיווי המשקל שלך; כל מצב שמקשה עליך לבלוע;

- ספר לרופא שלך אם את בהריון, במיוחד אם את בחודשים האחרונים להריון, או אם את מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן נטילת אסנאפין, התקשר לרופא שלך. אסנאפין עלול לגרום לבעיות בילודים לאחר הלידה אם הוא נלקח במהלך החודשים האחרונים של ההריון.

- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל אסנאפין.

- אתה צריך לדעת שאסנאפין עלול לגרום לך לנמנם. אל תנהג במכונית או תפעיל מכונות עד שאתה יודע כיצד התרופה משפיעה עליך.
- שאל את הרופא שלך לגבי השימוש הבטוח במשקאות אלכוהוליים בזמן שאתה נוטל אסנאפין. אלכוהול יכול להחמיר את תופעות הלוואי של אסנאפין.
- עליך לדעת כי אסנאפין עלול לגרום לסחרחורת, סחרחורת והתעלפות כאשר אתה קם מהר מדי משכיבה. זה נפוץ יותר כאשר אתה מתחיל לראשונה לקחת אסנאפין. כדי לעזור להימנע מבעיה זו, צא מהמיטה באיטיות, הנח את הרגליים על הרצפה למשך מספר דקות לפני שאתה קם.

- אתה צריך לדעת שאסנאפין עשוי להקשות על הגוף שלך להתקרר כאשר הוא מתחמם מאוד. בזמן שאתה נוטל אסנאפין, עליך להימנע מפעילות גופנית מוגזמת, להישאר בפנים ככל האפשר ולהתלבש קלות במזג אוויר חם, להתרחק מהשמש ולשתות הרבה נוזלים.
- עליך לדעת שאתה עלול לחוות היפרגליקמיה (עלייה ברמת הסוכר בדם שלך) בזמן שאתה נוטל תרופה זו, גם אם אין לך עדיין סוכרת. אם יש לך סכיזופרניה, יש לך סיכוי גבוה יותר לפתח סוכרת מאשר אנשים שאין להם סכיזופרניה, ונטילת אסנאפין או תרופות דומות עלולה להגביר את הסיכון הזה. ספר לרופא שלך מיד אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים בזמן שאתה נוטל אסנאפין: צמא קיצוני, הטלת שתן תכופה, רעב קיצוני, ראייה מטושטשת או חולשה. חשוב מאוד להתקשר לרופא שלך ברגע שיש לך אחד מהתסמינים הללו, מכיוון שסוכר גבוה בדם עלול לגרום למצב חמור הנקרא קטואצידוזיס. קטואצידוזיס עלולה להפוך לסכנת חיים אם היא לא מטופלת בשלב מוקדם. תסמינים של קטואצידוזיס כוללים יובש בפה, בחילות והקאות, קוצר נשימה,

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

אסנאפין עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- פה יבש
- כאב בטן
- עצירות
- הקָאֶה

- צרֵבֶת
- תיאבון מוגבר
- עלייה בכמות הרוק בפה
- שינוי בטעם
- כאֵבֵי שִׁנַּיִם
- עלייה במשקל
- אובדן תחושה בשפתיים או בפה
- סחרחורת, הרגשה לא יציבה או מתקשה לשמור על שיווי משקל
- עייפות יתר
- חוסר שקט או דחף מתמיד להמשיך לנוע
- נרְגָנוּת
- חרֵדָה
- דכְאוֹן
- קושי להירדם או להישאר ישן
- כאב במפרקים, בזרועות או ברגליים

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הללו, או אלה המפורטים בסעיף אמצעי זהירות מיוחדים, התקשר לרופא שלך מיד או קבל טיפול רפואי חירום:

- כוורות
- פריחה
- עקצוץ
- קשיי נשימה או בליעה
- נפיחות של הפנים, הגרון, הלשון, השפתיים, העיניים, הידיים, הרגליים, הקרסוליים או הרגליים התחתונות
- צרִידוּת
- צפצופים
- חום
- נוקשות או כאב בשרירים
- עווית או הידוק של שרירי הצוואר
- בלְבוּל
- דופק מהיר או לא סדיר
- מיְוֹזעָ
- תנועות בלתי נשלטות של הידיים, הרגליים, הפנים, הפה, הלשון, הלסת, השפתיים או הלחיים
- נופל

- התקפים
- כאבי גרון, צמרמורות, שיעול וסימנים אחרים של זיהום
- שתן בצבע אדום או חום

אסנאפין עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatchבאינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[) או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (http://goo.gl/c4Rm4p]http://goo.gl/c4Rm4p[) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם.http://www.upandaway.org]http://www.upandaway.org[

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת https://www.poisonhelp.org/help]https://www.poisonhelp.org/help[. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול את הדברים הבאים:

- בלבול
- תסיסה

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. יש לבדוק את המשקל שלך באופן קבוע בזמן שאתה מקבל תרופה זו.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- ספריס®

מתוקן לאחרונה - 15/07/2017

למד כיצד לצטט דף זה

האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור
AHFS®מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות®כל הזכויות שמורות. שִׁכְפוּל .4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland ,
לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 משרד הבריאות האמריקאי ושירותי אנוש
המכונים הלאומיים לבריאות
העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022