Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610015.html

阿塞那平

发音为 (a sen' a peen)

重要警告：

老年人使用：

研究表明，服用阿塞那平等抗精神病药（治疗精神疾病的药物）的老年痴呆症（一种影响记忆、清晰思考、交流和进行日常活动的能力并可能导致情绪和性格改变的脑部疾病）治疗期间死亡风险增加。患有痴呆症的老年人在治疗期间也可能有更大的机会发生中风或中风。

美国食品和药物管理局 (FDA) 未批准阿塞那平用于治疗老年痴呆症患者的行为问题。如果您、您的家人或您照顾的人患有痴呆症并正在服用阿塞那平，请咨询开这种药的医生。欲了解更多信息，请访问 FDA 网站：http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs].

与您的医生讨论服用阿塞那平的风险。

为什么要开这种药？

阿塞那平用于治疗精神分裂症的症状（一种导致思维混乱或异常、对生活失去兴趣以及强烈或不恰当情绪的精神疾病）。阿塞那平单独使用或与其他药物联合使用，以治疗或预防成人和 10 岁及以上双相儿童的躁狂发作（疯狂、异常兴奋的情绪）或混合性躁狂（疯狂、异常兴奋的情绪和抑郁症状）I 障碍（躁狂抑郁障碍；一种导致躁狂发作、抑郁发作和其他异常情绪发作的疾病）。阿塞那平属于一类称为非典型抗精神病药的药物。它通过改变大脑中某些天然物质的活动而起作用。

这个药应该怎么用？

阿塞那平作为舌下片剂出现在舌下溶解。通常每天服用两次。每天大约在同一时间服用阿塞那平。按照处方标签上的说明进行操作

仔细，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用阿塞那平。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

在您准备服用之前不要从包装中取出阿塞那平舌下片，并确保在处理片剂时手是干燥的。当您准备好服用药片时，请按照包装说明从盒中取出药片，而不要将药片推入药片包装或破坏药片。取出药片后，将其放在舌下并等待其溶解。不要吞咽、分裂、咀嚼或压碎药片。片剂溶解后 10 分钟内不要吃或喝任何东西。

您的医生可能需要增加或减少您的剂量，具体取决于药物对您的效果以及您遇到的副作用。告诉您的医生您在使用阿塞那平治疗期间的感受。

阿塞那平可能有助于控制您的症状，但不会治愈您的病情。即使您感觉良好，也要继续服用阿塞那平。不要在未咨询医生的情况下停止服用阿塞那平。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在服用阿塞那平之前，

- 如果您对阿塞那平、任何其他药物或阿塞那平舌下片中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：某些抗生素，包括加替沙星 (Tequin)（在美国不可用）和莫西沙星 (Avelox)；抗抑郁药，包括氯米帕明 (Anafranil)、度洛西汀 (Cymbalta)、氟伏沙明 (Luvox) 和帕罗西汀 (Paxil, Pexeva)；抗组胺药；右美沙芬（在 Delsym，在 Mucinex）；异丙托溴铵；治疗焦虑症和高血压的药物；某些治疗心律不齐的药物，如胺碘酮（Cordarone、Pacerone）、普鲁卡因胺、奎尼丁和索他洛尔（Betapace、Sorine）；青光眼、炎症性肠病、晕车、重症肌无力、帕金森病、溃疡或泌尿问题的药物；治疗精神疾病的药物，如氯丙嗪（Thorazine）、硫利达嗪和齐拉西酮（Geodon）；癫痫发作药物；镇静剂；安眠药; 和镇静剂。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。

- 如果您或您的家人患有或曾经患有糖尿病，请告诉您的医生；如果您有严重的腹泻或呕吐，或者您认为您可能脱水；如果您曾经使用过街头毒品或滥用处方药；如果您曾经或曾经有过伤害或自杀的想法；QT 间期延长（一种罕见的心脏问题，可能导致心律不齐、昏厥或猝死）；低血压; 心脏病; 心脏衰竭; 心跳缓慢或不规则；中风或 TIA（小中风）；癫痫发作；乳腺癌; 血液中的白细胞水平低或由您服用的药物引起的白细胞减少；血液中钾或镁含量低；血脂异常（高胆固醇水平）；难以保持平衡；任何使您难以吞咽的情况；

- 如果您怀孕了，请告诉您的医生，特别是如果您处于怀孕的最后几个月，或者您打算怀孕或正在哺乳。如果您在服用阿塞那平期间怀孕，请致电您的医生。如果在怀孕的最后几个月服用阿塞那平，可能会导致分娩后的新生儿出现问题。

- 如果您正在接受手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在服用阿塞那平。

- 你应该知道阿塞那平可能会让你昏昏欲睡。在您知道这种药物如何影响您之前，请勿驾驶汽车或操作机器。

- 在您服用阿塞那平时，向您的医生询问是否安全使用酒精饮料。酒精会使阿塞那平的副作用变得更糟。

- 您应该知道，当您从躺着的位置起床过快时，阿塞那平可能会导致头晕、头晕和昏厥。当您第一次开始服用阿塞那平时，这种情况更为常见。为了帮助避免这个问题，请慢慢起床，将双脚放在地板上几分钟，然后再站起来。

- 您应该知道，当天气变得非常热时，阿塞那平可能会使您的身体更难降温。服用阿塞那平期间，应避免过度运动，尽量待在室内，炎热天气穿得轻便，远离阳光，多喝水。

- 您应该知道，即使您还没有糖尿病，您在服用这种药物时也可能会出现高血糖症（血糖升高）。如果您患有精神分裂症，您比没有精神分裂症的人更容易患上糖尿病，服用阿塞那平或类似药物可能会增加这种风险。如果您在服用阿塞那平时出现以下任何症状，请立即告诉您的医生：极度口渴、尿频、极度饥饿、视力模糊或虚弱。一旦出现任何这些症状，立即就医是非常重要的，因为高血糖会导致一种称为酮症酸中毒的严重疾病。如果不及早治疗，酮症酸中毒可能会危及生命。酮症酸中毒的症状包括口干、恶心和呕吐、呼吸急促、

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

阿塞那平可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 口干
- 肚子痛
- 便秘
- 呕吐

- 胃灼热
- 食欲增加
- 口中唾液量增加
- 口味变化
- 牙疼
- 体重增加
- 嘴唇或嘴巴失去感觉
- 头晕，感觉不稳定或难以保持平衡
- 过度疲劳
- 不安或不断的冲动继续前进
- 易怒
- 焦虑
- 沮丧
- 难以入睡或保持睡眠
- 关节、手臂或腿部疼痛

一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，或“特别注意事项”部分中列出的症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 麻疹
- 皮疹
- 瘙痒
- 呼吸或吞咽困难
- 面部、喉咙、舌头、嘴唇、眼睛、手、脚、脚踝或小腿肿胀
- 嘶哑
- 喘息
- 发烧
- 肌肉僵硬或疼痛
- 颈部肌肉痉挛或收紧
- 困惑
- 快速或不规则的心跳
- 出汗
- 手臂、腿、脸、嘴、舌头、下巴、嘴唇或脸颊无法控制的运动
- 坠落

- 癫痫发作
- 喉咙痛、发冷、咳嗽和其他感染迹象
- 红色或棕色尿液

阿塞那平可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括以下内容：

- 困惑
- 搅动

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。在您接受这种药物治疗时，应定期检查您的体重。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 萨弗里斯®

最后修订 - 2017 年 7 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日