



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 金诺芬

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685038.html>

金诺芬

发音为 (au rane' oh fin)

为什么要开这种药?

金诺芬与休息和非药物治疗法一起用于治疗类风湿性关节炎。它可以改善关节炎症状,包括关节疼痛或触痛和肿胀以及晨僵。

这种药物有时用于其他用途;向您的医生或药剂师咨询更多信息。

这个药应该怎么用?

金诺芬以胶囊形式口服。它通常每天服用一次或两次。必须按照医生的规定定期服用才能有效。这种药物的全部作用通常在 3-4 个月内感觉不到;在某些人中,可能需要长达 6 个月的时间。仔细遵循处方标签上的说明,并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用金诺芬。不要多吃或少吃,也不要比医生开的更频繁。

该药的其他用途

金诺芬有时也用于银屑病关节炎。与您的医生讨论使用这种药物治疗您的病情可能存在的风险。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用金诺芬之前,

- 如果您对金诺芬或任何其他药物过敏,请告诉您的医生和药剂师。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用哪些处方药和非处方药,尤其是关节炎药物、苯妥英 (Dilantin) 和维生素。
- 如果您患有或曾经患有心脏、肾脏或肝脏疾病,请告诉您的医生;糖尿病;出血问题;炎症性肠病;结肠炎;皮疹;湿疹;SLE (系统性红斑狼疮);或有骨髓抑制病史。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳,请告诉您的医生。如果您在服用金诺芬时怀孕,请致电您的医生。您不应该在服用期间尝试怀孕

金诺芬或停药后至少6个月，因为它会在体内长时间停留。

- 如果您正在接受手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在服用金诺芬。
- 请注意，服用此药时不应饮酒。
- 计划避免不必要或长时间暴露在阳光下，并穿防护服和防晒霜。金诺芬可能会使您的皮肤对阳光更敏感。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

金诺芬可能会导致胃部不适。饭后或小吃后服用金诺芬。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量，并以均匀间隔服用当天剩余的剂量。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

金诺芬可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 金属味
- 稀便或腹泻
- 肚子痛
- 胃部不适
- 呕吐
- 气体
- 脱发

如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生：

- 血便或柏油样便
- 瘙痒
- 皮疹
- 咽喉痛
- 口腔溃疡
- 发烧
- 发冷
- 不寻常的瘀伤或出血
- 尿液中有血

- 疲劳

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒，请始终锁上安全帽，并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会下令进行某些实验室测试，以检查您对金诺芬的反应。

如果您进行了结核菌素 (TB) 皮肤测试，请告诉进行测试的人您服用了金诺芬。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 里道浦®

最后修订 - 2017 年 10 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022 年 3 月 25 日