Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607068.html

การฉีดอะซาซิทิดีน

ออกเสียงว่า (ไซต์ ay za 'ฉัน deen)

hy เป็นยานี้กำหนด?

Azacitidine ใช้ในการรักษาโรค myelodysplastic (กลุ่มของเงื่อนไขที่ไขกระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดที่ผิดรูปร่างและไม่ผลิตเซลล์เม็ดเลือดที่แข็งแรงเพียงพอ) Azacitidine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาดีเมทิเลชัน มันทำงานโดยช่วยให้ไขกระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดปกติและโดยการฆ่าเซลล์ที่ผิดปกติในไขกระดูก

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Azacitidine มาในรูปแบบผงที่ผสมกับน้ำและฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสำนักงานแพทย์หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล มักจะฉีดวันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน การรักษานี้อาจทำซ้ำทุกๆ 4 สัปดาห์ตราบเท่าที่แพทย์ของคุณแนะนำ โดยปกติควรให้การรักษาอย่างน้อยสี่รอบ

แพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาดยาอะซาซิทิดีนหลังจากผ่านไป 2 รอบ หากอาการของคุณไม่ดีขึ้น และหากคุณไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงของยา แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยยาอะซาซิตาดีน

แพทย์ของคุณจะจ่ายยาเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน ก่อนที่คุณจะได้รับยาอะซาซิตาดีนในแต่ละครั้ง

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ยาอะซาซิทิดีน

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ azacitidine, mannitol (Osmitrol, Resectisol) หรือยาอื่นๆ

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง

- แจ้งแพทย์หากคุณมีเนื้องอกในตับ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานอะซาซิทิดีน
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับหรือไต
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก คุณหรือคู่ของคุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะที่คุณใช้ยาอะซาซิทิดีน คุณควรใช้การคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในตัวคุณเองหรือคู่ของคุณระหว่างการรักษาด้วยยาอะซาซิทิดีน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะใช้อะซาซิทิดีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Azacitidine อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
- อย่าให้นมแม่ในขณะที่คุณใช้อะซาซิทิดีน
- หากคุณกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทำฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยาอะซาซิทิดีนอยู่

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณไม่สามารถนัดรับยา azacitidine ได้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Azacitidine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ท้องเสีย
- ท้องผูก
- แผลที่ปากหรือลิ้น
- โรคริดสีดวงทวาร
- ปวดท้องหรืออ่อนโยน
- อิจฉาริษยา
- เบืออาหาร
- ลดน้ำหนัก
- ปวดหัว
- อาการวิงเวียนศีรษะ
- ความอ่อนแอ
- เหนื่อยเหลือเกิน
- นอนหลับยากหรือหลับยาก
- ภาวะซึมเศร้า

- ความวิตกกังวล
- ปวดหลัง กล้ามเนื้อ หรือข้อ
- ปวดกล้ามเนื้อ
- เหงือออก
- เหงือออกตอนกลางคืน
- ปัสสาวะลำบากหรือปวดเมื่อปัสสาวะ
- อาการบวมที่มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง
- ผิวแห้ง
- แดง, ปวด, ช้ำ, บวม, คัน, เป็นก้อนหรือเปลี่ยนสีผิวในบริเวณที่ฉีดยา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- ผิวสีซีด
- หายใจถี่
- หัวใจเต้นเร็ว
- อาการเจ็บหน้าอก
- ไอ
- ช้ำหรือมีเลือดออกผิดปกติ
- เลือดกำเดาไหล
- มีเลือดออกที่เหงือก
- จุดสีแดงหรือสีม่วงเล็ก ๆ บนผิวหนัง
- เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ
- ลมพิษ
- ผื่น
- อาการคัน
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก

Azacitidine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยานี้?

ยานี้จะถูกเก็บไว้ในสำนักงานแพทย์หรือโรงพยาบาลที่คุณรับการรักษา

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

- ท้องเสีย
- คลื่นไส้
- อาเจียน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ azacitidine

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- วิดาซ่า®

ชื่อของเธอ

- ลาดากามัยซิน

ตรวจสอบล่าสุด - 09/01/2010

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022