Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611028.html

アジルサルタン

（ay'' zil sar'tan）と発音されます

重要な警告：

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。妊娠中の方はアジルサルタンを服用しないでください。アジルサルタンの服用中に妊娠した場合は、アジルサルタンの服用を中止し、すぐに医師に連絡してください。アジルサルタンは、妊娠の最後の6か月間に服用すると、胎児に死亡または重傷を負わせる可能性があります。

なぜこの薬が処方されているのですか？

アジルサルタンは、高血圧を治療するために、単独で、または他の薬と組み合わせて使用 されます。アジルサルタンは、アンジオテンシンII受容体拮抗薬と呼ばれる薬のクラスに属しています。これは、血管を引き締める特定の天然物質の作用をブロックすることによって機能し、血液がよりスムーズに流れ、心臓がより効率的にポンピングできるようにします。

高血圧は一般的な状態であり、治療しないと、脳、心臓、血管、腎臓、および体の他の部分に損傷を与える可能性があります。これらの臓器の損傷は、心臓病、心臓発作、心不全、脳卒中、腎不全、視力喪失、およびその他の問題を引き起こす可能性があります。薬を服用することに加えて、ライフスタイルを変えることはあなたの血圧をコントロールするのにも役立ちます。これらの変化には、脂肪と塩分が少ない食事をとること、健康的な体重を維持すること、ほとんどの日は少なくとも30分間運動すること、喫煙しないこと、適度にアルコールを使用することが含まれます。

わあ、この薬を使うべきですか？

アジルサルタンは、経口摂取するための錠剤として提供されます。通常、食事の有無にかかわらず、1日1回服用します。アジルサルタンの服用を忘れないように、毎日同じ時間に服用してください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにアジルサルタンを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

アジルサルタンは高血圧をコントロールしますが、それを治しません。アジルサルタンの完全な利点に気付くまでに約2週間かかる場合があります。気分が良くてもアジルサルタンを服用し続けてください。医師に相談せずにアジルサルタンの服用をやめないでください。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

アジルサルタンを服用する前に、

- あなたがアジルサルタン、他の薬、またはアジルサルタン錠剤の成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- 糖尿病（高血糖）があり、アリスキレン（Tekturna、Amturnide、Tekamlo、Tekturna HCT）を服用しているかどうかを医師に伝えてください。あなたが糖尿病を患っており、あなたがアリスキレンも服用している場合、あなたの医者はおそらくアジルサルタンを服用しないようにあなたに言うでしょう。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください：ベナゼプリル（ロテンシン、ロトレル）、カプトプリル（カプトプリル、カプトジド）、エナラプリル（バソテック）、フォシノプリル、リシノプリル（プリンジド、ゼストアティック）などのアンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害剤、moexipril（Univasc、Uniretic）、perindopril、（Aceon）、quinapril（Accupril、Accuretic、Quinaretic）、ramipril（Altace）、およびtrandolapril（Mavik、Tarka）; アスピリンおよびイブプロフェン（Advil、Motrin）やナプロキセン（Aleve、Naprosyn）などの他の非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）、およびセレコキシブ（Celebrex）などの選択的COX-2阻害剤。利尿薬（「水の丸薬」）; リチウム（Lithobid）; とカリウムサプリメント。
- 心不全、腎臓病、肝臓病を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- 母乳育児をしている場合は医師に相談してください。
- アジルサルタンは、横臥位からの立ち上がりが速すぎると、めまい、立ちくらみ、失神を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。これは、最初にアジルサルタンを服用し始めたときによく見られます。この問題を回避するには、ゆっくりとベッドから出て、立ち上がる前に数分間床に足を置きます。
- 下痢、嘔吐、十分な水分を飲まない、大量の発汗は血圧の低下を引き起こし、立ちくらみや失神を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。これらの問題があるかどうか、または治療中に発症した場合は、医師に相談してください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師に相談せずにカリウムを含む代替塩を使用しないでください。医師が減塩食または減塩食を処方している場合は、これらの指示に注意深く従ってください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になっている場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

アジルサルタンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 下痢

いくつかの副作用は深刻な場合があります。以下の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- めまい
- 失神

アジルサルタンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、光、過度の熱、湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。アジルサルタンに対する反応を判断するには、血圧を定期的にチェックする必要があります。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

アジルサルタン錠はにおいが目立ちます。薬に関して質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- エダルビ®

組み合わせ製品のランド名

- Edarbyclor®（アジルサルタン、クロルタリドンを含む）

最終改訂日-2018年2月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省
国立衛生研究所
ページの最終更新日：2022年3月25日