Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Memorial Sloan Kettering Cancer Center

# อะซิลซาร์แทนและคลอธาลิโดน

ข้อมูลนี้จาก Lexicomp®อธิบายสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับยานี้ รวมถึงสิ่งที่ใช้สำหรับ วิธีการใช้ ผลข้างเคียง และเวลาที่จะโทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

Memorial Sloan Kettering Cancer Center
การศึกษาผู้ป่วยและผู้ดูแล

## ชื่อยี่ห้อ: US

Edarbyclor

## ชื่อยี่ห้อ: Canada

Edarbyclor

## คำเตือน

- อย่าใช้หากคุณกำลังตั้งครรภ์ การใช้ระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกพิการแต่กำเนิดหรือสูญเสียทารกในครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ขณะใช้ยานี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

## ยานี้ใช้ทำอะไร?

- ใช้รักษาความดันโลหิตสูง

## ฉันต้องบอกแพทย์ก่อนใช้ยานี้อย่างไร?

- หากคุณแพ้ยานี้ ส่วนใดส่วนหนึ่งของยานี้ ; หรือยา อาหาร หรือสารอื่นๆ บอกแพทย์เกี่ยวกับอาการแพ้และสัญญาณที่คุณมี
- หากคุณขาดน้ำหรือปัสสาวะไม่ออก
- หากคุณกำลังใช้ยาที่มี aliskiren และคุณมีโรคเบาหวานหรือปัญหาเกี่ยวกับไต

- หากคุณกำลังให้นมบุตร ห้ามให้นมบุตรในขณะที่คุณใช้ยานี้

นี่ไม่ใช่รายการยาทั้งหมดหรือปัญหาสุขภาพที่ทำปฏิกิริยากับยานี้

แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดของคุณ (ใบสั่งยาหรือ OTC ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ วิตามิน) และปัญหาสุขภาพ คุณต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับคุณที่จะใช้ยานี้กับยาและปัญหาสุขภาพทั้งหมดของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ปรึกษาแพทย์

## ฉันต้องรู้หรือทำอะไรในขณะที่ใช้ยานี้

- บอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพทั้งหมดของคุณว่าคุณใช้ยานี้ ซึ่งรวมถึงแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ของคุณ
- หลีกเลี่ยงการขับรถและทำงานหรือการกระทำอื่น ๆ ที่เรียกร้องให้คุณตื่นตัวจนกว่าคุณจะเห็นว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร
- เพื่อลดโอกาสที่จะรู้สึกวิงเวียนหรือหมดสติ ให้ลุกขึ้นช้าๆ หากคุณนั่งหรือนอนราบ ขึ้นลงบันไดต้องระวัง
- พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนที่คุณจะดื่มแอลกอฮอล์
- อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์จึงจะเห็นผลเต็มที่
- ตรวจสอบความดันโลหิตของคุณตามที่คุณได้รับแจ้ง
- ตรวจเลือดตามที่แพทย์แจ้ง พูดคุยกับแพทย์

- หากคุณกำลังใช้สารทดแทนเกลือที่มีโพแทสเซียม ยาขับปัสสาวะที่ช่วยขับโพแทสเซียม หรือผลิตภัณฑ์โพแทสเซียม ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ
- หากคุณรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำหรือปราศจากเกลือ ให้ปรึกษาแพทย์
- พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ OTC ที่อาจเพิ่มความดันโลหิต เหล่านี้รวมถึงยาแก้ไอหรือเย็น ยาลดน้ำหนัก สารกระตุ้น ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟนหรือนาโพรเซน และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือเครื่องช่วยบางอย่าง

- ระวังโรคเกาต์กำเริบ.

- ระมัดระวังในสภาพอากาศร้อนหรือขณะเคลื่อนไหว ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อหยุดการสูญเสียของเหลว

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีเหงื่อออกมากเกินไป สูญเสียของเหลว อาเจียน หรืออุจจาระหลวม นี้อาจนำไปสู่ความดันโลหิตต่ำ

## มีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่ฉันต้องโทรหาแพทย์ทันที?

**คำเตือน/ข้อควรระวัง:**แม้ว่าจะหายาก แต่บางคนอาจมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและบางครั้งอาจถึงตายได้เมื่อทานยา บอกแพทย์หรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที หากคุณมีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงที่เลวร้ายมาก:

- สัญญาณของปฏิกิริยาภูมิแพ้ ic เช่นผื่น; ลมพิษ; อาการคัน ; ผิวแดง บวม พุพอง หรือลอก โดยมีหรือไม่มีไข้ หายใจดังเสียงฮืด ๆ ; ความรัดกุมในหน้าอกหรือลำคอ หายใจลำบาก กลืน หรือพูดคุย ; เสียงแหบผิดปกติ หรือบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ

- สัญญาณของปัญหาไต เช่น ปัสสาวะไม่ออก ปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนแปลง ปัสสาวะมีเลือดปน หรือน้ำหนักขึ้นมาก
- สัญญาณของปัญหาของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ เช่น อารมณ์แปรปรวน สับสน ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดปกติ วิงเวียนศีรษะหรือหมดสติมาก หัวใจเต้นเร็ว กระหายน้ำมากขึ้น ชัก รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแรงมาก ไม่หิว ไม่สามารถผ่านปัสสาวะหรือเปลี่ยนปริมาณของปัสสาวะที่ผลิตได้ ปากแห้ง ตาแห้ง หรือปวดท้องมากหรืออาเจียน

- รู้สึกง่วงนอน.
- ท้องผูก.
- กระสับกระส่าย

## ผลข้างเคียงอื่น ๆ ของยานี้มีอะไรบ้าง?

ยาทั้งหมดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่มีผลข้างเคียงหรือมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โทรเรียกแพทย์ของคุณหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์หากมีผลข้างเคียงหรือผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่รบกวนคุณหรือไม่หายไป:

- รู้สึกวิงเวียน เหนื่อย หรืออ่อนแรง

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ โทรหาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง

คุณอาจรายงานผลข้างเคียงต่อหน่วยงานด้านสุขภาพแห่งชาติของคุณ

คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-332-1088 นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงที่https://www.fda.gov/medwatch.

## ยานี้กินดีที่สุดอย่างไร?

ใช้ยานี้ตามคำสั่งของแพทย์ อ่านข้อมูลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณ ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างใกล้ชิด

- รับประทานพร้อมหรือไม่มีอาหาร
- ใช้ยานี้ในเวลาเดียวกันของวัน
- ใช้ยานี้ต่อไปตามที่แพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายอื่นบอก แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีก็ตาม

- ยานี้อาจทำให้คุณปัสสาวะบ่อยขึ้น เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ พยายามอย่าใช้เวลาใกล้เวลานอนมากเกินไป
- ดื่มของเหลวที่ไม่มีคาเฟอีนมาก ๆ เว้นแต่แพทย์จะสั่งให้ดื่มน้ำให้น้อยลง

## จะทำอย่างไรถ้าฉันพลาดยา?

- ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณนึกถึง
- หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมื้อต่อไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและกลับไปเป็นเวลาปกติของคุณ

- ห้ามรับประทาน 2 โดสในวันเดียวกัน

## ฉันจะเก็บและ/หรือทิ้งยานี้ได้อย่างไร?

- เก็บยาเม็ดไว้ในภาชนะเดิมที่อุณหภูมิห้อง ปิดฝาให้แน่น

- ป้องกันจากแสง

- เก็บในที่แห้ง ห้ามเก็บในห้องน้ำ
- เก็บยาทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัย เก็บยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

- ทิ้งยาที่ไม่ได้ใช้หรือหมดอายุ อย่าทิ้งชักโครกหรือเทลงท่อระบายน้ำเว้นแต่คุณจะได้รับคำสั่งให้ทำเช่นนั้น ตรวจสอบกับเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยา อาจมีโปรแกรมรับยาคืนในพื้นที่ของคุณ

## ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาทั่วไป

- หากอาการหรือปัญหาสุขภาพของคุณไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

- อย่าแบ่งปันยาของคุณกับผู้อื่นและอย่าใช้ยาของคนอื่น
- ยาบางชนิดอาจมีแผ่นพับข้อมูลผู้ป่วยอื่น หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดพูดคุยกับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ

- ยาบางชนิดอาจมีแผ่นพับข้อมูลผู้ป่วยอื่น ตรวจสอบกับเภสัชกรของคุณ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดพูดคุยกับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ

- หากคุณคิดว่ามีการใช้ยาเกินขนาด ให้โทรติดต่อศูนย์ควบคุมพิษของคุณหรือรับการรักษาพยาบาลทันที พร้อมทีจะบอกหรือแสดงว่าถ่ายอะไรไป เท่าไหร่ และเมื่อไรเกิดขึ้น

## การใช้ข้อมูลผู้บริโภคและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั่วไปนี้เป็นข้อมูลสรุปการวินิจฉัย การรักษา และ/หรือยาอย่างจำกัด ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ครอบคลุมและควรใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและ/หรือประเมินทางเลือกในการวินิจฉัยและการรักษาที่เป็นไปได้ ไม่รวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไข การรักษา ยา ผลข้างเคียง หรือความเสี่ยงที่อาจใช้กับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษาของผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยพิจารณาจากการตรวจและประเมินสถานการณ์เฉพาะของผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพให้ครบถ้วน

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ คำถามทางการแพทย์ และทางเลือกในการรักษา รวมถึงความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยา ข้อมูลนี้ไม่รับรองการรักษาหรือยาใดๆ ว่าปลอดภัย มีประสิทธิภาพ หรือได้รับการอนุมัติสำหรับการรักษาผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง UpToDate, Inc. และบริษัทในเครือขอปฏิเสธการรับประกันหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้หรือการใช้งานข้อมูลดังกล่าว การใช้ข้อมูลนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานซึ่งมีอยู่ที่

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-efficiness-terms.

## วันที่ตรวจสอบล่าสุด

2020-04-13

## ลิขสิทธิ์

© 2022 UpToDate, Inc. และบริษัทในเครือและ/หรือผู้อนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อสมาชิกทีมดูแลสุขภาพของคุณโดยตรง หากคุณเป็นผู้ป่วยที่ MSK และต้องติดต่อผู้ให้บริการหลังเวลา 17.00 น. ในช่วงสุดสัปดาห์หรือในวันหยุด โปรดโทรไปที่ 212-639-2000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.mskcc.org/peเพื่อค้นหาห้องสมุดเสมือนของเรา

Azil sar tan and Ch lor thal idone - Last updated on Apr il 14, 2022
Al lr ig h ts เป็นเจ้าของและสงวนไว้โดย Memor ial Sloan Ketter ing Cancer Center