Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Azilsartan en chloortalidon

Deze informatie van Lexicom®legt uit wat u moet weten over dit medicijn, inclusief waarvoor het wordt gebruikt, hoe u het moet innemen, de bijwerkingen en wanneer u uw zorgverlener moet bellen.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

PATINT- EN VERZORGEROPLEIDING

Merknamen: VS

Edarbyclor

Merknamen: Canada

Edarbyclor

Waarschuwing

- Niet innemen als u zwanger bent. Gebruik tijdens de zwangerschap kan geboorteafwijkingen of verlies van de ongeboren baby veroorzaken. Als u zwanger wordt of van plan bent zwanger te worden terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Waar wordt dit medicijn voor gebruikt?

- Het wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.

Wat moet ik mijn arts vertellen VOORDAT ik dit medicijn neem?

- Als u allergisch bent voor dit medicijn; enig onderdeel van dit medicijn; of andere drugs, voedingsmiddelen of stoffen. Vertel uw arts over de allergie en welke tekenen u had.
- Als u uitgedroogd bent of niet kunt plassen.
- Als u een geneesmiddel gebruikt dat aliskiren bevat en u heeft ook diabetes of nierproblemen.

- Als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit is geen lijst van alle medicijnen of gezondheidsproblemen die met dit medicijn te maken hebben.

Vertel uw arts en apotheker over al uw medicijnen (op recept of OTC, natuurlijke producten, vitamines) en gezondheidsproblemen. U moet controleren of het veilig voor u is om dit medicijn te gebruiken met al uw medicijnen en gezondheidsproblemen. Begin, stop of verander de dosis van geen enkel geneesmiddel zonder overleg met uw arts.

Wat zijn enkele dingen die ik moet weten of doen terwijl ik dit medicijn gebruik?

- Vertel al uw zorgverleners dat u dit medicijn gebruikt. Dit omvat uw artsen, verpleegkundigen, apothekers en tandartsen.
- Vermijd autorijden en andere taken of handelingen uit te voeren waarvoor u alert moet zijn totdat u ziet welk effect dit medicijn op u heeft.
- Om de kans op duizeligheid of flauwvallen te verkleinen, dient u langzaam op te staan als u heeft gezeten of gelegen. Wees voorzichtig met trappen op en af gaan.
- Praat met uw arts voordat u alcohol drinkt.
- Het kan enkele weken duren voordat het volledige effect zichtbaar is.
- Controleer uw bloeddruk zoals u is verteld.
- Laat uw bloed controleren zoals de arts u heeft verteld. Praat met de dokter.
- Als u een zoutvervanger gebruikt die kalium bevat, een kaliumsparend diureticum of een kaliumproduct, overleg dan met uw arts.
- Als u een zoutarm of zoutvrij dieet volgt, overleg dan met uw arts.
- Praat met uw arts voordat u OTC-producten gebruikt die de bloeddruk kunnen verhogen. Deze omvatten medicijnen tegen hoest of verkoudheid, dieetpillen, stimulerende middelen, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen of naproxen, en sommige natuurlijke producten of hulpmiddelen.
- Pas op voor jichtaanvallen.

- Wees voorzichtig bij warm weer of als u actief bent. Drink veel vocht om vochtverlies te stoppen.
- Vertel het uw arts als u te veel zweet, vochtverlies, overgeven of dunne ontlasting heeft. Dit kan leiden tot een lage bloeddruk.

Wat zijn enkele bijwerkingen waarover ik meteen mijn arts moet bellen?

WAARSCHUWING/LET OP: Hoewel het zeldzaam kan zijn, kunnen sommige mensen zeer slechte en soms dodelijke bijwerkingen krijgen bij het nemen van een medicijn. Vertel het uw arts of schakel onmiddellijk medische hulp in als u een van de volgende tekenen of symptomen heeft die verband kunnen houden met een zeer ernstige bijwerking:

- Tekenen van een allergische reactie, zoals uitslag; netelroos; jeuk; rode, gezwollen, blaren of schilferende huid met of zonder koorts; piepende ademhaling beklemd gevoel op de borst of keel; moeite met ademhalen, slikken of praten; ongebruikelijke heesheid; of zwelling van de mond, het gezicht, de lippen, de tong of de keel.
- Tekenen van nierproblemen zoals niet kunnen plassen, verandering in de hoeveelheid urine, bloed in de urine of een grote gewichtstoename.
- Tekenen van vocht- en elektrolytenproblemen zoals stemmingswisselingen, verwardheid, spierpijn of spierzwakte, een hartslag die niet normaal aanvoelt, zeer erge duizeligheid of flauwvallen, snelle hartslag, meer dorst, toevallen, zich erg moe of zwak voelen, geen hongerig gevoel, niet kunnen plassen of verandering in de hoeveelheid geproduceerde urine, droge mond, droge ogen of zeer ernstige maagklachten of overgeven.
- Slaperig voelen.
- Constipatie.
- Rusteloosheid.

Wat zijn enkele andere bijwerkingen van dit medicijn?

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Veel mensen hebben echter geen bijwerkingen of hebben slechts kleine bijwerkingen. Bel uw arts of zoek medische hulp als een van deze bijwerkingen of andere bijwerkingen u storen of niet verdwijnen:

- Duizelig, moe of zwak voelen.

Dit zijn niet alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

U kunt bijwerkingen melden aan uw nationale gezondheidsinstantie.

U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-332-1088. U kunt bijwerkingen ook melden op:https://www.fda.gov/medwatch.

Hoe kan dit medicijn het beste worden ingenomen?

Gebruik dit medicijn zoals voorgeschreven door uw arts. Lees alle aan u verstrekte informatie. Volg alle instructies nauwkeurig op.

- Neem met of zonder voedsel.
- Neem dit medicijn op hetzelfde tijdstip van de dag.
- Blijf dit geneesmiddel gebruiken zoals uw arts of andere zorgverlener u heeft verteld, zelfs als u zich goed voelt.
- Dit medicijn kan ervoor zorgen dat u vaker moet plassen. Om te voorkomen dat u slaapproblemen krijgt, moet u proberen niet te dicht bij bedtijd te komen.
- Drink veel niet-cafeïne vloeistoffen, tenzij uw arts u heeft verteld om minder vloeistof te drinken.

Wat moet ik doen als ik een dosis mis?

- Neem een vergeten dosis in zodra u eraan denkt.
- Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale tijd.
- Neem geen 2 doses op dezelfde dag.

Hoe bewaar en/of gooi ik dit medicijn weg?

- Bewaar tabletten in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Houd de dop goed gesloten.
- Bescherm tegen licht.

- Op een droge plaats bewaren. Bewaar niet in een badkamer.
- Bewaar alle medicijnen op een veilige plaats. Houd alle medicijnen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Gooi ongebruikte of verlopen medicijnen weg. Spoel niet door een toilet of giet het niet in een afvoer, tenzij u wordt gevraagd dit te doen. Neem contact op met uw apotheker als u vragen heeft over de beste manier om medicijnen weg te gooien. Mogelijk zijn er in uw omgeving programma's voor het terugnemen van medicijnen.

Algemene drugsfeiten

- Als uw symptomen of gezondheidsproblemen niet verbeteren of erger worden, neem dan contact op met uw arts.
- Deel uw drugs niet met anderen en gebruik geen drugs van iemand anders.
- Sommige geneesmiddelen hebben mogelijk een andere patiëntenbijsluiter. Als u vragen heeft over dit medicijn, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige, apotheker of andere zorgverlener.
- Sommige medicijnen hebben mogelijk een andere patiëntenbijsluiter. Raadpleeg uw apotheker. Als u vragen heeft over dit medicijn, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige, apotheker of andere zorgverlener.
- Als u denkt dat er sprake is van een overdosis, bel dan uw antigifcentrum of schakel onmiddellijk medische hulp in. Wees klaar om te vertellen of te laten zien wat er is genomen, hoeveel en wanneer het is gebeurd.

Gebruik en disclaimer voor consumenteninformatie

Deze algemene informatie is een beperkte samenvatting van diagnose-, behandelings- en/of medicatie-informatie. Het is niet bedoeld om alomvattend te zijn en moet worden gebruikt als een hulpmiddel om de gebruiker te helpen potentiële diagnostische en behandelingsopties te begrijpen en/of te beoordelen. Het bevat NIET alle informatie over aandoeningen, behandelingen, medicijnen, bijwerkingen of risico's die van toepassing kunnen zijn op een specifieke patiënt. Het is niet bedoeld als medisch advies of vervanging van medisch advies, diagnose of behandeling van een zorgverlener op basis van het onderzoek en de beoordeling door de zorgverlener van de specifieke en unieke omstandigheden van een patiënt. Patiënten moeten met een zorgverlener spreken voor volledige

informatie over hun gezondheid, medische vragen en behandelingsopties, inclusief eventuele risico's of voordelen met betrekking tot het gebruik van medicijnen. Deze informatie onderschrijft geen behandelingen of medicijnen als veilig, effectief of goedgekeurd voor de behandeling van een specifieke patiënt. UpToDate, Inc. en haar gelieerde ondernemingen wijzen elke garantie of aansprakelijkheid af met betrekking tot deze informatie of het gebruik ervan. Het gebruik van deze informatie is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op:
https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical- Effectiveness-terms.

Datum laatste beoordeling

2020-04-13

auteursrechten

© 2022 UpToDate, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Als u vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact op met een lid van uw zorgteam. Als u patiënt bent bij MSK en u moet na 17.00 uur, in het weekend of op een feestdag een zorgverlener bereiken, bel dan 212-639-2000.

Ga voor meer bronnen naarwww.mskcc.org/peom onze virtuele bibliotheek te doorzoeken.

Azil sar tan en Ch lor thal idone - Laatst bijgewerkt op 14 april 2022
Alle eigendommen en voorbehouden aan Memor ial Sloan Kettering Cancer Center