Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a618033.html

巴瑞替尼

发音为 (bar" i sye' ti nib)

注意：

2019冠状病毒病治疗：

Baricitinib 目前正在研究用于治疗需要补充氧气、呼吸机或需要体外膜氧合（ECMO；一种向血液中添加氧气的装置）的人群中的 2019 年冠状病毒病 (COVID-19)。FDA 已批准紧急使用授权（ EUA ），以允许分发 baricitinib 以治疗因 COVID-19感染住院的某些成人和 2 岁及以上儿童。

重要警告：

服用巴瑞替尼可能会降低您抵抗感染的能力并增加您发生严重感染的风险，包括通过身体传播的严重真菌、细菌或病毒感染。这些感染可能需要在医院进行治疗，并可能导致死亡。如果您经常感染任何类型的感染，或者您认为您现在可能感染任何类型的感染，请告诉您的医生。这包括轻微感染（例如开放性伤口或疮）、来来去去的感染（例如唇疱疹）以及不会消失的慢性感染。如果您患有或曾经患有糖尿病、人类免疫缺陷病毒 (HIV)、获得性免疫缺陷综合征 (AIDS)、肺部疾病或任何其他影响您的免疫系统的疾病，请告诉您的医生。如果您居住或曾经居住在俄亥俄河或密西西比河谷等严重真菌感染更为常见的地区，您还应该告诉您的医生。如果您正在服用降低免疫系统活性的药物，请告诉您的医生，例如：阿巴西普（奥伦西亚）；阿达木单抗（修美乐）；阿那白滞素（Kineret）；硫唑嘌呤（Azasan，Imuran）；赛妥珠单抗（Cimzia）；环孢素（Gengraf、Neoral、Sandimmune）；依那西普（Enbrel）；戈利木单抗（辛波尼）；英夫利昔单抗（Remicade）；来氟米特（Arava）；甲氨蝶呤（Otrexup；Rasuvo，Trexall）；利妥昔单抗（Rituxan）；sarilumab (Kevzara)；类固醇，包括地塞米松、甲基强的松龙 (Medrol)、强的松龙 (Prelone) 和强的松 (Rayos)；托珠单抗（Actemra）；和托法替尼（Xeljanz）。如果您正在服用降低免疫系统活性的药物，请告诉您的医生，例如：阿巴西普（奥伦西亚）；阿达木单抗（修美乐）；阿那白滞素（Kineret）；硫唑嘌呤（Azasan，Imuran）；赛妥珠单抗（Cimzia）；环孢素（Gengraf、Neoral、Sandimmune）；依那西普（Enbrel）；戈利木单抗（辛波尼）；英夫利昔单抗（Remicade）；来氟米特（Arava）；甲氨蝶呤（Otrexup；Rasuvo，Trexall）；利妥昔单抗（Rituxan）；sarilumab (Kevzara)；类固醇，包括地塞米松、甲基强的松龙 (Medrol)、强的松龙 (Prelone) 和强的松 (Rayos)；托珠单抗（Actemra）；和托法替尼（Xeljanz）。如果您正在服用降低免疫系统活性的药物，请告诉您的医生，例如：阿巴西普（奥伦西亚）；阿达木单抗（修美乐）；阿那白滞素（Kineret）；硫唑嘌呤（Azasan，Imuran）；赛妥珠单抗（Cimzia）；环孢素（Gengraf、Neoral、Sandimmune）；依那西普（Enbrel）；戈利木单抗（辛波尼）；英夫利昔单抗（Remicade）；来氟米特（Arava）；甲氨蝶呤（Otrexup；Rasuvo，Trexall）；利妥昔单抗（Rituxan）；sarilumab (Kevzara)；类固醇，包括地塞米松、甲基强的松龙 (Medrol)、强的松龙 (Prelone) 和强的松 (Rayos)；托珠单抗（Actemra）；和托法替尼（Xeljanz）。沙地免疫）；依那西普（Enbrel）；戈利木单抗（辛波尼）；英夫利昔单抗（Remicade）；来氟米特（Arava）；甲氨蝶呤（Otrexup；Rasuvo，Trexall）；利妥昔单抗（Rituxan）；sarilumab (Kevzara)；类固醇，包括地塞米松、甲基强的松龙 (Medrol)、强的松龙 (Prelone) 和强的松 (Rayos)；托珠单抗（Actemra）；和托法替尼（Xeljanz）。沙地免疫）；依那西普（Enbrel）；戈利木单抗（辛波尼）；英夫利昔单抗（Remicade）；来氟米特（Arava）；甲氨蝶呤（Otrexup；Rasuvo，Trexall）；利妥昔单抗（Rituxan）；sarilumab (Kevzara)；类固醇，包括地塞米松、甲基强的松龙 (Medrol)、强的松龙 (Prelone) 和强的松 (Rayos)；托珠单抗（Actemra）；和托法替尼（Xeljanz）。

您的医生将在您治疗期间和治疗后监测您是否有感染迹象。如果您在开始治疗之前有以下任何症状，或者您遇到以下任何一种情况

在治疗期间或治疗后不久出现症状，请立即就医：发烧；出汗; 发冷; 肌肉疼痛; 咳嗽; 气促; 减肥; 温暖、红色或疼痛的皮肤；皮肤上的疮；排尿时有频繁、疼痛或灼热的感觉；腹泻或过度疲劳。

您可能已经感染了肺结核（TB；一种严重的肺部感染），但没有任何疾病症状。在这种情况下，服用巴瑞替尼可能会使您的感染更加严重并导致您出现症状。您的医生将进行皮肤测试，以查看您在使用巴瑞替尼治疗之前和期间是否有非活动性结核感染。如有必要，您的医生会在您开始服用巴瑞替尼之前给您治疗这种感染的药物。告诉您的医生您是否患有或曾经患有结核病，是否曾居住或访问过结核病常见的国家，或者您是否曾与患有结核病的人接触。如果您有以下任何结核病症状，或者如果您在治疗期间出现任何这些症状，请立即就医：咳嗽、咳出带血的粘液、体重减轻、肌张力下降或发烧。

服用巴瑞替尼可能会增加患淋巴瘤（始于抗感染细胞的癌症）或其他类型癌症（包括肺癌和皮肤癌）的风险。如果您患有或曾经患有任何类型的癌症，请告诉您的医生。如果您吸烟或曾经吸烟，请告诉您的医生。

服用巴瑞替尼可能会导致严重或危及生命的心脏问题，例如心脏病发作或中风，或肺部或腿部出现严重或危及生命的血栓。如果您吸烟或曾经吸烟，请告诉您的医生。如果有或曾经有过心脏病发作或其他心脏问题，请告诉您的医生；中风; 腿部、手臂或肺部或动脉中的血块；高胆固醇; 高血压; 或糖尿病。如果您在治疗期间出现以下任何副作用，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：胸痛或胸闷；手臂、背部、颈部、下巴或胃部疼痛；冒出冷汗；头晕目眩；面部、手臂或腿部麻木或虚弱；说话缓慢或困难；呼吸急促或呼吸困难；咳嗽; 或痛苦，温暖，

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些测试以检查您的身体对巴瑞替尼的反应。

当您开始使用巴瑞替尼治疗以及每次重新配药时，您的医生或药剂师都会给您制造商的患者信息表（药物指南）。仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。您也可以访问美国食品和药物管理局 (FDA) 网站

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 或制造商的网站获取用药指南。

与您的医生讨论服用巴瑞替尼的风险。

为什么要开这种药?

Baricitinib 单独使用或与其他药物一起用于治疗对一种或多种肿瘤坏死因子 (TNF) 抑制剂反应不佳的成人类风湿性关节炎（身体攻击自身关节导致疼痛、肿胀和功能丧失的情况）药物。Baricitinib 属于一类称为 Janus 激酶 (JAK) 抑制剂的药物。它通过降低免疫系统的活动而起作用。

这个药应该怎么用？

Baricitinib 以片剂形式出现，可口服。它通常每天一次在有或没有食物的情况下服用。每天大约在同一时间服用巴瑞替尼。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用巴瑞替尼。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

如果您无法吞咽药片，您可以将它们放入一个小玻璃杯中，然后将它们溶解在大约 2 茶匙 (10 mL) 的室温水中。将内容物旋转几次并立即吞下混合物。喝完混合物后，再向玻璃杯中加入 10 mL 水。将内容物旋转几次并吞下混合物。

如果您遇到某些严重的副作用，您的医生可能需要暂时或永久停止治疗。请务必告诉您的医生您在治疗期间的感受。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在服用巴瑞替尼之前，

- 如果您对巴瑞替尼、任何其他药物或巴瑞替尼片剂中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及重要警告部分中列出的药物或以下内容：丙磺舒（Probalan，在 Col-Probenecid 中）。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 如果您有未确诊的胃痛，或者您是否患有或曾经患有溃疡（胃或肠壁溃疡）、憩室炎（大肠壁肿胀）、贫血（较低比正常数量的红细胞）、带状疱疹（带状疱疹；过去曾患过水痘的人可能出现的皮疹）、癌症、包括乙型肝炎或丙型肝炎在内的肝病或肾病。
- 如果您怀孕或计划怀孕，请告诉您的医生。如果您在服用巴瑞替尼期间怀孕，请致电您的医生。
- 如果您正在母乳喂养，请告诉您的医生。服用巴瑞替尼时不要母乳喂养。
- 如果您最近接种或计划接种任何疫苗，请告诉您的医生。在没有与医生交谈的情况下，在治疗期间不要接种任何疫苗。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

巴瑞替尼可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 恶心

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状或“重要警告”部分中列出的症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 麻疹; 面部、眼睛、嘴唇或喉咙肿胀；吞咽或呼吸困难
- 胃痛，尤其是伴有发烧、腹泻或便秘时
- 呼吸急促、疲倦或皮肤苍白

巴瑞替尼可能会导致您的血液胆固醇水平升高。在您使用巴瑞替尼治疗期间，您的医生会下令进行测试以监测您的胆固醇水平。与您的医生讨论服用这种药物的风险。

巴瑞替尼可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒，请始终锁上安全帽，并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗?

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

在进行任何实验室测试之前，请告诉您的医生和实验室人员您正在服用巴瑞替尼。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 奥卢安特®

最后修订 - 2022 年 2 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日