Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697047.html

Bicalutamidă

pronunțat ca (bye ka loo' ta mide)

de ce este prescris acest medicament?

Bicalutamida este utilizată cu un alt medicament (agonişti ai hormonului de eliberare a gonadotropinei (GnRH); cum ar fi leuprolida sau goserelina) pentru a trata cancerul de prostată metastatic (cancer care a început la prostată şi s-a răspândit în alte părţi ale corpului). Bicalutamida face parte dintr-o clasă de medicamente numite antiandrogeni nesteroidieni. Acționează prin blocarea efectului androgenului (un hormon masculin), pentru a opri creșterea și răspândirea celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Bicalutamida vine sub formă de tablete pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia cu sau fără alimente o dată pe zi, fie dimineața, fie seara. Luați bicalutamidă aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Ar trebui să începeți să luați bicalutamidă în aceeași zi în care începeți să vă injectați hormonul de eliberare a hormonului luteinizant. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați bicalutamidă exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Bicalutamida împreună cu hormonul de eliberare a hormonului luteinizant poate ajuta la oprirea creșterii și răspândirii celulelor canceroase, dar nu vindecă cancerul de prostată. Continuați să luați atât bicalutamidă, cât și hormonul de eliberare a hormonului luteinizant, chiar dacă vă simțiți mai bine. Nu încetați să luați aceste medicamente fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua bicalutamidă,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la bicalutamidă, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele comprimatelor de bicalutamidă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: alprazolam (Xanax); anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin); aripiprazol (Abilify); buspirona (Buspar); blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc),

diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), felodipină (Plendil), nifedipină (Adalat, Procardia), nisoldipină (Sular) și verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); clorfeniramină; medicamente care scad colesterolul (statine), cum ar fi atorvastatin (Lipitor), lovastatin (Mevacor) și simvastatin (Zocor); claritromicină (Biaxin); ciclosporină (Neoral, Sandimmune); diazepam (Valium); eritromicină (EES, E-Mycin, Eritrocină); inhibitori de protează HIV, cum ar fi indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir) și saquinavir (Invirase, Fortovase); metadonă (dolofină); midazolam (Versed); pimozidă (Orap); chinidină (Quinidex, Quinaglute); chinină; sildenafil (Viagra); tacrolimus (Prograf); tamoxifen (Nolvadex); telitromicină (Ketek); trazodonă (Desyrel); triazolam (Halcion); si vincristina (Vincasar). Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu bicalutamida,

- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică.
- trebuie să știți că bicalutamida este destinată numai bărbaților. Dacă este luată de femeile însărcinate, bicalutamida poate provoca anomalii la făt. Femeile care sunt sau pot rămâne însărcinate nu trebuie să ia bicalutamidă. Dacă luați bicalutamidă în timp ce sunteți gravidă, sunați imediat medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Bicalutamida poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

- bufeuri sau înroșire
- dureri osoase, de spate sau pelvine
- slabiciune musculara
- dureri musculare sau articulare
- durere de cap
- dificultăți de respirație
- creșterea tensiunii arteriale
- umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare
- tuse
- constipație
- greaţă
- vărsături
- durere abdominală

- diaree
- gaz
- modificarea in greutate (pierdere sau crestere)
- pierderea poftei de mâncare
- ameţeală
- durere, arsură sau furnicături în mâini sau picioare
- dificultăți de somn
- senzație de neliniște sau teamă
- eczemă
- transpiraţie
- incapacitatea de a obține sau de a menține o erecție
- trebuie să urinezi frecvent în timpul nopții
- urină sângeroasă
- urinare dureroasă sau dificilă
- nevoie frecventă și urgentă de a urina
- dificultate la golirea vezicii urinare
- sânii dureroși sau umflați

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:

- îngălbenirea pielii sau a ochilor
- durere în partea dreaptă sus a stomacului
- oboseală extremă
- sângerări sau vânătăi neobișnuite
- lipsa de energie
- stomac deranjat
- pierderea poftei de mâncare
- simptome asemănătoare gripei
- durere laterală surdă sau ascuțită
- dureri în piept

Bicalutamida poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la bicalutamidă.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Casodex®

Ultima revizuire - 15.01.2018

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022