Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682125.html

ブレオマイシン

（blee'' oh mye'sin）と発音されます

重要な警告：

ブレオマイシンは、重度または生命を脅かす肺の問題を引き起こす可能性があります。重度の肺の問題は、高齢の患者やこの薬を高用量で服用している患者でより一般的に発生する可能性があります。肺疾患を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください：呼吸困難、息切れ、喘鳴、発熱、または悪寒。

リンパ腫の治療のためにブレオマイシン注射を受けた人の中には、重度のアレルギー反応を示した人もいます。この反応は、ブレオマイシンの最初または2回目の投与が行われた直後または数時間後に発生する可能性があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください：呼吸困難、発熱、悪寒、失神、めまい、かすみ目、胃のむかつき、または錯乱。

あなたは医療施設で薬の各用量を受け取り、あなたが薬を受け取っている間とその後、あなたの医者はあなたを注意深く監視します。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はブレオマイシンに対するあなたの体の反応をチェックするために特定のテストを命じます。

なぜこの薬が処方されているのですか？

ブレオマイシン注射は、頭頸部がん（口、唇、頬、舌、口蓋、喉、舌、副鼻腔のがんを含む）および陰茎、睾丸、子宮頸部のがんを治療するために、単独で、または他の薬剤と組み合わせて使用 されます。外陰部（膣の外側部分）。ブレオマイシンは、ホジキンリンパ腫（ホジキン病）および非ホジキンリンパ腫（免疫系の細胞で発生する癌）を他の薬剤と組み合わせて治療するためにも使用されます。また、癌性腫瘍によって引き起こされる胸水（体液が肺に溜まる状態）の治療にも使用されます。ブレオマイシンは、がんの化学療法でのみ使用される抗生物質の一種です。それはあなたの体の癌細胞の成長を遅らせるか、または止めます。

わあ、この薬を使うべきですか？

ブレオマイシンは、液体と混合され、静脈内（静脈内）、筋肉内（筋肉内）、または皮下（皮膚の下）に、診療所または病院の外来部門の医師または看護師によって注射される粉末として提供されます。通常、週に1〜2回注射されます。ブレオマイシンを使用して胸水を治療する場合、ブレオマイシンは液体と混合され、胸腔チューブ（皮膚の切り傷から胸腔内に配置されるプラスチックチューブ）を介して胸腔内に配置されます。

この薬の用途

ブレオマイシンは、後天性免疫不全症候群（AIDS）に関連するカポジ肉腫の治療にも使用されることがあります。
あなたの状態のためにこの薬を使用することのリスクについてあなたの医者に相談してください。

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ブレオマイシンを服用する前に、

- ブレオマイシンまたはブレオマイシン注射の成分のいずれかにアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- あなたが服用している、または服用する予定の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品を医師と薬剤師に伝えてください。あなたの医者は副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 腎臓や肺の病気にかかったことがあるか、今までにあったかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。ブレオマイシン注射を受けている間は妊娠しないでください。ブレオマイシンの投与中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。ブレオマイシンは胎児に害を及ぼす可能性があります。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、ブレオマイシンを投与されていることを医師または歯科医に伝えてください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

ブレオマイシンの投与予約を逃した場合は、できるだけ早く医師に連絡してください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ブレオマイシンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 皮膚の発赤、水疱、圧痛、または肥厚
- 肌の色が濃くなる
- 発疹
- 脱毛

- 口や舌の痛み
- 嘔吐
- 食欲減少
- 減量

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載されている症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 体の片側の顔、腕、または脚の突然のしびれまたは脱力感
- 突然の混乱や話し方や理解の困難
- 突然のめまい。バランスまたは調整の喪失
- 突然の激しい頭痛
- 胸痛
- 排尿の減少

ブレオマイシンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話（1-800-332-1088）。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- ブレオマイシン®¶

¶-このブランドの製品はもう市場に出ていません。一般的な代替手段が利用できる場合があります。

最終改訂日-2011年8月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日