



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → [波生坦](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605001.html>

波生坦

发音为 (boe sen' tan)

重要警告:

对于男性和女性患者:

波生坦可能会导致肝损伤。如果您患有或曾经患有肝病,请告诉您的医生。在您开始服用波生坦之前和治疗期间的每个月,您的医生会下令进行血液检查,以确保您的肝脏正常工作。与您的医生和实验室保持所有约会。波生坦在引起症状之前可能会损害肝脏。定期验血是在肝损伤变得永久性和严重之前发现肝损伤的唯一方法。如果您出现以下任何症状,请立即就医:恶心、呕吐、发烧、胃痛、皮肤或眼睛发黄或极度疲倦。如果您出现副作用或实验室结果异常,您的医生可能会减少您的剂量,或者暂时或永久停止使用波生坦治疗。

对于女性患者:

如果您怀孕或计划怀孕,请勿服用波生坦。波生坦可能会伤害胎儿。如果您能够怀孕,您将需要在开始治疗前、治疗期间的每个月以及治疗后的1个月内进行妊娠试验,以证明您没有怀孕。您的医生将为您订购妊娠试验。您必须在治疗期间和治疗后1个月内使用可靠的避孕方法。激素避孕药(避孕药、贴片、避孕环、注射剂、植入物和宫内节育器)在与波生坦一起使用时可能效果不佳,不应作为您唯一的避孕方法。与您的医生讨论适合您的避孕方法。在大多数情况下,您需要使用两种避孕方式。

如果您有无保护性行为、认为您的避孕失败、错过一段时间或认为您在服用波生坦期间可能怀孕,请立即致电您的医生。不要等到您的下一次约会与您的医生讨论这个问题。

如果您是尚未进入青春期的女性患者的父母或监护人,请定期检查您的孩子,看看她是否出现任何青春期迹象(乳芽、阴毛),并让她的医生知道任何变化。

由于存在肝损伤和出生缺陷的风险，波生坦只能通过名为 Tracleer 风险评估和缓解策略计划 (Tracleer REMS) 的受限计划获得。为了接受波生坦，您和您的医生必须在 Tracleer REMS 注册，并遵守计划要求，例如每月一次肝功能和妊娠测试。您的医生会将您注册到该计划中。波生坦仅在某些在 Tracleer REMS 注册的药店有售。如果您对如何配药有任何疑问，请咨询您的医生或药剂师。

当您开始使用波生坦治疗以及每次重新配药时，您都会收到制造商的患者信息表（药物指南）。每次仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。您还可以从 FDA 网站获取药物指南：<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

与您的医生讨论服用波生坦的风险。

为什么要开这种药？

波生坦用于治疗成人和 3 岁及以上儿童的肺动脉高压（PAH，将血液输送到肺部的血管中的高血压）。波生坦可以提高 PAH 患者的运动能力并减缓症状恶化。波生坦属于一类称为内皮素受体拮抗剂的药物。它通过阻止内皮素的作用起作用，内皮素是一种天然物质，可导致血管变窄并阻止 PAH 患者的正常血流。

这个药应该怎么用？

波生坦以片剂和可分散片剂（可溶解在液体中的片剂）的形式口服。它通常在早上和晚上每天两次在有或没有食物的情况下服用。为了帮助您记住服用波生坦，每天大约在同一时间服用。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用波生坦。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

如果您正在服用分散片，请在服用前将片剂放入少量液体中。如果您的医生告诉您服用半片药片，请将分散片小心折断。按照指示服用半片，将另一半放回包装中打开的泡罩中。在 7 天内使用另一半片剂。不要将分散片分成四等份。

您的医生可能会让您开始服用低剂量的波生坦，并在 4 周后增加您的剂量。

波生坦可以控制 PAH 的症状，但不能治愈它。您可能需要 1 到 2 个月或更长时间才能感受到波生坦的全部益处。即使您感觉良好，也要继续服用波生坦。不要在未咨询医生的情况下停止服用波生坦。如果您突然停止服用波生坦，您的症状可能会变得更糟。您的医生可能会逐渐减少您的剂量。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

服用波生坦前，

- 如果您对波生坦、任何其他药物或波生坦片或分散片中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。
- 服用波生坦时不要服用环孢素（Gengraf、Neoral、Sandimmune）或格列本脲（DiaBeta、Glynase）。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：胺碘酮（Nexterone, Pacerone）；降胆固醇药物（他汀类药物），例如阿托伐他汀（立普妥，在Caduet）、洛伐他汀（Altoprev）和辛伐他汀（Flolopid, Zocor, 在Vytorin）；地尔硫卓（Cardizem、Cartia、Diltzac等）；红霉素（EES、Eryc、PCE）；氟康唑（大氟康）；吉非罗齐（Lopid）；伊曲康唑（Onmel, Sporanox）；酮康唑；利福平（Rifadin, Rimactane, 在Rifater, Rifamate）；利托那韦（Norvir, 在Kaletra, Viekira Pak, Technivie）；伏立康唑（Vfend）；和华法林（香豆素，扬托文）。许多其他药物也可能与波生坦相互作用，因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物，甚至那些没有出现在这个列表中的。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 如果您患有或曾经患有心力衰竭（心脏无法将足够的血液泵入身体其他部位的情况），请告诉您的医生。
- 如果您正在母乳喂养或计划母乳喂养，请告诉您的医生。您的医生可能会告诉您在服用波生坦期间不要进行母乳喂养。
- 如果您患有苯丙酮尿症（PKU，一种遗传性疾病，必须遵循特殊饮食以防止可能导致严重智力残疾的大脑损伤），您应该知道分散片中添加了苯丙氨酸来源阿斯巴甜。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

与您的医生讨论服用这种药物时喝葡萄柚汁的问题。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

波生坦可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 头痛
- 冲洗

- 流鼻涕、喉咙痛和其他感冒症状
- 关节疼痛

一些副作用可能很严重。以下症状并不常见，但如果您遇到任何症状或重要警告部分中列出的症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 麻疹; 皮疹; 瘙痒; 呼吸或吞咽困难; 面部、喉咙、舌头、嘴唇和眼睛肿胀; 嘶哑; 发烧; 淋巴结肿大; 疲倦
- 脚、脚踝或小腿肿胀，体重突然增加，呼吸困难比正常情况更严重
- 新的或恶化的呼吸急促; 有或没有血液的新的或恶化的咳嗽; 胸痛; 快速、剧烈或不规则的心跳
- 昏厥
- 头晕; 苍白的肤色; 气促; 弱点; 快速、剧烈或不规则的心跳

给予类似于波生坦药物的雄性实验动物的睾丸出现问题，并且产生的精子（雄性生殖细胞）比正常人少。目前尚不清楚波生坦是否会损害睾丸或减少男性产生的精子数量。如果您将来想生孩子，请与您的医生讨论服用波生坦的风险。

波生坦可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [https://www.poisonhelp.org/help]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括以下内容：

- 头痛
- 恶心
- 呕吐
- 快速的心跳
- 昏厥
- 出汗
- 头晕
- 模糊的视野

我应该知道其他信息吗？

不要让其他人服用您的药物。向您的医生询问有关重新填写处方的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 示踪剂[®]

最后修订 - 2022 年 1 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS[®]患者用药信息[™]。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会[®]，4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022年3月25日