Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.



Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699003.html

# capecitabina

**pronunciado como (ka pe site' a been)**

**ADVERTENCIA IMPORTANTE:**

La capecitabina puede causar hemorragias graves o potencialmente mortales cuando se toma junto con anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin®). Informe a su médico si está tomando warfarina. Su médico ordenará pruebas de laboratorio para controlar qué tan rápido coagula su sangre y es posible que necesite cambiar su dosis de warfarina. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: sangrado inusual; vomitar o escupir sangre o material marrón que se asemeja a café molido; heces con sangre o negras, alquitranadas; sangre en la orina; orina de color rojo o marrón oscuro; o moretones fáciles.

## ¿Por qué se prescribe este medicamento?

La capecitabina se usa en combinación con otros medicamentos para tratar el cáncer de mama que ha regresado después del tratamiento con otros medicamentos. También se usa solo para tratar el cáncer de mama que no ha mejorado después del tratamiento con otros medicamentos. La capecitabina también se usa para tratar el cáncer de colon o recto (cáncer que comienza en el intestino grueso) que ha empeorado o se ha diseminado a otras partes del cuerpo. También se usa para prevenir la propagación del cáncer de colon en personas que se han sometido a una cirugía para extirpar el tumor. La capecitabina pertenece a una clase de medicamentos llamados antimetabolitos. Actúa deteniendo o retardando el crecimiento de las células cancerosas.

## ¿Cómo se debe usar este medicamento?

La capecitabina viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma dos veces al día (por la mañana y por la noche) durante 2 semanas, seguido de un descanso de 1 semana antes de repetir el siguiente ciclo de dosificación. Por lo general, se toma después de una comida (dentro de los 30 minutos posteriores al desayuno y la cena) y con un vaso de agua. Su médico decidirá cuántas veces debe repetir este ciclo. Tome capecitabina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la capecitabina exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico. Su médico puede ajustar su dosis de capecitabina o suspender su tratamiento por un período de tiempo dependiendo de su respuesta al tratamiento y cualquier efecto secundario que experimente.

Trague las tabletas enteras; no los parta, mastique ni triture.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

### Otros usos de este medicamento

La capecitabina también se usa a veces para tratar el cáncer gástrico avanzado (cáncer de estómago). Hable con su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

## ¿Qué precauciones especiales debo seguir?

### Antes de tomar capecitabina,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la capecitabina, al fluorouracilo (Adrucil, 5-FU), a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las tabletas de capecitabina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar los medicamentos enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE y cualquiera de los siguientes: fenitoína (Dilantin), leucovorina y ácido fólico (en multivitaminas). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Otros medicamentos también pueden interactuar con la capecitabina, así que asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista.
- informe a su médico si le han dicho que tiene o alguna vez ha tenido deficiencia de la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) (falta de una enzima natural en su cuerpo). Es probable que su médico le diga que no tome capecitabina.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido enfermedad renal, hepática o cardíaca.
- Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. No debe planear tener hijos mientras esté tomando capecitabina. Debe utilizar un método anticonceptivo fiable para evitar el embarazo en usted o en su pareja durante su tratamiento con capecitabina. La capecitabina puede dañar al feto. Informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar durante su tratamiento con capecitabina.

## ¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

## ¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

### ¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

**La capecitabina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:**

- dolor de estómago o malestar estomacal
- constipación

- pérdida de apetito
- cambio en la capacidad de saborear los alimentos
- aumento de la sed
- cansancio o debilidad inusual
- mareo
- dolor de cabeza
- perdida de cabello
- erupción cutanea
- dolor de espalda, articulaciones o músculos
- ojos rojos, hinchados, con picazón o llorosos
- problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido

**Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato:**

- Diarrea
- náuseas
- vómitos
- llagas en la boca
- hinchazón, dolor, enrojecimiento o descamación de la piel en las palmas de las manos y las plantas de los pies
- fiebre, escalofríos, dolor de garganta u otros signos de infección
- hinchazón de las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas
- dolor o presión en el pecho
- latidos cardíacos acelerados
- orina oscura
- coloración amarillenta de la piel o los ojos

La capecitabina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono (1-800-332-1088).

## ¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

## n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

### Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

- Diarrea
- náuseas
- vómitos
- dolor de estómago
- fiebre, escalofríos, dolor de garganta u otros signos de infección
- heces negras y alquitranadas
- orina roja
- hematomas o sangrado inusuales
- cansancio o debilidad inusual

## ¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la capecitabina.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

**nombres aleatorios**

- Xeloda®

Última revisión - 15/01/2018

Aprende a citar esta página

Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022