TITLE - CARBAMAZEPINE / TEGRETOL TEGRITAL
MEDICATION PATIENT INFORMATION
IN PORTUGUESE

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682237.html

Carbamazepina

pronunciado como (kar ba maz' e peen)

AVISO IMPORTANTE:

A carbamazepina pode causar reações alérgicas com risco de vida chamadas síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) ou necrólise epidérmica tóxica (NET). Estas reações alérgicas podem causar danos graves à pele e órgãos internos. O risco de SSJ ou TEN é maior em pessoas de ascendência asiática que têm um fator de risco genético (herdado). Se você é asiático, seu médico geralmente solicitará um teste para verificar se você tem o fator de risco genético antes de prescrever carbamazepina. Se você não tem esse fator de risco genético, seu médico pode prescrever carbamazepina, mas ainda há um pequeno risco de você desenvolver SSJ ou NET. Ligue para o seu médico imediatamente se desenvolver uma erupção cutânea dolorosa, urticária, bolhas ou descamação da pele, hematomas fáceis, feridas na boca ou febre durante o tratamento com carbamazepina.

A carbamazepina pode diminuir o número de células sanguíneas produzidas pelo seu corpo. Em casos raros, o número de células sanguíneas pode diminuir o suficiente para causar problemas de saúde graves ou com risco de vida. Informe o seu médico se já teve depressão da medula óssea (diminuição do número de células sanguíneas) ou quaisquer outras doenças do sangue, especialmente se foi causada por outro medicamento. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: dor de garganta, febre, arrepios ou outros sinais de infeção que surgem e desaparecem ou não desaparecem; falta de ar; fadiga; sangramento ou hematomas incomuns, como sangramento menstrual intenso, sangramento do nariz ou sangramento nas gengivas; pequenos pontos ou manchas vermelhas ou roxas na pele; ou feridas na boca..

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns exames laboratoriais antes e durante o seu tratamento para verificar a resposta do seu corpo à carbamazepina.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando iniciar o tratamento com carbamazepina e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o site da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

por que este medicamento é prescrito?

A carbamazepina é usada sozinha ou em combinação com outros medicamentos para controlar certos tipos de convulsões em pessoas com epilepsia. Também é usado para tratar a neuralgia do trigêmeo (uma condição que causa dor no nervo facial). Cápsulas de liberação prolongada de carbamazepina (somente marca Equetro) também são usadas para tratar episódios de mania (humor frenético, anormalmente excitado ou irritado) ou episódios mistos (sintomas de mania e depressão que ocorrem ao mesmo tempo) em pacientes com transtorno bipolar I. transtorno maníaco-depressivo; uma doença que causa episódios de depressão, episódios de mania e outros humores anormais). A carbamazepina está em uma classe de medicamentos chamados anticonvulsivantes. Funciona reduzindo a atividade elétrica anormal no cérebro.

como este medicamento deve ser usado?

A carbamazepina vem como um comprimido, um comprimido mastigável, um comprimido de liberação prolongada (ação prolongada), uma cápsula de liberação prolongada e uma suspensão (líquida) para tomar por via oral. O comprimido regular, o comprimido mastigável e a suspensão são geralmente tomados duas a quatro vezes ao dia com as refeições. O comprimido de liberação prolongada (Tegretol XR) geralmente é tomado duas vezes ao dia com as refeições. A cápsula de liberação prolongada (Carbatrol, Equetro) geralmente é tomada duas vezes ao dia com ou sem refeições. Para ajudá-lo a se lembrar de tomar carbamazepina, tome-o aproximadamente nos mesmos horários todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome carbamazepina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Engula os comprimidos de liberação prolongada inteiros; não os parta, mastigue ou esmague. As cápsulas de liberação prolongada podem ser abertas e as esferas no interior polvilhadas sobre os alimentos, como uma colher de chá de compota de maçã ou alimentos semelhantes. Não esmague ou mastigue as cápsulas de liberação prolongada ou as esferas dentro delas.

Agite bem a suspensão antes de cada uso para misturar o medicamento uniformemente.

O seu médico começará com uma dose baixa de carbamazepina e aumentará gradualmente a sua dose.

A carbamazepina pode ajudar a controlar sua condição, mas não a cura. Pode levar algumas semanas ou mais até que você sinta todos os benefícios da carbamazepina. Continue a tomar carbamazepina mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar carbamazepina sem falar com o seu médico, mesmo se sentir efeitos secundários como alterações invulgares no comportamento ou humor. Se você tiver um distúrbio convulsivo e de repente parar de tomar carbamazepina, suas convulsões podem piorar. O seu médico provavelmente irá diminuir a sua dose gradualmente.

outros usos para este medicamento

A carbamazepina também é usada às vezes para tratar doenças mentais, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, abstinência de drogas e álcool, síndrome das pernas inquietas, diabetes insipidus, certas síndromes de dor e uma doença em crianças chamada coreia. Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar carbamazepina,

- informe o seu médico e farmacêutico se tem alergia (erupção cutânea, pieira, urticária, dificuldade em engolir ou respirar, inchaço da face, olhos, pálpebras, lábios ou língua) à carbamazepina, amitriptilina (Elavil), amoxapina, clomipramina (Anafranil), desipramina (Norpramin), doxepina (Silenor, Zonalon), imipramina (Tofranil), nortriptilina (Pamelor), oxcarbazepina (Trileptal), protriptilina (Vivactil), outros medicamentos para convulsões, como fenobarbital, fenitoína (Dilantin, Phenytek) ou primidona (Mysoline), quaisquer outros medicamentos ou qualquer um dos ingredientes das preparações de carbamazepina. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação para obter uma lista dos ingredientes.
- informe o seu médico se estiver a tomar nefazadona ou certos inibidores não nucleósidos da transcriptase reversa (NNRTIs), como delavirdina (Rescriptor). Seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar carbamazepina com esses medicamentos. Além disso, informe o seu médico se estiver tomando um inibidor da monoamina oxidase (MAO), como isocarboxazida (Marplan), linezolida (Zyvox), azul de metileno, fenelzina (Nardil), selegilina (Eldepryl, Emsam, Zelapar) e tranilcipromina (Parnate) , ou se você parou de tomar um inibidor da MAO nos últimos 14 dias. O seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar carbamazepina. Se você parar de tomar carbamazepina, deve esperar pelo menos 14 dias antes de começar a tomar um inibidor da MAO.

- informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: acetaminofeno (Tylenol); acetazolamida (Diamox); albendazol (Albenza); alprazolam (Panax); aminofilina; anticoagulantes ("diluentes do sangue"), como apixabana (Eliquis), dabigatrana (Pradaxa), edoxabana (Savaysa), rivaroxabana (Xarelto) e varfarina (Coumadin, Jantoven); antidepressivos como amitriptilina (Elavil), bupropiona (Wellbutrin, Zyban), buspirona (BuSpar), citalopram (Celexa), clomipramina (Anafranil), desipramina (Norpramin), fluoxetina (Prozac, Sarafem), fluvoxamina (Luvox), mirtazapina (Remeron)), nortriptilina (Pamelor); antifúngicos como fluconazol (Diflucan), itraconazol (Onmel, Sporanox), cetoconazol, e voriconazol (Vfend); aprepitant (Emend); aripiprazol (Abilify); buprenorfina (Butrans, Sublocade); bupropiona (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); cimetidina (Tagamet); ciprofloxacina; cisplatina (Platinol); corticosteróides como dexametasona e prednisolona (Prelone); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); clonazepam (Klonopin); clozapina (Clozaril); ciclofosfamida; ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dalfopristina e quinupristina (Synercid); danazol (Danocrina); dantroleno (Dantrium); diltiazem (Cardizem, Diltzac, Tiazac, outros); diuréticos (pílulas de água); doxorrubicina (Adriamicina, Rubex); doxiciclina (Vibramicina); eritromicina (EES, E-Micina, Eritrocina); eslicarbazepina (Aptiom); everolimus (Afinitor, Zortress); felodipina (Plendil); haloperidol (Haldol); Inibidores da protease do HIV, incluindo atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), lopinavir (no Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, no Kaletra) e saquinavir (Fortovase, Invirase); ibuprofeno (Advil); imatinib (Glivec); isoniazida (INH, Laniazid, em Rifater); levotiroxina (Levoxyl, Synthroid); lítio (Lithobid); loratadina (Claritina); lorazepam (Ativan); loxapina (Adasuve); certos medicamentos para tratar a malária, como cloroquina (Aralen) e mefloquina; medicamentos para ansiedade ou doença mental; outros medicamentos para convulsões, como etossuximida (Zarontin), felbamato (Felbatol), fosfenitoína (Cerebyx); lamotrigina (Lamictal), mesuximida (Celontin), oxcarbazepina (Trileptal), fenobarbital, fensuximida (Milontin) (não disponível nos EUA), fenitoína (Dilantin, Phenytek), primidona (Mysoline), tiagabina (Gabitril), topiramato (Topamax) , e ácido valpróico (Depakene, Depakote); lapatinibe; metadona (Dolofina, Metadose); midazolam; niacinamida (nicotinamida, vitamina B3); olanzapina; omeprazol; oxibutinina; propoxifeno (Darvon); praziquantel (Biltricide); quetiapina; quinina; rifampina (Rifadin, Rimactane); risperidona; sedativos; sertralina (Zoloft); sirolimus; pílulas para dormir; tacrolimus (Prograf); tadalafil (Adcirca, Cialis); temsirolimus (Torisel); terfenadina (Seldane) (não disponível nos EUA); teofilina (Theo-24, Theochron, outros); ticlopidina; tramadol (Ultram); tranquilizantes; trazodona; troleandomicina (TAO); verapamil (Calan, Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidona (Geodon) e zonisamida (Zonegran). Muitos outros medicamentos também podem interagir com rifampina (Rifadin, Rimactane); risperidona; sedativos; sertralina (Zoloft); sirolimus; pílulas para dormir; tacrolimus (Prograf); tadalafil (Adcirca, Cialis); temsirolimus (Torisel); terfenadina (Seldane) (não disponível nos EUA); teofilina (Theo-24, Theochron, outros); ticlopidina; tramadol (Ultram); tranquilizantes; trazodona; troleandomicina (TAO); verapamil (Calan, Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidona (Geodon) e zonisamida (Zonegran). Muitos outros medicamentos também podem interagir com rifampina (Rifadin, Rimactane); risperidona; sedativos; sertralina (Zoloft); sirolimus; pílulas para dormir; tacrolimus (Prograf); tadalafil (Adcirca, Cialis); temsirolimus (Torisel); terfenadina (Seldane) (não disponível nos EUA); teofilina (Theo-24, Theochron, outros); ticlopidina; tramadol (Ultram); tranquilizantes; trazodona; troleandomicina (TAO); verapamil (Calan, Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidona (Geodon) e zonisamida (Zonegran). Muitos outros medicamentos também podem interagir com Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidona (Geodon) e zonisamida (Zonegran). Muitos outros medicamentos também podem interagir com Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidona (Geodon) e zonisamida (Zonegran). Muitos outros medicamentos também podem interagir com

carbamazepina, por isso certifique-se de informar o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

- se estiver a tomar outros medicamentos líquidos, não os tome ao mesmo tempo que a suspensão de carbamazepina.
- informe o seu médico se você tem ou já teve glaucoma (uma condição na qual o aumento da pressão no olho pode levar à perda gradual da visão); ou doenças cardíacas, renais, da tireóide ou do fígado.
- você deve saber que a carbamazepina pode diminuir a eficácia dos contraceptivos hormonais (pílulas anticoncepcionais, adesivos, anéis, injeções, implantes ou dispositivos intrauterinos). Use outra forma de controle de natalidade enquanto estiver tomando carbamazepina. Informe o seu médico se tiver hemorragia vaginal inesperada ou se pensa estar grávida enquanto estiver a tomar carbamazepina.
- informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. A carbamazepina pode prejudicar o feto. Se engravidar enquanto estiver a tomar carbamazepina, contacte o seu médico imediatamente.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar carbamazepina.
- você deve saber que a carbamazepina pode deixá-lo sonolento. Não conduza um carro ou opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.
- lembre-se que o álcool pode aumentar a sonolência causada por este medicamento.
- você deve saber que sua saúde mental pode mudar de maneiras inesperadas e você pode se tornar suicida (pensar em se machucar ou se matar ou planejar ou tentar fazê-lo) enquanto estiver tomando carbamazepina para o tratamento de epilepsia, doença mental ou outras condições. Um pequeno número de adultos e crianças com 5 anos de idade ou mais (cerca de 1 em 500 pessoas) que tomaram anticonvulsivantes como a carbamazepina para tratar várias condições durante os estudos clínicos tornaram-se suicidas durante o tratamento. Algumas dessas pessoas desenvolveram pensamentos e comportamentos suicidas uma semana depois de começarem a tomar a medicação. Existe o risco de sofrer alterações na sua saúde mental se tomar um medicamento anticonvulsivante como carbamazepina, mas também pode haver o risco de você experimentar mudanças em sua saúde mental se sua condição não for tratada. Você e seu médico decidirão se os riscos de tomar um medicamento anticonvulsivante são maiores do que os riscos de não tomar o medicamento. Você, sua família ou seu cuidador devem ligar para seu médico imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas: ataques de pânico; agitação ou inquietação; irritabilidade, ansiedade ou depressão nova ou agravada; agindo em impulsos perigosos; dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo; comportamento agressivo, raivoso ou violento; mania (humor frenético e anormalmente excitado); falar ou pensar em querer se machucar ou acabar com sua vida; afastamento de amigos e familiares; preocupação com a morte e o morrer; dando bens valiosos; ou quaisquer outras mudanças incomuns de comportamento ou humor.
- se você tem intolerância à frutose (uma condição hereditária na qual o corpo não tem a proteína necessária para quebrar a frutose [um açúcar de frutas encontrado em certos adoçantes como o sorbitol]), você deve saber que a suspensão oral é adoçada com sorbitol. Informe o seu médico se tiver intolerância à frutose.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Fale com o seu médico sobre comer toranja ou beber sumo de toranja enquanto estiver a tomar este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A carbamazepina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- tontura
- pensando anormal
- dificuldade em falar
- agitação incontrolável de uma parte do corpo
- constipação
- boca seca

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você apresentar algum destes sintomas ou aqueles listados nas seções ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES e PRECAUÇÕES ESPECIAIS, chame seu médico imediatamente:

- confusão
- irritação na pele
- batimentos cardíacos rápidos, lentos ou acelerados
- amarelecimento da pele ou olhos
- urina escura
- dor no lado direito da área do estômago
- perda de apetite
- náusea
- vômito
- alterações na visão
- fadiga
- inchaço do rosto, olhos, pálpebras, lábios ou língua
- dificuldade em engolir ou respirar
- dor de cabeça, número novo ou aumentado de convulsões, dificuldade de concentração, confusão, fraqueza ou instabilidade
- erupção cutânea grave com um ou mais dos seguintes: febre, dores musculares ou articulares, olhos vermelhos ou inchados, bolhas ou descamação da pele, feridas na boca ou inchaço do rosto ou pescoço

A carbamazepina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente, longe da luz, excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

- inconsciência
- convulsões
- inquietação
- Espamos musculares
- movimentos anormais
- agitação de uma parte do seu corpo que você não pode controlar
- instabilidade
- sonolência
- tontura
- alterações na visão
- respiração irregular ou lenta

- batimento cardíaco rápido ou acelerado
- náusea
- vômito
- dificuldade em urinar

Quais outras informações devo saber?

Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a tomar carbamazepina.

A carbamazepina pode interferir nos resultados dos testes de gravidez caseiros. Fale com o seu médico se pensa que pode estar grávida enquanto estiver a tomar carbamazepina. Não tente testar a gravidez em casa.

O comprimido de liberação prolongada não se dissolve no estômago após a ingestão. Ele libera lentamente o medicamento à medida que passa pelo sistema digestivo. Você pode notar o revestimento do comprimido em suas fezes.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Carbatrol®
- Epítolo®
- Equetro®
- Tegretol®
- Tegretol®-XR

Última revisão - 15/05/2020

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação

para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022