Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615001.html

カスポファンギン注射

（kas'' poe fun'jin）と発音します

JAPANESE

なぜこの薬が処方されているのですか？

カスポファンギン注射は、血液、胃、肺、食道（喉と胃をつなぐ管）の酵母感染症や、ではうまく治療できなかった特定の真菌感染症を治療するために、3か月以上の成人と子供に使用されます他の薬。また、感染と戦う能力が弱まっている人々の深刻な真菌感染症の治療にも使用されます。カスポファンギン注射は、エキノカンジンと呼ばれる抗真菌薬のクラスに含まれています。感染の原因となる真菌の増殖を遅らせることで機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

カスポファンギン注射は、液体と混合され、1日1回約1時間かけて静脈内（静脈内）に注射される粉末として提供されます。あなたの治療の長さはあなたの一般的な健康状態、あなたが持っている感染症のタイプ、そしてあなたが薬にどれだけうまく反応するかによって異なります。あなたは病院でカスポファンギン注射を受けるかもしれません、あるいはあなたは家で薬を投与するかもしれません。自宅でカスポファンギン注射を受ける場合は、医療提供者が薬の使用方法を教えてくれます。これらの指示を理解していることを確認し、質問がある場合は医療提供者に尋ねてください。

あなたの医者はカスポファンギン注射の標準的な用量であなたを始めて、あなたが薬へのあなたの反応とあなたが経験するどんな副作用にも応じてあなたの用量を増やすかもしれません。治療中の気分について医師に相談してください。

カスポファンギン注射による治療の最初の数日間は気分が良くなるはずです。症状が改善または悪化しない場合は、医師に相談してください。カスポファンギンの注射を終えてもまだ感染症の症状がある場合は、医師に相談してください。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

カスポファンギン注射を受ける前に、

- カスポファンギン、他の薬、またはカスポファンギン注射の成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。

- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください：カルバマゼピン（カルバマゼピン、テグレトール）、シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）、デキサメタゾン、エファビレンツ（Sustiva、Atripla）、ネビラピン（Viramune）、フェニトイン（Dilantin、Phenytek）、リファンピン（Rifad 、リマクタン、リファメート、リファター）、およびタクロリムス（プログラフ）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。他の多くの薬もカスポファンギン注射と相互作用する可能性があるため、このリストに記載されていない薬も含め、服用しているすべての薬について医師に必ず伝えてください。
- 肝疾患を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。カスポファンギン注射を受けている間に妊娠した場合は、医師に連絡してください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

カスポファンギン注射は副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 手、足、足首、または下肢の腫れ
- 静脈の痛み、発赤、腫れ
- 下痢
- 吐き気
- 嘔吐
- 胃痛
- 背中の痛み
- 頭痛

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

- 顔、喉、舌、唇の腫れ
- 嗄声
- 嚥下障害または呼吸困難
- 呼吸困難
- 喘鳴
- 暖かさの感覚
- 発熱、悪寒、咳、またはその他の感染症の兆候
- 水ぶくれや皮膚の剥離
- じんましん

- 発疹
- かゆみ
- 速いハートビート
- 極度の倦怠感
- 異常な出血またはあざ
- エネルギーの欠乏
- 食欲減少
- 胃の右上部分の痛み
- 皮膚や目の黄変
- インフルエンザのような症状

カスポファンギン注射は他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話（1-800-332-1088）。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はカスポファンギン注射に対するあなたの体の反応をチェックするために特定の臨床検査を命じます。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- カスポファンギン®

最終改訂日-2019年6月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日