Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682731.html

Inyección de cefazolina

pronunciado como (sef a' zoe lin)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de cefazolina se usa para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluidas infecciones de la piel, los huesos, las articulaciones, los genitales, la sangre, las válvulas cardíacas, las vías respiratorias (incluida la neumonía), las vías biliares y las vías urinarias. La inyección de cefazolina también se puede usar antes, durante y, a veces, durante un breve período después de la cirugía para evitar que el paciente contraiga una infección. La inyección de cefazolina pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos de cefalosporina. Funciona matando bacterias.

Los antibióticos como la inyección de cefazolina no funcionarán para los resfriados, la gripe u otras infecciones virales. Tomar antibióticos cuando no son necesarios aumenta el riesgo de contraer una infección más adelante que resista el tratamiento con antibióticos.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de cefazolina viene en forma de polvo para mezclar con líquido o como producto premezclado para inyectar por vía intravenosa (en una vena) durante un período de 30 minutos. La inyección de cefazolina también se puede administrar por vía intramuscular (en un músculo). Por lo general, se administra cada 6, 8 o 12 horas. La duración de su tratamiento depende del tipo de infección que tenga y de cómo su cuerpo responda al medicamento.

Puede recibir la inyección de cefazolina en un hospital o puede administrar el medicamento en casa. Si va a recibir la inyección de cefazolina en casa, su proveedor de atención médica le mostrará cómo usar el medicamento. Asegúrese de entender estas instrucciones y consulte a su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.

Debería comenzar a sentirse mejor durante los primeros días de tratamiento con la inyección de cefazolina. Si sus síntomas no mejoran o empeoran, llame a su médico.

Use la inyección de cefazolina hasta que termine la receta, incluso si se siente mejor. Si deja de usar la inyección de cefazolina demasiado pronto u omite dosis, es posible que su infección no se trate por completo y que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos.

Otros usos de este medicamento

La inyección de cefazolina también se usa a veces para ciertos pacientes alérgicos a la penicilina que tienen una afección cardíaca y se someten a un procedimiento dental o del tracto respiratorio superior (nariz, boca, garganta, laringe), para evitar que desarrollen una infección de la válvula cardíaca. La inyección de cefazolina también se usa a veces para tratar a ciertas mujeres alérgicas a la penicilina que están en trabajo de parto para evitar que el recién nacido desarrolle una infección.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir la inyección de cefazolina,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la cefazolina; antibióticos carbapenémicos; otros antibióticos cefalosporínicos como cefaclor, cefadroxilo, cefdinir, cefditoren (Spectracef), cefepima (Maxipime), cefixima (Suprax), cefotaxima (Claforan), cefotetán, cefoxitina (Mefoxin), cefpodoxima, cefprozil, ceftarolina (Teflaro), ceftazidima (Fortaz , Tazicef, en Avycaz), ceftibuten (Cedax), ceftriaxona (Rocephin), cefuroxima (Zinacef) y cefalexina (Keflex); antibióticos de penicilina; o cualquier otro medicamento. También informe a su médico si es alérgico a alguno de los ingredientes de la inyección de cefazolina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar el probenecid (Probalan). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad gastrointestinal (GI; que afecta el estómago o los intestinos), especialmente colitis (afección que causa inflamación en el revestimiento del colon [intestino grueso]) o enfermedad renal.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma la inyección de cefazolina, llame a su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Use la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No use una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de cefazolina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- picor genital
- manchas blancas en la boca
- pérdida de apetito

- acidez
- gas
- náuseas
- vómitos
- Diarrea
- dolor de cabeza
- mareo
- confusión
- debilidad
- cansancio
- somnolencia
- dolor, enrojecimiento, hinchazón o sangrado cerca del lugar donde se inyectó la cefazolina

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de usar la inyección de cefazolina y llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- heces acuosas o con sangre, calambres estomacales o fiebre durante el tratamiento o hasta dos o más meses después de suspender el tratamiento
- erupción
- urticaria
- Comezón
- dificultad para respirar o tragar
- ampollas, descamación o desprendimiento de la piel
- hinchazón en piernas y pies
- disminución de la micción
- orina oscura
- coloración amarillenta de la piel o los ojos
- dolor en la parte superior derecha del estomago
- desmayo
- un regreso de la fiebre, dolor de garganta, escalofríos u otros signos de infección

La inyección de cefazolina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras usa este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Su proveedor de atención médica le dirá cómo almacenar su medicamento. Guarde su medicamento solo según las indicaciones. Asegúrese de entender cómo almacenar su medicamento correctamente.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

- convulsiones

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la inyección de cefazolina.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del laboratorio que está recibiendo la inyección de cefazolina.

Si es diabético y analiza su orina para detectar azúcar, use Clinistix o TesTape (no Clinitest) para analizar su orina mientras toma este medicamento.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Ancef®
- Kefzol®

Última revisión - 15/06/2016

Aprende a citar esta página

Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022