Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

عنوانURL لهذه الصفحة: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601206.html

سيفوروكسيم

تنطقك (se fyoor ox 'eem)

لماذاوصف هذا الدواء؟

يستخدمسيفوروكسيم لعلاج بعض أنواع العدوى التي تسببها البكتيريا ، مثل التهاب الشعب الهوائية (عدوى أنابيب مجرى الهواء المؤديةإلى الرئتين) ؛ السيلان (مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي) ؛ داء لايم (عدوى قد تتطور بعد لدغة قراد) ؛ والتهابات الجلدوالأذنين والجيوب الأنفية والحلق واللوزتين والمسالك البولية. ينتمي سيفوروكسيم إلى فئة من الأدوية تسمى المضادات الحيويةللسيفالوسبورين. وهو يعمل عن طريق وقف نمو البكتيريا.

لنتعمل المضادات الحيوية مثل سيفوروكسيم مع نزلات البرد أو الأنفلونزا أو أي عدوى فيروسية أخرى. يزيد استخدام المضادات الحيويةعندما لا تكون هناك حاجة إليها من خطر الإصابة بعدوى تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية.

فكيفيستعمل هذا الدواء؟

يأتيسيفوروكسيم على شكل قرص ومعلق (سائل) ليأخذ عن طريق الفم. عادة ما يتم تناوله كل 12 ساعة لمدة 5-10 أيام ، حسب الحالةالتي يتم علاجها. لعلاج مرض السيلان ، يتم تناول سيفوروكسيم كجرعة وحيدة ، ولعلاج مرض لايم ، يتم تناول سيفوروكسيم كل12 ساعة لمدة 20 يوماً. خذ التعليق مع الطعام. يمكن تناول الجهاز اللوحي مع الطعام أو بدونه. خذ سيفوروكسيم في نفس الأوقاتتقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزءلا تفهمه. خذ سيفوروكسيم تماماً حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

يمتصالجسم منتجات سيفوروكسيم المختلفة بطرق مختلفة ولا يمكن استبدالها ببعضها البعض. إذا كنت بحاجة إلى التبديل منمنتج سيفوروكسيم إلى آخر ، فقد يحتاج طبيبك إلى تعديل جرعتك.

قمبرج المعلق جيداً قبل كل استخدام لخلط الدواء بالتساوي.

يجبابتلاع الأقراص كاملة. لأن القرص المسحوق له طعم مر قوي ، لا ينبغي سحق القرص. يجب على الأطفال الذين لا يستطيعونابتلاع القرص بالكامل تناول السائل بدلاً من ذلك.

يجبأن تبدأ في الشعور بالتحسن خلال الأيام القليلة الأولى من العلاج باستخدام سيفوروكسيم. إذا لم تتحسن الأعراض أو تزداد سوءاً ،فاتصل بطبيبك.

خذسيفوروكسيم حتى تنتهي من الوصفة الطبية ، حتى لو كنت تشعر بتحسن. إذا توقفت عن تناول سيفوروكسيم في وقت مبكر جداًأو تخطيت الجرعات ، فقد لا يتم علاج العدوى بشكل كامل ، وقد تصبح البكتيريا مقاومة

للمضادات‌الحيوية.

هناك‌استخدامات لهذا الدواء

يستخدم‌سيفوروكسيم أحياناً أيضاً لعلاج الالتهاب الرئوي. تحدث إلى طبيبك حول مخاطر استخدام هذا الدواء لحالتك.

يمكن‌وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعةالاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل‌تناول سيفوروكسيم ،

- أخبرطبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من سيفوروكسيم. مضادات حيوية أخرى من السيفالوسبورين مثل سيفاكلور ، سيفادروكسيل ،سيفازولين (أنسف ، كيفزول) ، سيفدينير ، سيفديتورين (سبكتريسف) ، سيفيبيم (ماكسيبيم) ، سيفيكسيم ،سيفوتاكسيم (كلافوران) ، سيفوتيتان ، سيفودوكسيتين (سيفودوكسيتين) تيفلارو) ، سيفتازيديم (فورتاز ، تازيسيف ،في أفيكاز) ، سيفتيبوتين (سيداكس) ، سيفترياكسون (روسفين) ، سيفاليكسين (كيفليكس) ؛ المضادات الحيوية البنسلين.أو أي أدوية أخرى. أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من مكونات أقراص أو معلق سيفوروكسيم.اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.

- أخبرطبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولهاأو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: مضادات التخثر (مميعات الدم) مثل الوارفارين (كومادين ، جانتوفين) ، سيميتيدين ،مدرات البول (حبوب الماء) ، فاموتيدين (بيبسيد) ، نيزاتيدين (أكسيد) ، أوميبرازول (بريلوسيك ، في Zegerid) ، بانتوبرازول(بروتونيكس) ، بروبينيسيد (بروبلان) ورانيتيدين (زانتاك). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك‌بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.

- إذاكنت تتناول مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم أو الألومنيوم ، فتناولها قبل ساعة واحدة على الأقل أو بعد ساعتين من‌سيفوروكسيم.
- أخبرطبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من مرض معدي معوي (يؤثر على المعدة أو الأمعاء) ، وخاصة التهاب القولون (حالةتسبب تورم في بطانة القولون [الأمعاء الغليظة]) ، أو أمراض الكلى أو الكبد.

- يجب‌أن تعلم أن سيفوروكسيم يقلل من فعالية بعض موانع الحمل الفموية (حبوب منع الحمل). ستحتاج إلى استخدام شكل‌آخر من وسائل منع الحمل أثناء تناول هذا الدواء. تحدث إلى طبيبك حول طرق أخرى لمنع الحمل أثناء تناول هذا الدواء.
- أخبرطبيبك إذا كنت حاملاً‌أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا أصبحت حاملاً‌أثناء تناول سيفوروكسيم ، فاتصل بطبيبك.
- إذاكنت تعاني من بيلة الفينيل كيتون (PKU ، وهي حالة وراثية يجب اتباع نظام غذائي خاص لمنع تلف دماغك الذي يمكن أن‌يسبب إعاقة ذهنية شديدة) ، يجب أن تعلم أن معلق سيفوروكسيم محلى بالأسبارتام الذي يشكل فينيل ألانين.

قبعةتعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبعةيجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

خذالجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان وقت الجرعة التالية تقريباً ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد.لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض أ

غاب‌عن واحد.

الآثارالجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قديسبب سيفوروكسيم آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- غثيان
- التقيؤ
- إسهال

بعض‌الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أياً من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على‌الفور أو احصل على علاج طبي طارئ:

- متسرع
- متلهف،متشوق
- قشعريرة
- صعوبةفي التنفس أو البلع
- أزيز
- تورمفي الوجه أو الحلق أو اللسان أو الشفتين أو العينين
- برازمائي أو دموي ، تقلصات في المعدة ، أو حمى أثناء العلاج أو لمدة تصل إلى شهرين أو أكثر بعد التوقف عن العلاج
- عودةالحمى والتهاب الحلق والقشعريرة أو علامات العدوى الأخرى

قديسبب سيفوروكسيم آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذاكنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرةعبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch) أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبعةيجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظبهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزين الأجهزة اللوحية في درجة حرارةالغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام). احتفظ بالدواء السائل في الثلاجة ، مغلقاً بإحكام ، وتخلص منأي دواء غير مستخدم بعد 10 أيام.

يجب‌التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومعذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المرحاض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويتك هي من خلال برنامج استعادةالأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك.راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء (http://goo.gl/c4Rm4p /http://goo.gl) لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

منالمهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريماتوالبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ،قم دائماً بإغلاق أغطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. http://www.upandaway.org]http://www.upandaway.org[

نحالة طارئة / جرعة زائدة

فيحالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على]https://www.poisonhelp.org/help[https://www.poisonhelp.org/help. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعانيمن صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قدتشمل أعراض الجرعة الزائدة:

- النوبات

قبعةمعلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظبجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. قد يطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابة جسمك لسيفوروكسيم.

إذاكنت مصاباً بداء السكري وقمت باختبار السكر في البول ، فاستخدم Clinistix أو TesTape (وليس Clinitest) لاختبار البول أثناءتناول هذا الدواء. إذا قمت باختبار السكر في دمك ، فاستشر طبيبك أو الصيدلي للتوصية بأفضل منتج لاستخدامه أثناء تناولهذا الدواء.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. الوصفة الخاصة بك وربما لا إعادة الملء.

منالمهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجاتمثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباًأو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماءراند

- سفتين®

آخرمراجعة - 15/01/2022

تعلمكيفية الاستشهاد بهذه الصفحة

إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة. الازدواجية .4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland ،
للاستخدامالتجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبةالوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهدالوطنية للصحة

آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022