Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601206.html

Cefuroxime

binibigkas bilang (se fyoor ox' eem)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Cefuroxime ay ginagamit upang gamutin ang ilang mga impeksiyon na dulot ng bakterya, tulad ng brongkitis (impeksyon ng mga tubo ng daanan ng hangin na humahantong sa mga baga); gonorrhea (isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik); Lyme disease (isang impeksiyon na maaaring umunlad pagkatapos makagat ng tik ang isang tao); at mga impeksyon sa balat, tainga, sinus, lalamunan, tonsil, at daanan ng ihi. Ang Cefuroxime ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na cephalosporin antibiotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki ng bakterya.

Ang mga antibiotic tulad ng cefuroxime ay hindi gagana para sa mga sipon, trangkaso, o iba pang mga impeksyon sa viral. Ang paggamit ng mga antibiotic kapag hindi kinakailangan ang mga ito ay nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng impeksyon sa ibang pagkakataon na lumalaban sa paggamot sa antibiotic.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Cefuroxime ay nagmumula bilang isang tableta at isang suspensyon (likido) upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito tuwing 12 oras sa loob ng 5-10 araw, depende sa kondisyong ginagamot. Upang gamutin ang gonorrhea, ang cefuroxime ay kinukuha bilang isang dosis, at para gamutin ang Lyme disease, ang cefuroxime ay kinukuha tuwing 12 oras sa loob ng 20 araw. Kunin ang suspensyon na may pagkain; ang tableta ay maaaring inumin nang may pagkain o walang. Uminom ng cefuroxime sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin ang cefuroxime nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ang iba't ibang mga produkto ng cefuroxime ay hinihigop ng katawan sa iba't ibang paraan at hindi maaaring palitan para sa isa't isa. Kung kailangan mong lumipat mula sa isang produkto ng cefuroxime patungo sa isa pa, maaaring kailanganin ng iyong doktor na ayusin ang iyong dosis.

Iling mabuti ang suspensyon bago ang bawat paggamit upang ihalo nang pantay ang gamot.

Ang mga tablet ay dapat na lunukin nang buo. Dahil ang durog na tablet ay may malakas na mapait na lasa, ang tableta ay hindi dapat durog. Ang mga bata na hindi makalunok ng tableta nang buo ay dapat uminom ng likido sa halip.

Dapat kang magsimulang bumuti ang pakiramdam sa mga unang araw ng paggamot na may cefuroxime. Kung hindi bumuti o lumalala ang iyong mga sintomas, tawagan ang iyong doktor.

Uminom ng cefuroxime hanggang matapos mo ang reseta, kahit na bumuti ang pakiramdam mo. Kung huminto ka sa pag-inom ng cefuroxime nang masyadong maaga o laktawan ang mga dosis, ang iyong impeksiyon ay maaaring hindi ganap na magamot, at ang bakterya ay maaaring maging lumalaban.

sa antibiotics.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang Cefuroxime upang gamutin ang pulmonya. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng cefuroxime,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa cefuroxime; iba pang mga cephalosporin antibiotics tulad ng cefaclor , cefadroxil , , cefazolin (Ancef, Kefzol), cefdinir , cefditoren (Spectracef), cefepime (Maxipime), cefixime, , cefotaxime (Claforan), cefotetan, cefoxitin (Mefotetan, cefoxinxitin) Teflaro), ceftazidime (Fortaz, Tazicef, sa Avycaz), ceftibuten (Cedax), ceftriaxone (Rocephin), at cephalexin (Keflex); penicillin antibiotics; o anumang iba pang gamot. Sabihin din sa iyong doktor kung ikaw ay allergic sa alinman sa mga sangkap sa cefuroxime tablets o suspension. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: anticoagulants ('blood thinners') tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven), cimetidine, diuretics ('water pills'), famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid), omeprazole (Prilosec, in Zegerid), pantoprazole (Protonix), probenecid (Probalan) at ranitidine (Zantac). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- kung umiinom ka ng mga antacid na naglalaman ng magnesium o aluminyo, inumin ang mga ito nang hindi bababa sa 1 oras bago o 2 oras pagkatapos ng cefuroxime.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa gastrointestinal (GI; nakakaapekto sa tiyan o bituka), lalo na sa colitis (kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa lining ng colon [large intestine]), o sakit sa bato o atay.
- dapat mong malaman na ang cefuroxime ay nagpapababa sa bisa ng ilang oral contraceptive ('birth control pills). Kakailanganin mong gumamit ng isa pang paraan ng birth control habang umiinom ng gamot na ito. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iba pang mga paraan upang maiwasan ang pagbubuntis habang iniinom mo ang gamot na ito.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng cefuroxime, tawagan ang iyong doktor.
- kung mayroon kang phenylketonuria (PKU, isang minanang kondisyon kung saan dapat sundin ang isang espesyal na diyeta upang maiwasan ang pinsala sa iyong utak na maaaring magdulot ng malubhang kapansanan sa intelektwal), dapat mong malaman na ang suspensyon ng cefuroxime ay pinatamis ng aspartame na bumubuo ng phenylalanine.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag uminom ng dobleng dosis para makabawi sa a

nakaligtaan ang isa.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Cefuroxime ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pagduduwal
- pagsusuka
- pagtatae

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:

- pantal
- nangangati
- mga pantal
- kahirapan sa paghinga o paglunok
- humihingal
- pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, o mata
- matubig o madugong dumi, pananakit ng tiyan, o lagnat habang ginagamot o hanggang dalawa o higit pang buwan pagkatapos ihinto ang paggamot
- pagbabalik ng lagnat, pananakit ng lalamunan, panginginig, o iba pang palatandaan ng impeksyon

Ang Cefuroxime ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ang mga tablet sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Panatilihin ang likidong gamot sa refrigerator, sarado nang mahigpit, at itapon ang anumang hindi nagamit na gamot pagkatapos ng 10 araw.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

- mga seizure

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri sa lab upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa cefuroxime.

Kung ikaw ay diabetic at suriin ang iyong ihi para sa asukal, gamitin ang Clinistix o TesTape (hindi Clinitest) upang subukan ang iyong ihi habang umiinom ng gamot na ito. Kung susuriin mo ang iyong dugo para sa asukal, suriin sa iyong doktor o parmasyutiko upang irekomenda ang pinakamahusay na produkto na gagamitin habang umiinom ng gamot na ito.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Ang iyong reseta ay malamang na hindi refillable.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Ceftin®

Huling Binago - 01/15/2022

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022