

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Cetuximab injektion

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607041.html>

Cetuximab injektion

uttalas som (se tux' i mab)

VIKTIG VARNING:

Cetuximab kan orsaka allvarliga eller livshotande reaktioner medan du får medicinen. Dessa reaktioner är vanligare med den första dosen av cetuximab men kan uppträda när som helst under behandlingen. Din läkare kommer att övervaka dig noggrant medan du får varje dos av cetuximab och i minst 1 timme efteråt. Tala om för din läkare om du är allergisk mot rött kött, eller om du någon gång blivit fästingbiten. Om du upplever något av följande symtom under eller efter infusionen, berätta omedelbart för din läkare: plötsliga andningssvårigheter, andnöd, väsande andning eller högljudd andning, svullnad av ögon, ansikte, mun, läppar eller svalg, heshet, näselfeber, svimning, yrsel, illamående, feber, frossa eller bröstsmärtor eller tryck. Om du upplever något av dessa symtom kan din läkare sakta ner eller stoppa din infusion och behandla symtomen på reaktionen. Du kanske inte kan få behandling med cetuximab i framtiden.

Personer med huvud- och halscancer som behandlas med strålbehandling och cetuximab kan ha en ökad risk för hjärt- och lungstopp (tillstånd där hjärtat slutar slå och andningen slutar) och plötslig död under eller efter behandlingen. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft kranskärlssjukdom (tillstånd som uppstår när hjärtats blodkärl är förträngda eller tilltäppta av fett- eller kolesterolavlagringar); hjärtsvikt (tillstånd där hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod till andra delar av kroppen); oregelbunden hjärtrytm; annan hjärtsjukdom; eller lägre än normala nivåer av magnesium, kalium eller kalcium i ditt blod.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester under och efter din behandling för att kontrollera din kropps svar på cetuximab.

Tala med din läkare om riskerna med att använda cetuximab.

hur är denna medicin utskriven?

Cetuximab används med eller utan strålbehandling för att behandla en viss typ av cancer i huvud och hals som har spridit sig till närliggande vävnader eller andra delar av kroppen. Det kan också användas tillsammans med andra mediciner för att behandla en viss typ av huvud- och halscancer som har spridit sig till andra delar av kroppen eller som återkommer efter behandlingen. Cetuximab används också ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla en

viss typ av cancer i tjocktarmen (tjocktarmen) eller ändtarmen som har spridit sig till andra delar av kroppen. Cetuximab ingår i en klass av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Det fungerar genom att bromsa eller stoppa tillväxten av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Cetuximab kommer som en lösning (vätska) som ska infunderas (injiceras långsamt) i en ven. Cetuximab ges av en läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller ett infusionscenter. Första gången du får cetuximab infunderas det under en period av 2 timmar, därefter infunderas följande doser under 1 timme. Cetuximab ges vanligtvis var 1:e till 2:e vecka så länge som din läkare rekommenderar att du får behandling.

Din läkare kan behöva sakta ner din infusion, minska din dos, skjuta upp eller avbryta behandlingen eller behandla dig med andra mediciner om du upplever vissa biverkningar. Se till att berätta för din läkare hur du mår under din behandling med cetuximab.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordinerar för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får behandling med cetuximab,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot cetuximab, andra mediciner, rött kött eller galaktos, eller mot någon av ingredienserna i cetuximab. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna. Tala också om för din läkare och apotekspersonal om du har eller har haft fästingbett.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärtsjukdom.
- berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du måste ta ett graviditetstest innan behandlingen påbörjas. Du bör inte bli gravid under din behandling med cetuximab och under minst 2 månader efter din sista dos. Tala med din läkare om preventivmetoder som du kan använda under din behandling. Om du blir gravid medan du får cetuximab, ring din läkare.
- tala om för din läkare om du ammar. Din läkare kan säga till dig att inte amma under din behandling och under 2 månader efter din sista dos.
- du bör veta att denna medicin kan minska fertiliteten hos kvinnor. Tala med din läkare om riskerna med att få cetuximab.
- planera för att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus och att bära skyddskläder, hatt, solglasögon och solskyddsmedel under din behandling med cetuximab och i 2 månader efter din behandling.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsatt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar ett möte för att få en dos cetuximab, ring din läkare omedelbart.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Cetuximab kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- akneliknande utslag
- torr eller sprucken hud
- klåda
- svullnad, smärta eller förändringar i finger- eller tånaglar
- röda, vattniga eller kliande ögon
- röda eller svullna ögonlock
- smärta eller brännande känsla i ögat
- ögonens känslighet för ljus
- håravfall
- ökad hårväxt på huvud, ansikte, ögonfransar eller bröst
- spruckna läppar
- huvudvärk
- trötthet
- svaghet
- förvirring
- domningar, stickningar, smärta eller sveda i armar eller ben
- torr mun
- sår på läppar, mun eller svalg
- öm hals
- illamående
- kräkningar
- förändring i förmåga att smaka mat
- aptitlöshet
- viktminskning
- förstoppning
- diarre
- halsbränna
- ledvärk

- skelettsmärta
- smärta, rodnad eller svullnad på platsen där medicinen injicerades

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din läkare omedelbart:

- förlust av syn
- blåsor, skalar eller tappar hud
- röd, svullen eller infekterad hud
- ny eller förvärrad hosta, andnöd eller bröstsmärtor

Cetuximab kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du använder denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Fråga din läkare om du har några frågor om din behandling med cetuximab.

För vissa tillstånd kommer din läkare att beställa ett labbtest innan du påbörjar din behandling för att se om din cancer kan behandlas med cetuximab.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Erbitux®

Senast reviderad - 2021-07-15

Lär dig hur du citerar den här sidan



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS® Patient Medication Information™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022