

[У дома](#) → [Лекарства, билки и добавки](#) → Инжекция с цетуксимаб

Source : U.S. National Library of Medicine

URL на тази страница: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607041.html>

Цетуксимаб инжекция

произнася се като (se tux' i mab)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Цетуксимаб може да причини тежки или животозастрашаващи реакции, докато приемате лекарството. Тези реакции са по-чести при първата доза цетуксимаб, но могат да се появят по всяко време по време на лечението. Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, докато получавате всяка доза цетуксимаб и поне 1 час след това. Кажете на Вашия лекар, ако сте алергични към червено месо или ако някога сте били ухапани от кърлеж. Ако получите някой от следните симптоми по време на или след инфузията, незабавно уведомете Вашия лекар: внезапно затруднено дишане, задух, хрипове или шумно дишане, подуване на очите, лицето, устата, устните или гърлото, дрезгав глас, копривна треска, припадък, замаяност, гадене, треска, втрисане или болка в гърдите или натиск. Ако почувствате някой от тези симптоми, Вашият лекар може да забави или спре инфузията Ви и да лекува симптомите на реакцията. Възможно е да не можете да получавате лечение с цетуксимаб в бъдеще.

Хората с рак на главата и шията, които се лекуват с лъчева терапия и цетуксимаб, могат да имат повишен риск от сърдечно-белодробен арест (състояние, при което сърцето спира да бие и дишането спира) и внезапна смърт по време или след лечението. Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали коронарна артериална болест (състояние, което възниква, когато кръвоносните съдове на сърцето са стеснени или запушени от мазнини или холестерол); сърдечна недостатъчност (състояние, при което сърцето не е в състояние да изпомпва достатъчно кръв към другите части на тялото); неравномерен сърдечен ритъм; други сърдечни заболявания; или по-ниски от нормалните нива на магнезий, калий или калций в кръвта Ви.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени изследвания по време и след лечението, за да провери реакцията на тялото ви към цетуксимаб.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на цетуксимаб.

защо е предписано това лекарство?

Цетуксимаб се използва със или без лъчева терапия за лечение на определен вид рак на главата и шията, който се е разпространил в близките тъкани или други части на тялото. Може да се използва и с други лекарства за лечение на определен тип рак на главата и шията, който се е разпространил в други части на тялото или продължава да се връща след лечението. Цетуксимаб също се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на а

определен вид рак на дебелото черво (дебелото черво) или ректума, който се е разпространил в други части на тялото. Цетуксимаб е в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Действа като забавя или спира растежа на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Цетуксимаб се предлага като разтвор (течност), който трябва да се влива (бавно се инжектира) във вена. Цетуксимаб се прилага от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или инфузионен център. Първият път, когато получите цетуксимаб, той ще се влива за период от 2 часа, след което следващите дози ще се вливат в продължение на 1 час. Цетуксимаб обикновено се прилага на всеки 1 до 2 седмици, докато Вашият лекар Ви препоръча да получавате лечение.

Вашият лекар може да се наложи да забави инфузията Ви, да намали дозата Ви, да отложи или спре лечението Ви или да Ви лекува с други лекарства, ако получите определени нежелани реакции. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с цетуксимаб.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите лечение с цетуксимаб,

- уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към цетуксимаб, други лекарства, червено месо или галактоза, или към някоя от съставките на цетуксимаб. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките. Също така уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако имате или сте имали ухапвания от кърлеж.
- кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате.
- уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали сърдечно заболяване.
- уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Преди да започнете лечението, ще трябва да направите тест за бременност. Не трябва да забременявате по време на лечението с цетуксимаб и поне 2 месеца след последната доза. Говорете с Вашия лекар относно методите за контрол на раждаемостта, които можете да използвате по време на лечението. Ако забременеете, докато приемате цетуксимаб, обадете се на Вашия лекар.
- кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Вашият лекар може да Ви каже да не кърмите по време на лечението и 2 месеца след последната доза.
- трябва да знаете, че това лекарство може да намали плодовитостта при жените. Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на цетуксимаб.
- планирайте да избягвате ненужно или продължително излагане на слънчева светлина и да носите защитно облекло, шапка, слънчеви очила и слънцезащитен крем по време на лечението с цетуксимаб и в продължение на 2 месеца след лечението.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете среща, за да получите доза цетуксимаб, незабавно се обадете на Вашия лекар.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Цетуксимаб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

- обрив, подобен на акне
- суха или напукана кожа
- сърбеж
- подуване, болка или промени в ноктите на ръцете или краката
- червени, воднисти или сърбящи очи
- зачервен или подут клепач(и)
- болка или усещане за парене в очите
- чувствителност на очите към светлина
- косопад
- повишен растеж на косата по главата, лицето, миглите или гърдите
- напукани устни
- главоболие
- умора
- слабост
- объркване
- изтръпване, изтръпване, болка или парене в ръцете или краката
- суха уста
- рани по устните, устата или гърлото
- възпалено гърло
- гадене
- повръщане
- промяна в способността за вкус на храна
- загуба на апетит
- отслабване
- запек
- диария
- киселини в стомаха
- болки в ставите

- болки в костите
- болка, зачервяване или подуване на мястото, където е инжектирано лекарството

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

- загуба на зрение
- образуване на мехури, лющене или оцветяване на кожата
- зачервена, подута или инфектирана кожа
- нова или влошаваща се кашлица, задых или болка в гърдите

Цетуксимаб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато използвате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефона (1-800-332-1088).

п случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е достъпна и онлайн на адрес <https://www.poisnhelp.org/help> [<https://www.poisnhelp.org/help>]. Ако жертвата е припаднала, има гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако имате въпроси относно лечението Ви с цетуксимаб.

При някои състояния Вашият лекар ще назначи лабораторен тест, преди да започнете лечението, за да види дали ракът Ви може да се лекува с цетуксимаб.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

- Erbitux®

Последна редакция - 15.07.2021 г

[Научете как да цитирате тази страница](#)



[Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc](#)

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г