Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682899.html

クロラムブシル

（klor am'bue sil）と発音されます

重要な警告：

クロラムブシルは、骨髄中の血球数の減少を引き起こす可能性があります。医師は、治療前、治療中、治療後に、血球がこの薬の影響を受けているかどうかを確認するための臨床検査を注文します。研究室とのすべての約束を守ってください。

クロラムブシルは、他の癌を発症するリスクを高める可能性があります。このリスクについて医師に相談してください。

クロラムブシルは、女性の通常の月経周期（期間）を妨げ、男性の精子産生を停止させる可能性があります。クロラムブシルは永続的な不妊症（妊娠困難）を引き起こす可能性があります。ただし、自分が妊娠できない、または他の人が妊娠できないと思い込まないでください。妊娠中の女性は、この薬の服用を開始する前に医師に相談する必要があります。化学療法を受けている間、または治療後しばらくの間、子供を産むことを計画するべきではありません。（詳細については医師にご相談ください。）妊娠を防ぐために、信頼できる避妊方法を使用してください。クロラムブシルを服用中に妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してください。クロラムブシルは胎児に害を及ぼす可能性があります。

なぜこの薬が処方されているのですか？

クロラムブシルは、特定の種類の慢性リンパ性白血病（CLL;白血球のがんの一種）の治療に使用されます。クロラムブシルは、非ホジキンリンパ腫（NHL）およびホジキン病（通常は感染と戦う特定の白血球で発生する癌の種類）の治療にも使用されます。クロラムブシルは、アルキル化剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それはあなたの体の癌細胞の成長を遅らせるか、または止めることによって働きます。

わあ、この薬を使うべきですか？

クロラムブシルは、経口摂取用の錠剤として提供されます。通常、1日1回3〜6週間服用しますが、断続的に2週間に1回、または1ヶ月に1回服用することもあります。治療期間は、服用している薬の種類、体がそれらにどれだけうまく反応するか、そしてあなたが持っている癌の種類によって異なります。毎回ほぼ同時にクロラムブシルを服用してください

日。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにクロラムブシルを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

医師は、治療に対する反応や経験した副作用に応じて、クロラムブシルの投与量を調整する場合があります。治療中の気分について医師に相談してください。医師に相談せずにクロラムブシルの服用を中止しないでください。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

クロラムブシルを服用する前に、

- クロランブシル、ベンダムスチン（Treanda）、ブスルファン（Myleran、Busulfex）、カルムスチン（BiCNU、Gliadel Wafer）、シクロホスファミド（Cytoxan）、イフォスファミド（Ifex）、ロムスチン（CeeNU）などの他のアルキル化剤にアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください）、メルファラン（アルケラン）、プロカルバジン（ムタラン）、またはテモゾロミド（テモダール）、その他の薬剤、またはクロランブシルの成分。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。
- 以前にクロラムブシルを服用したことがあるが、癌が薬に反応しなかったかどうかを医師に伝えてください。あなたの医者はおそらくクロラムブシルを服用しないようにあなたに言うでしょう。
- 過去4週間以内に放射線療法または他の化学療法を受けたかどうかを医師に伝えてください。
- 発作や頭部外傷をしたことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- 母乳育児をしている場合は医師に相談してください。
- 医師に相談せずに予防接種を受けないでください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になっている場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

クロラムブシルは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 吐き気
- 嘔吐
- 口と喉の痛み
- 疲れ
- 月経を逃した（女の子と女性）

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 皮膚の発疹
- 異常なあざや出血
- 黒、タリースツール
- 赤い尿
- 咳
- 喉の痛み
- 混雑
- 熱
- 呼吸困難
- 発作
- 皮膚や目の黄変
- 胃の右上部分の痛み
- 濃い色の尿
- 頻尿
- 異常なしこりや腫瘤

クロラムブシルは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。冷蔵庫に保管してください。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、子供の手の届かないところにすべての薬を保管することが重要です。

幼児は簡単に開けることができます。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とのすべての約束を守ってください。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- ロイケラン®

最終改訂日-2017年9月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省
国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日