Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682899.html

klorambusil

(klor am' bue sil) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Klorambusil, kemik iliğinizdeki kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. Doktorunuz, kan hücrelerinizin bu ilaçtan etkilenip etkilenmediğini görmek için tedavinizden önce, tedavi sırasında ve sonrasında laboratuvar testleri isteyecektir. Tüm randevuları laboratuvarla birlikte saklayın.

Klorambusil, başka kanserler geliştirme riskinizi artırabilir. Bu risk hakkında doktorunuzla konuşun.

Klorambusil, kadınlarda normal adet döngüsüne (dönem) müdahale edebilir ve erkeklerde sperm üretimini durdurabilir. Klorambusil kalıcı kısırlığa (hamile kalma zorluğu) neden olabilir; ancak hamile kalamayacağınızı veya başka birini hamile bırakamayacağınızı varsaymamalısınız. Hamile olan kadınlar bu ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorlarına söylemelidir. Kemoterapi alırken veya tedavilerden sonra bir süre çocuk sahibi olmayı planlamamalısınız. (Ayrıntılı bilgi için doktorunuzla konuşun.) Hamileliği önlemek için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanın. Klorambusil kullanırken hamile kalırsanız hemen doktorunuzu arayın. Klorambusil fetüse zarar verebilir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Klorambusil, belirli bir tür kronik lenfositik lösemiyi (KLL; beyaz kan hücrelerinin bir tür kanseri) tedavi etmek için kullanılır. Klorambusil ayrıca Hodgkin olmayan lenfoma (NHL) ve Hodgkin hastalığını (normalde enfeksiyonla savaşan belirli beyaz kan hücrelerinde başlayan kanser türleri) tedavi etmek için kullanılır. Klorambusil, alkilleyici ajanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Klorambusil, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle 3 ila 6 hafta boyunca günde bir kez alınır, ancak bazen aralıklı olarak, 2 haftada bir tek doz veya ayda bir tek doz olarak alınabilir. Tedavinin uzunluğu, aldığınız ilaç türlerine, vücudunuzun bunlara ne kadar iyi yanıt verdiğine ve sahip olduğunuz kanser türüne bağlıdır. Klorambusil'i her gün yaklaşık aynı saatlerde alınız.

gün. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Klorambusili aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz tedaviye verdiğiniz cevaba ve yaşadığınız yan etkilere bağlı olarak klorambusil dozunuzu ayarlayabilir. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında doktorunuzla konuşun. Doktorunuzla konuşmadan klorambusil kullanmayı bırakmayınız.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Klorambusil almadan önce,

- klorambusil, bendamustin (Treanda), busulfan (Myleran, Busulfex), karmustin (BiCNU, Gliadel Wafer), siklofosfamid (Cytoxan), ifosfamid (Ifex), lomustin (CeeNU) gibi diğer alkilleyici ajanlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.), melfalan (Alkeran), prokarbazin (Mutalan) veya temozolomid (Temodar), diğer ilaçlar veya klorambusilin içindeki herhangi bir bileşen. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
- aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin.
- doktorunuza daha önce klorambusil alıp almadığınızı, ancak kanserinizin ilaca yanıt vermediğini söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size klorambusil almamanızı söyleyecektir.
- Son 4 hafta içinde radyasyon tedavisi veya başka bir kemoterapi aldıysanız doktorunuza söyleyiniz.
- daha önce nöbet veya kafa travması geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz.
- emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
- Doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı olmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Klorambusil yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- mide bulantısı
- kusma
- ağız ve boğazda yaralar
- yorgunluk
- kaçırılmış adet dönemleri (kızlarda ve kadınlarda)

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın:

- deri döküntüsü
- olağandışı morarma veya kanama
- siyah, katranlı tabureler
- kırmızı idrar
- öksürük
- boğaz ağrısı
- tıkanıklık
- ateş
- nefes almada zorluk
- nöbetler
- cilt veya gözlerin sararması
- midenin sağ üst kısmında ağrı
- koyu renkli idrar
- sık idrara çıkma
- olağandışı topaklar veya kitleler

Klorambusil başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz. (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Buzdolabında saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcılar ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalerler için olanlar) çocuklara dirençli olmadığından ve tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir.

küçük çocuklar kolayca açabilir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- lökeran®

Son Revize - 09/15/2017

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022