

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682479.html>

## כלורפרומיד מבוטא בתור (klor proe' pa mide)

### הודעה:

כלורפרומיד אינו זמין עוד בארצות הברית.

### היי האם נרשמה תרופה זו?

כלורפרומיד משמש יחד עם תזונה ופעילות גופנית, ולעיתים עם תרופות אחרות, לטיפול בסוכרת מסוג 2 (מצב בו הגוף אינו משתמש באינסולין באופן תקין ולכן אינו יכול לשלוט בכמות הסוכר בדם). כלורפרומיד הוא בקבוצה של תרופות הנקראות סולפונילאוריאה. כלורפרומיד מוריד את רמת הסוכר בדם בכך שהוא גורם ללבלב לייצר אינסולין (חומר טבעי הדרוש לפירוק הסוכר בגוף) ועוזר לגוף להשתמש באינסולין ביעילות. תרופה זו תסייע רק בהורדת רמת הסוכר בדם אצל אנשים שגופם מייצר אינסולין באופן טבעי. כלורפרומיד אינו משמש לטיפול בסוכרת מסוג 1 (מצב בו הגוף אינו מייצר אינסולין, ולכן,

עם הזמן, אנשים הסובלים מסוכרת וסוכר גבוה בדם עלולים לפתח סיבוכים חמורים או מסכני חיים, כולל מחלות לב, שבץ מוחי, בעיות בכליות, נזק עצבי ובעיות עיניים. נטילת תרופות, ביצוע שינויים באורח החיים (לדוגמה, דיאטה, פעילות גופנית, הפסקת עישון) ובדיקה קבועה של רמת הסוכר בדם עשויה לסייע בניהול הסוכרת שלך ושיפור בריאותך. טיפול זה עשוי גם להפחית את הסיכוי ללקות בהתקף לב, שבץ או סיבוכים אחרים הקשורים לסוכרת, כגון אי ספיקת כליות, נזק עצבי (קהה תחושה, רגליים או רגליים קרות; ירידה ביכולת המינית אצל גברים ונשים), בעיות עיניים, כולל שינויים או אובדן ראייה, או מחלת חניכיים. הרופא שלך וספקי שירותי בריאות אחרים ידברו איתך על הדרך הטובה ביותר לנהל את הסוכרת שלך.

### כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

כלורפרומיד מגיע כטבליה לנטילה דרך הפה. זה נלקח בדרך כלל עם ארוחת הבוקר פעם ביום. ספר לרופא שלך אם כלורפרומיד מקלקל את הבטן. הרופא שלך עשוי לומר לך לקחת מינונים קטנים יותר של כלורפרומיד פעמיים ביום עם הארוחות. כדי לעזור לך לזכור ליטול כלורפרומיד, קח אותו בערך באותה שעה בכל יום. בצע את ההנחיות על תווית המרשם שלך בקפידה, ושאל את שלך

רופא או רוקח להסביר כל חלק שאינך מבין. קח כלורפרומיד בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא.

הרופא שלך כנראה יתחיל במינון נמוך של כלורפרומיד ויגדיל את המינון בהדרגה במידת הצורך. לאחר שנטלת כלורפרומיד במשך זמן מה, ייתכן שכלורפרומיד לא ישלוט ברמת הסוכר בדם שלך כפי שהיה בתחילת הטיפול. הרופא שלך עשוי להתאים את מינון התרופה לפי הצורך, כך שהתרופה תפעל בצורה הטובה ביותר עבורך. הקפד לספר לרופא שלך איך אתה מרגיש ואם תוצאות בדיקת הסוכר בדם היו גבוהות או נמוכות מהרגיל בכל עת במהלך הטיפול.

כלורפרומיד עוזר לשלוט ברמת הסוכר בדם אך אינו מרפא סוכרת. המשך ליטול כלורפרומיד גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק לקחת כלורפרומיד מבלי לדבר עם הרופא שלך.

## השימושים בתרופה זו

תרופה זו נרשמה לפעמים לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

## יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

### לפני נטילת כלורפרומיד,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לכלורפרומיד, כל תרופה אחרת או כל אחד מהמרכיבים בכלורפרומיד. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה לוקח או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר נוגדי קרישה ('מדללי דם') כגון וורפרין (קומדין); אספירין ותרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות אחרות (NSAIDs) כגון איבופרופן (אדוויל, מוטרין) ונפרוקסן (Aleve, Naprosyn); ברביטורטים כגון אמוברביטל (אמיטל), בוטאברביטל (בוטיזול), מפוברביטל (מבארל), פנוברביטל וסקוברביטל (סקונל); חוסמי בטא כגון (Corgard, nadolol) XL, Lopressor, Toprol (metoprolol), Normodyne (labetalol), Tenormin (atenolol), Inderal (propranolol); חוסמי תעלות סידן כגון אמלודיפיין (Norvasc), דיילטיאזם (Cardizem, Dilacor, Tiazac), אחרים (DynaCirc (felodipine), Plendil, isradipine), ניקרדיפיין (Cardene) (nisoldipine), Sular (nimodipine), Nimotop, Adalat, Procardia (nifedipine), Calan, Isoptin, Verelan (-verapamil); כלורמפניקול; משתנים ('כדורי מים'); פלוקונאזול (Diflucan); טיפול הורמונלי חלופי ואמצעי מניעה הורמונליים (גלולות למניעת הריון, מדבקות, טבעות, שתלים זריקות); אינסולין או תרופות אחרות לטיפול בסוכר גבוה בדם או בסוכרת; איזוניאזיד (INH); מעכבי MAO כגון (Emsam, Zelapar, Eldepryl, selegiline) Nardil, Marplan (phenelzine), tisocarboxazid (-tranylcypromine) Parnate; תרופות לאסטמה והצטננות; תרופות למחלות נפש ובחילות; מיקונזול (מוניסטט); ניאצין; סטרואידים דרך הפה כגון (Decadron, Dexone, methylprednisolone) Medrol; (Deltasone) פניטואין (דילנטין); probenecid (בנמיד); משככי כאבים של סליצילטים כגון כולין מגנזיום טריסליצילאט, כולין סליצילאט (ארתרופן), דיפלוניסל (דלוביד), סליצילאט מגנזיום (דואן, אחרים) וסלסלאט (ארג'סיק, דיסאלסיד, סלגסיק); אנטיביוטיקה סולפאזית כגון (Bactrim, Septra) sulfasalazine; (co-trimoxazole) (אזולפידין); ותרופות לבלוטת התריס. הקפד גם לספר לרופא או לרוקח אם אתה מפסיק ליטול תרופות כלשהן בזמן נטילת כלורפרומיד. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי. הקפד גם לספר לרופא או לרוקח אם אתה מפסיק ליטול תרופות כלשהן בזמן נטילת כלורפרומיד. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי. הקפד גם לספר לרופא או לרוקח אם אתה מפסיק ליטול תרופות כלשהן בזמן נטילת כלורפרומיד. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או היה לך אי פעם מחסור ב-G6PD (מצב תורשתי הגורם להרס מוקדם של תאי דם אדומים או אנמיה המוליטית); אם יש לך הפרעות הורמונליות המערבות את בלוטת יותרת הכליה, יותרת המוח או בלוטת התריס; או אם יש לך מחלת לב, כליות או כבד.

- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן נטילת כלורפרומיד, התקשר לרופא שלך.
- שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים והיתרונות של נטילת כלורפרומיד אם אתה בן 65 ומעלה. מבוגרים לא צריכים בדרך כלל לקחת כלורפרומיד מכיוון שהוא אינו בטוח או יעיל כמו תרופות אחרות שניתן להשתמש בהן לטיפול באותו מצב.
- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל כלורפרומיד.
- שאל את הרופא שלך לגבי השימוש הבטוח במשקאות אלכוהוליים בזמן שאתה נוטל תרופה זו. אלכוהול יכול להחמיר את תופעות הלוואי של כלורפרומיד. צריכת אלכוהול בזמן נטילת כלורפרומיד עלולה גם לגרום לתסמינים כגון סומק (אדום בפנים), כאבי ראש, בחילות, הקאות, כאבים בחזה, חולשה, ראייה מטושטשת, בלבול נפשי, הזעה, חנק, קשיי נשימה וחרדה.
- לתכנן להימנע מחשיפה מיותרת או ממושכת לאור השמש וללבוש ביגוד מגן, משקפי שמש וקרם הגנה. כלורפרומיד עלול להפוך את העור שלך לרגיש לאור השמש.
- שאל את הרופא שלך מה לעשות אם אתה חולה, מפתח זיהום או חום, חווה לחץ חריג או נפצע. מצבים אלו יכולים להשפיע על רמת הסוכר בדם ועל כמות הכלורפרומיד שאולי תצטרך.

## האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

הקפד לעקוב אחר כל המלצות הפעילות הגופנית והתזונה של הרופא או הדיאטנית שלך. חשוב לאכול תזונה בריאה, להתעמל באופן קבוע ולרדת במשקל במידת הצורך.

## כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

לפני שתתחיל ליטול כלורפרומיד, שאל את הרופא מה עליך לעשות אם שכחת ליטול מנה. כתוב את ההוראות האלה כדי שתוכל להתייחס אליהם מאוחר יותר.

ככלל, קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

## התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

**תרופה זו עלולה לגרום לשינויים ברמת הסוכר בדם. אתה צריך לדעת את הסימפטומים של סוכר נמוך וגבוה בדם ומה לעשות אם יש לך תסמינים אלה.**

**כלורפרומיד עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:**

- בחילה
- הקאה
- אובדן תיאבון
- רעב
- סחרחורת

• כאב ראש

• עקצוץ

## תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים האלה, התקשר לרופא שלך מיד:

- הצהבה של העור או העיניים
- שרפרפים בהירים
- שתן כהה
- כאב בחלק הימני העליון של הבטן
- חבורות או דימום חריגים
- שלשול
- חום
- כאב גרון
- פריחה

כלורפרומיד עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן שאתה נוטל תרופה זו.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>) או בטלפון (1-800-332-1088).

במחקר אחד, אנשים שלקחו תרופה דומה לכלורפרומיד לטיפול בסוכרת שלהם היו בעלי סיכוי גבוה יותר למות מבעיות לב מאשר אנשים שטופלו באינסולין ושינויי תזונה. שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים של נטילת כלורפרומיד.

## צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>).

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשפאים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מהרעלה, נעל תמיד מכסי בטיחות.

ומיד למקם את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם.  
<http://www.upandaway.org> ]<http://www.upandaway.org>

## במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisohelp.org/help> ]<https://www.poisohelp.org/help> אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

## תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול תסמיני היפוגליקמיה וכן את הדברים הבאים:

- התקפים
- אובדן ההכרה

## צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. יש לבדוק את רמת הסוכר בדם ואת ההמוגלובין הגלוקוזיל (HbA1c) באופן קבוע כדי לקבוע את תגובתך לכלורפרומיד. הרופא שלך עשוי להזמין בדיקות מעבדה אחרות כדי לבדוק את תגובתך לכלורפרומיד. הרופא שלך גם יגיד לך כיצד לבדוק את תגובתך לתרופה זו על ידי מדידת רמות הסוכר שלך בבית. בצע את ההוראות הללו בקפידה.

אתה תמיד צריך לענווד צמיד זיהוי סוכרת כדי להיות בטוח שאתה מקבל טיפול מתאים במקרה חירום.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כמו ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

## שמות רנד

- דיאביני®
- גלוקמיד®

¶-מוצר ממותג זה אינו זמין עוד בשוק. חלופות גנריות עשויות להיות זמינות.

עדכון אחרון - 15/09/2020

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. נשכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

---

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 משרד הבריאות האמריקאי ושירותי אנוש  
המכונים הלאומיים לבריאות  
העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022