Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Lfylink.com

stugil tablet

Üretici firma :
Janssen İlaç

Kompozisyon :
Sinnarizin, Domperidon

Reçete :
Gerekli değil

Stugil Tablet ile etkileşimler nelerdir?

Hangi noktada birden fazla ilaç alırsanız alın veya belirli yiyecek veya içeceklerle karıştırırsanız, ilaç etkileşimi tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız.

Hastalık Böbrek Hastalığı
ile Etkileşim Orta

Böbrek yetmezliği yaşıyorsanız, Stugil Tablet dikkatli kullanılmalıdır. Makul porsiyon modifikasyonu ve güvenlik kontrolü, özellikle güçten düşme ciddi ise tavsiye edilir. Karaciğer Hastalığı Orta

Stugil Tablet, karaciğer kapasitesinde bozukluk olması durumunda dikkatli kullanılmalıdır. Makul porsiyon değişikliği ve esenlik gözlemi, özellikle zayıflık doğrudan yönlendiriliyorsa, teşvik edilir. Aşırı sakatlık için bu ilacın kullanılması önerilmez.

Bağırsak Bozuklukları Majör

Stugil Tablet, iç ölüm, mide ve sindirim kanalında bir engel veya açıklık gibi gerçek bağırsak sorunları olan kişilerde olağanüstü bir dikkatle kullanılmalıdır. Bu gibi durumlarda ikame ilaç kullanılması istenir.

Alkol Likörü ile
Etkileşim

İçki ile etkileşim belirsizdir. Kullanmadan önce uzmanınıza danışmanız yerinde olur.

Laboratuvar Testi ile Etkileşim

laboratuvar

Verilere erişilemiyor.

Gıda ile Etkileşim

beslenme

Verilere erişilemiyor.

Tıp ile Etkileşim

Tramadol Binbaşı

Tramadol veya Opioid sınıfında yeri olan başka bir ilacın kullanımını uzmana bildirin. Bu durumlarda makul kısım değişikliği ve güvenlik gözlemi tavsiye edilir.

ketokonazol majör

Ketokonazol veya parazit ilacının başka bir düşmanının kullanımını uzmana bildirin. Bu ilaçların ortak organizasyonu, yan etki tehlikesi yüksek olduğundan reçete edilmez. Uzmanınıza danışmadan herhangi bir ilacın kullanımını bırakmamaya çalışın.

Eritromisin Binbaşı

Eritromisin kullanımını uzmana bildirin. Bu ilaçların ortak organizasyonu, yan etki tehlikesi son derece yüksek olduğundan önerilmez. Herhangi bir reçetenin kullanımını uzmanınıza danışmadan bırakmamaya çalışın.

Bromokriptin Orta

Her iki ilacın da kullanımını uzmana bildirin. Bu ilaçlar birlikte verilecekse, bir porsiyon değişikliği gerekebilir. Uzmanınıza danışmadan hiçbir ilaç kullanımını bırakmamaya çalışın. sisaprid majör

Her iki ilacın kullanımını uzmana bildirin. Bu ilaçların ortak organizasyonu reçete edilmez ve bir seçeneğin kullanılması önerilir. Uzmanınıza danışmadan hiçbir ilaç kullanımını bırakmamaya çalışın.

Stugil Tablet nerede onaylandı?

Hindistan

Japonya

Dozaj talimatları nelerdir?

Kaçırılan doz talimatları var mı?

Kaçırılan dozu atlayın ve doğru zamanda bir sonraki programlanmış dozla devam edin. Kaçırılan dozu telafi etmek için doz ikiye katlanmamalıdır.

Doz aşımı talimatları var mı?

Doz aşımından şüpheleniliyorsa doktorunuzla iletişime geçin. Doz aşımı belirtileri uyuşukluk, ajitasyon ve kasılmaları içerebilir ve bebeklerde ve çocuklarda daha yaygın olabilir. Şiddetli vakalarda gastrik lavaj dahil acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Stugil Tablet'in ikameleri nelerdir?

Aşağıda, Stugil Tablet ile aynı bileşim, güç ve biçime sahip olan ve dolayısıyla onun yerine kullanılabilecek ilaçların listesi bulunmaktadır.

Cinirone D Tablet

Biochem Pharmaceutical Industries

Kvert D 15Mg/20Mg Tablet

Kivi Laboratuvarları Ltd.

Cindom 15 Mg/20 Mg Tablet

Tas Med India Pvt Ltd

Vertidom Tablet

Geno Pharmaceuticals Ltd

Synadom 15 Mg/20 Mg

Tablet Bsp İlaç

CINERAX-D 15MG/20MG TABLET Rax Health Care Pvt Ltd
Spinil D 15 Mg/20 Mg Tablet Alchemist Life Science Ltd Rhizand 15 Mg/20 Mg Tablet Kür Hızlı İlaç Domax Cz Tablet
anne ilaçları
Domfast Cz 15 Mg/20 Mg Tablet Swiss Pharma Pvt Ltd
AUGZIN 15MG/20MG TABLET Auriga Laboratuvarları
Qvert D 15 Mg/20 Mg Tablet Pegasus Farmaco Hindistan Pvt Ltd Trudom 15 Mg/20 Mg Tablet Genesis Biotech Inc
Novadom C Tablet Pacific Drugs & Chemicals
Vertirid D 15 Mg/20 Mg Tablet RKG Pharma
CINRON 15MG/20MG TABLET Adam Hizmet İlaç
Stedidom 15 Mg/20 Mg Tablet Morepen Laboratories Ltd Cinn D 15 Mg/20 Mg Tablet Curagen Biyolojik İlaçlar Domitin C 15 Mg/20 Mg Kapsül Navil Laboratories Pvt Ltd
Domgil 15 Mg/20 Mg Tablet Kinedex Healthcare Pvt Ltd DOMLEY-C 15MG/20MG TABLET Zodley Pharmaceuticals Pvt Ltd Cinidom 15 Mg/20 Mg Tablet Eskag Pharma Pvt Ltd
Domcin 15 Mg/20 Mg Tablet Intel İlaçları
Cinadew 15Mg/20Mg Tablet Çiğ Damlaları Laboratuvarı

Stugil Tablet'in önemli özellikleri

Etki süresi ne kadardır?
Bu ilacın etkisi 6 saate kadar sürer.
Eylemin başlangıcı nedir?
Bu ilacın zirve etkisi, uygulamadan 30 ila 60 dakika sonra gözlemlenebilir.
Hamilelik uyarıları var mı?
Bu ilacın, potansiyel faydaları içerdiği risklerden daha ağır basmadığı sürece hamile kadınlarda kullanılması önerilmez.
Bu ilacın fetüs üzerindeki etkisi net olarak belirlenmemiştir ve bu nedenle bu ilacı almadan önce bir doktora danışmanız tavsiye edilir.
Alışkanlık mı oluşturuyor?

Alışkanlık oluşturma eğilimi
bildirilmemiştir. Emzirme uyarıları var mı?
Bu ilacın bebek üzerinde yan etki riski olduğundan emziren annelerin kullanması önerilmez. Bu ilacı tüketmeden önce doktorlarınıza danışmanız ve potansiyel yarar ve risklerini göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.

Stugil Tablet yan etkileri nelerdir?

Stugil Tablet, amaçlanan etkisinin yanı sıra bazı istenmeyen etkilere de neden olabilir. Bu gibi durumlarda derhal tıbbi yardım almalısınız. Bu, yan etkilerin kapsamlı bir listesi değildir. İlaca karşı herhangi bir olumsuz reaksiyon yaşarsanız lütfen doktorunuzu bilgilendirin.
Yüz, dudaklar, göz kapakları, dil, eller ve ayaklarda şişme Majör Daha Az Yaygın
Nefes almada zorluk Majör Yaygın
Deri döküntüsü Orta Yaygın Konvülsiyonlar Orta
Yaygın Kalp ritmi bozuklukları Majör Nadir Menstrüel
siklusta düzensizlik Orta Derecede Seyrek Meme ağrısı
ve hassasiyeti Orta Daha Az Yaygın Ağız kuruluğu Orta
Yaygın

Libido kaybı Orta Daha az Yaygın Erkeklerde
meme benzeri büyüme Orta Seyrek

Stugil Tablet'in kontrendikasyonları nelerdir?

Alerji
Stugil Tablet, bilinen bir alerji öyküsü olan kişilerde kullanılması önerilmez.
Hipofiz bezi tümörü
Stugil Tablet, hipofiz bezi tümörü olan kişilerde kullanılması önerilmez. Kalp
hastalıkları
Stugil Tablet, Konjestif Kalp Yetmezliği gibi aktif kalp hastalığı olan kişilerde kullanılması tavsiye edilmez.

Stugil Tablet ne zaman reçete edilir?

Mide bulantısı ve kusma
Stugil Tablet, kemoterapi veya sindirim sistemi bozukluğundan kaynaklanabilecek bulantı ve kusmayı tedavi etmek veya önlemek için kullanılır.
Mide motilite bozuklukları
Stugil Tablet ayrıca midenin gecikmeli veya hızlı boşalmasını içerebilen mide motilite bozukluklarının tedavisinde de kullanılır.

Stugil Tablet Hakkında

Dopamin karşıtlarının uyuşturucu toplayıcılarının bir parçası olan Stugil Tablet, mide-bağırsak sorunları yaşayan kişilerde ve ayrıca Parkinson hastalığı için belirli ilaçları kullanan kişilerde kusma ve mide bulantısı eğilimini koruyor. İlaç, midenin geçişine yakın olan kasları sabitler ve çıkışta bulunanları gevşetir. Bu aktivite, tükettiğiniz besinlerin ölümünü hızlandırır -

midenizi sindirim sisteminize iter, mide bulantısı ve rahatsızlık hissini azaltır, ayrıca kusmayı önler. Aynı şekilde, sonunda mide bulantısı ve mide bulantısı hissini azaltacak olan, zihninizin kusmaya neden olan odağındaki kışkırtmayı ortadan kaldırabilir veya azaltabilir.

Stugil Tablet, dopamin karşıtları olarak bilinen ilaç grubunun bir parçasıdır. Çoğu zaman gastrit veya diyabet ile bağlantılı olan gastrointestinal sisteminizdeki orta düzeyde besin maddesini tedavi etmek için çok iyi kullanılabilir. Bu durumu yaşayan bireyler için Stugil Tablet kusma, hastalık, şişlik ve tokluk hissi belirtilerini tedavi edebilir. Bunun dışında Parkinson hastalığına bağlı kusma ve mide bulantısını da önleyebilir. Reçete midenizi hızla boşaltarak, mide bulantısını azaltarak çalışır. Ek olarak, serebrumun kabarma odağı adı verilen parçasındaki tahriki azaltır veya kareler. Bağırsaklarınızdan kaynaklanan sinir mesajları boğulacak ve mide bulantısı ve yetersizlik hissi önlenecektir.

Stugil Tablet'in tipik kısmı, genellikle akşam yemeğinden 15-30 dakika önce alınan 10 mg'dır. Yetişkinler için reçete edilen en büyük kısım 30 mg'dır. Vücudunuza uygun olan kısım, vücut ağırlığınıza, şu anda aldığınız farklı ilaçlara ve sağlık durumunuza bağlıdır. Stugil Tablet'i uzmanın öğrettiği şekilde tam olarak bu miktarda aldığınızdan emin olun. Bir kısmı kaçırırsanız, daha sonra alabilirsiniz. Yine de, geçmişte kaçırılanı telafi etmek için iki porsiyonu birlikte almayın. Doz aşımı şaşkınlığa, baş dönmesine, kas veya parite kontrolünü kaybetmeye veya konuşmada sorunlara neden olabilir.

Aşağıdaki koşullara sahipseniz, Stugil Tablet'i almamanız istenir: Stugil Tablet'e veya bu ilacın başka bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık.

Midenizde veya sindirim sisteminde drenaj sorunları veya tıkanıklık

Hipofiz organında tümör

kalp hastalığı

Kandaki magnezyum, potasyum veya kalsiyumun yanlış boyutları Aşırı/orta

derecede karaciğer güçlenmesi

Stugil Tablet almanın olası yan etkileri, bağırsaklarda gevşeme, beyin ağrısı, baş ağrısı, ağız kuruluğu veya göğüs ağrısı olabilir. Bu yan etkiler son derece normal değildir ve birkaç gün içinde geçer. Değilse, uzmanınıza danışabilirsiniz. Bunların yanı sıra, derhal onarıcı düşünceye bakmalı ve eşlik eden yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, Stugil Tablet almayı bırakmalısınız: Kalp atışlarında tutarsızlık

Kararsızlık veya baygınlık hissi

Nefes almada zorluk, boğazda veya yüzde şişme

Adet düzensizlikleri

Areoladan göğüs sütünün salınması

Erkeklerde göğüslerin şişmesi

Henüz herhangi bir danışmanlığınız yok.

Bir doktora sorun (/sorgu/)

Bunu faydalı buldunuz mu?

Geri bildiriminiz ürünü geliştirmemize yardımcı olacak

Evet **Numara**

0 kişi faydalı buldu

(https://www.facebook.com/lyflink.in) (https://twitter.com/lyflink/)
(https://plus.google.com/112483408314968322009)

Bu sayfadaki bilgiler en son 25 Haz 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Hata bildir

Doktor mu Arıyorsunuz?

Yakınınızdaki en iyi doktorlardan randevu alın.

Şimdi Yer Ayırtın (/search/doctor/)

sorumluluk reddi

Burada sağlanan bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olmasını sağlamak için mümkün olan tüm çabayı gösterdik, ancak bunlar profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavinin yerini almamalıdır. Lyflink, yalnızca ilaçlarla ilgili genel bilgiler için referans kaynağı sağlar ve garanti etmez. doğruluğu veya kapsamlılığı. Herhangi bir ilaç veya bunların kombinasyonu için herhangi bir uyarının olmaması, ilacın veya kombinasyonun herhangi bir hasta için güvenli, etkili veya uygun olduğunu gösterdiği varsayılmamalıdır. Lyflink, yukarıda verilen bilgiler yardımıyla uygulanan sağlık hizmetlerinin herhangi bir yönü için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlacınız hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, doktorunuza, hemşirenize veya sağlık uzmanınıza danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Ayrıntılı Şart ve Koşulları görünburada (/medicine-şartlar-ve-koşullar/)