TITLE - CISPLATIN / PLATINOL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : U.S. National Library of Medicine

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Cisplatine-injectie

uitgesproken als (zus' platin)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Cisplatine-injectie moet worden gegeven in een ziekenhuis of medische instelling onder toezicht van een arts die ervaring heeft met het toedienen van chemotherapiemedicatie voor kanker.

Cisplatine kan ernstige nierproblemen veroorzaken. Nierproblemen kunnen vaker voorkomen bij oudere mensen. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling laboratoriumtests bestellen om te zien of uw nieren door dit medicijn worden aangetast. Vertel het uw arts als u een nierziekte heeft of ooit heeft gehad. Vertel het uw arts en apotheker als u aminoglycoside-antibiotica gebruikt, zoals amikacine (Amikin), gentamicine (Garamycin) of tobramycine (Tobi, Nebcin). Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: verminderd plassen; zwelling van het gezicht, armen, handen, voeten, enkels of onderbenen; of ongewone vermoeidheid of zwakte.

Cisplatine kan ernstige gehoorproblemen veroorzaken, vooral bij kinderen. Gehoorverlies kan in sommige gevallen blijvend zijn. Uw arts zal tests bestellen om uw gehoor voor en tijdens uw behandeling te controleren. Vertel het uw arts en apotheker als u ooit radiotherapie op uw hoofd heeft gehad. Vertel het uw arts en apotheker als u aminoglycoside-antibiotica gebruikt, zoals amikacine (Amikin), gentamicine (Garamycin) of tobramycine (Tobi, Nebcin). Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.

Cisplatine kan ernstige allergische reacties veroorzaken, vooral als u meer dan één dosis cisplatine-injectie heeft gekregen. Als u een allergische reactie krijgt op een cisplatine-injectie, kan deze binnen enkele minuten nadat uw infusie is gestart beginnen en kunt u de volgende symptomen krijgen: netelroos; huiduitslag; jeuk; roodheid van de huid; moeite met ademhalen of slikken; zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen; duizeligheid; flauwvallen; of snelle hartslag. Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen ervaart.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor, tijdens en na uw behandeling bepaalde tests bestellen om de reactie van uw lichaam op cisplatine te controleren. Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet stoppen of uitstellen als u bepaalde bijwerkingen ervaart.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Cisplatine wordt gebruikt in combinatie met andere medicijnen om kanker van de testikels te behandelen die niet is verbeterd of die is verergerd na behandeling met andere medicijnen of bestralingstherapie. Cisplatine wordt alleen of in combinatie met andere medicijnen gebruikt voor de behandeling van eierstokkanker (kanker die begint in de vrouwelijke voortplantingsorganen waar eicellen worden gevormd) die niet is verbeterd of die is verergerd na behandeling met andere medicijnen of bestralingstherapie. Cisplatine wordt ook alleen of in combinatie met andere medicijnen gebruikt om blaaskanker te behandelen die niet alleen met chirurgie of bestraling kunnen worden behandeld. Cisplatine zit in een klasse van medicijnen die bekend staat als platinabevattende verbindingen. Het werkt door de groei van kankercellen te stoppen of te vertragen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Cisplatine-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die gedurende 6 tot 8 uur intraveneus (in een ader) moet worden geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een medische instelling. Het wordt meestal eenmaal per 3 tot 4 weken gegeven.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Cisplatine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van hoofd- en nekkanker (waaronder kanker van de mond, lip, wang, tong, gehemelte, keel, amandelen en sinussen), longkanker, kanker van de baarmoederhals en slokdarm, hersentumoren, kwaadaardig pleuraal mesothlioom (kanker in het slijmvlies van de borst of buik), en neuroblastoom (een kanker die in zenuwcellen begint en vooral bij kinderen voorkomt). Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u cisplatine inneemt,

- vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor cisplatine, carboplatine (paraplatine), andere medicijnen of een van de bestanddelen van de cisplatine-injectie. Vraag uw apotheker om een lijst van de ingrediënten.
- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u de medicijnen vermeldt die worden vermeld in het gedeelte BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN en een van de volgende: amfotericine B (Abelcet; AmBisome; Amphotec, Fungizone Intraveneus), anticonvulsiva zoals fenytoïne (Dilantin), bumetanide (Bumex), ethacrynzuur (Edecrin), furosemide (Lasix), pyridoxine (Vitamine B-6). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met cisplatine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.
- vertel het uw arts als u een nierziekte of gehoorproblemen heeft. Uw arts wil misschien niet dat u een cisplatine-injectie krijgt.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U mag niet zwanger worden of borstvoeding geven terwijl u cisplatine krijgt. Als u zwanger wordt terwijl u cisplatine krijgt, neem dan contact op met uw arts. Cisplatine kan de foetus schaden.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Cisplatine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- misselijkheid
- braken
- diarree
- haaruitval
- verlies van het vermogen om voedsel te proeven
- hik
- droge mond, donkere urine, verminderd zweten, droge huid en andere tekenen van uitdroging

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- zwelling, pijn, roodheid of branderig gevoel op de injectieplaats
- pijn, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten
- spierkrampen
- moeite met lopen
- gevoel van een elektrische schok wanneer u uw nek naar voren buigt
- toevallen
- plotselinge veranderingen in het gezichtsvermogen, inclusief kleurenzien
- verlies van gezichtsvermogen
- oogpijn
- pijn op de borst of druk
- koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie
- ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken
- zwarte en teerachtige ontlasting
- rood bloed in ontlasting
- bloederig braaksel
- uitgebraakt materiaal dat op koffiedik lijkt

Cisplatine kan het risico verhogen dat u andere vormen van kanker krijgt. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn.

Cisplatine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch (1-800-332-1088).

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

- verminderd plassen
- zwelling van het gezicht, armen, handen, voeten, enkels of onderbenen
- ongewone vermoeidheid of zwakte
- geel worden van de huid of ogen
- pijn in de rechterbovenhoek van de maag
- misselijkheid
- braken
- ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken
- gehoorproblemen
- plotselinge veranderingen in het gezichtsvermogen
- koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie
- pijn, branderig gevoel, gevoelloosheid of tintelingen in de handen of voeten

wat moet ik nog meer weten?

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Platinol®ik
- Platinol-AQ®ik

andere namen

- cis-DDP

- cis-Diamminedichloorplatina
- cis-platina II
- DDP

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.

Laatst herzien - 15-10-2011

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022