



Hem → Läkemedel, örter och kosttillskott → Kladribininjektion

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693015.html>

Kladribininjektion

uttalas som (kla' dri been)

VIKTIG VARNING:

Kladribininjektion måste ges på ett sjukhus eller en medicinsk anläggning under överinseende av en läkare som har erfarenhet av att ge cytostatika för cancer.

Kladribin kan orsaka en allvarlig minskning av antalet av alla typer av blodkroppar i ditt blod. Detta kan orsaka vissa symtom och kan öka risken att du utvecklar en allvarlig infektion eller blödning. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: feber, ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion; ovanlig blödning eller blåmärken; svart och tjärartad avföring; rött blod i avföringen; blodiga uppkastningar; eller kräkts material som ser ut som kaffesump.

Kladribin kan orsaka allvarliga nervskador. Nervskada kan uppstå mer än en månad efter att kladribininjektion ges. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: smärta, sveda, domningar eller stickningar i händer eller fötter; svaghet i armar eller ben; eller förlust av förmågan att röra armar eller ben.

Kladribin kan orsaka allvarliga njurproblem. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft njursjukdom. Tala om för din läkare och apotekspersonal om du tar aminoglykosidantibiotika som amikacin (Amikin), gentamicin (Garamycin) eller tobramycin (Tobi, Nebcin); amfotericin B (Amphotec, Fungizon); angiotensinomvandlande enzym (ACE)-hämmare såsom benazepril (Lotensin), kaptopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), perindopril (Aceon (Acquirnailpril),), ramipril (Altace) och trandolapril (Mavik); eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som diklofenak (Cataflam, Voltaren), naproxen (Aleve, Naprosyn) och sulindak (Clinoril). Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: minskad urinering; svullnad i ansikte, armar, händer, fötter, vrister eller underben; eller ovanlig trötthet eller svaghet.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester före, under och efter behandlingen för att kontrollera din kropps svar på kladribin.

hur är denna medicin utskrivnen?

Kladribin används för att behandla hårcellsleukemi (cancer i en viss typ av vita blodkroppar). Kladribin är i en klass av läkemedel som kallas purinanaloger. Det fungerar genom att stoppa eller bromsa tillväxten av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Kladribininjektion kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras intravenöst (i en ven) av en läkare eller sjuksköterska på en medicinsk anläggning. Det ges vanligtvis långsamt under 7 dagar som en kontinuerlig intravenös injektion.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordinerats för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får kladribin,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot kladribin, andra mediciner eller något av innehållsämnen i kladribininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna medicinerna som listas i avsnittet VIKTIG VARNING och något av följande: immunsuppressiva medel som azatioprin (Imuran), ciklosporin (Neoral, Sandimmune), metotrexat (Rheumatrex), sirolimus (Rapamune) och takrolimus (Prograf). Din läkare kommer att behöva övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med kladribin, så var noga med att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft leversjukdom.
- berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du bör inte bli gravid medan du får kladribin. Om du blir gravid medan du får kladribin, kontakta din läkare. Kladribin kan skada fostret.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Kladribin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- illamående
- kräkningar
- diarre
- magont
- förstoppning
- aptitlöshet

- hudutslag
- huvudvärk
- överdriven svettning
- smärta, rodnad, svullnad eller sår på den plats där medicinen injicerades

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din läkare omedelbart:

- blek hud
- överdriven trötthet
- andnöd
- yrsel
- snabba hjärtslag

Kladribin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du använder denna medicin.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

- minskad urinering
- svullnad av ansikte, armar, händer, fötter, vristar eller underben
- ovanlig trötthet eller svaghet
- ovanlig blödning eller blåmärken
- svart och tjäraktig eller blodig avföring
- blodiga kräks eller kräkts material som ser ut som kaffesump
- feber, ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion
- smärta, sveda, domningar eller stickningar i händer eller fötter
- svaghet i armar eller ben.
- förlust av förmågan att röra armar eller ben.

hat annan information bör jag veta?

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Leustatin®

deras namn

- 2-CdA
- 2-klor-2'-deoxiadenosin

- CdA
- Klorodeoxiadenosin

Senast reviderad - 15/07/2019

Lär dig hur du citerar den här sidan



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists
®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering
för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022