

Source : U.S. National Library of Medicine



Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Acasă → Medicamente, plante și suplimente → Claritromicină

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692005.html>

Claritromicină

pronunțat ca (kla rith' roe mye sin)

de ce este prescris acest medicament?

Claritromicina este utilizată pentru a trata anumite infecții bacteriene, cum ar fi pneumonia (o infecție pulmonară), bronșita (infecția tuburilor care duc la plămâni) și infecțiile urechilor, sinusurilor, pielii și gâtului. De asemenea, este utilizat pentru a trata și a preveni diseminarea *Mycobacterium avium* infecție complexă (MAC) [un tip de infecție pulmonară care afectează adesea persoanele cu virusul imunodeficienței umane (HIV)]. Este utilizat în combinație cu alte medicamente pentru a elimina *H. pylori*, o bacterie care provoacă ulcere. Claritromicina face parte dintr-o clasă de medicamente numite antibiotice macrolide. Funcționează prin oprirea creșterii bacteriilor.

Antibioticele precum claritromicina nu vor funcționa pentru răceli, gripă sau alte infecții virale. Luarea de antibiotice atunci când acestea nu sunt necesare crește riscul de a face mai târziu o infecție care rezistă tratamentului cu antibiotice.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Claritromicina vine sub formă de comprimat, un comprimat cu eliberare prelungită (cu acțiune prelungită) și o suspensie (lichid) de administrat pe cale orală. Comprimatul și lichidul obișnuit sunt de obicei luate cu sau fără alimente la fiecare 8 (de trei ori pe zi) până la 12 ore (de două ori pe zi) timp de 7 până la 14 zile. Comprimatul cu eliberare prelungită se ia de obicei cu alimente la fiecare 24 de ore (o dată pe zi) timp de 7 până la 14 zile. Medicul dumneavoastră vă poate spune să luați claritromicină pentru o perioadă mai lungă de timp, în funcție de starea dumneavoastră. Luați claritromicină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați claritromicină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Agitați bine suspensia înainte de fiecare utilizare pentru a amesteca medicamentul în mod uniform.

Înghițiți comprimatele cu acțiune prelungită întregi; nu le despicăți, mestecați sau zdrobiți.

Ar trebui să începeți să vă simțiți mai bine în primele zile de tratament cu claritromicină. Dacă simptomele dumneavoastră nu se îmbunătățesc sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Luați claritromicină până când terminați prescripția, chiar dacă vă simțiți mai bine. Dacă încetați să luați claritromicină prea devreme sau săriți peste doze, este posibil ca infecția dumneavoastră să nu fie complet tratată și bacteria

poate deveni rezistent la antibiotice.

există utilizări pentru acest medicament

Claritromicina este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata alte tipuri de infecții, inclusiv boala Lyme (o infecție care se poate dezvolta după ce o persoană este mușcată de o căpușă), criptosporidioza (o infecție care provoacă diaree), boala zgârieturii pisicii (o infecție care se poate dezvolta după o căpușă), persoana este muscata sau zgariata de o pisica), boala legionarilor (tip de infecție pulmonară) și pertussis (tuse convulsivă; o infecție gravă care poate provoca tuse severă). Este, de asemenea, uneori utilizat pentru a preveni infecțiile cardiace la pacienții care efectuează proceduri dentare sau alte proceduri. Discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua claritromicină,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la claritromicină, azitromicină (Zithromax, Zmax), eritromicină (EES, Eryc, Erythrocine, PCE, altele), telitromicină (nu este disponibilă în SUA; Ketek), orice alte medicamente sau oricare dintre ingrediente din preparatele cu claritromicină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă luați cisapridă (Propulsid; nu este disponibil în SUA), colchicină (Colcrys, Mitigare) dacă aveți boală renală sau hepatică, dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), ergotamină (Ergomar, în Cafergot, în Migergot), lomitapide (Juxtapid), lovastatin (în Advicor), pimozidă (Orap) sau simvastatină (Flolipid, Zocor, în Vytorin). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați claritromicină dacă luați unul sau mai multe dintre aceste medicamente.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată icter (îngălbenirea pielii sau a ochilor) sau alte probleme hepatice în timp ce luați claritromicină. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați claritromicină.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante („diluante ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); anumite benzodiazepine, cum ar fi alprazolam (Xanax), midazolam și triazolam (Halcion); bromocriptină (Parlodel); blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc, în Caduet, în Lotrel), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac), nifedipină (Adalat, Afeditab CR) și verapamil (Calan, Verelan, în Tarka, altele); carbamazepină (Epitol, Tegretol, Teril, altele); colchicina (Colcrys, Mitigare); anumite medicamente pentru HIV, cum ar fi atazanavir (Reyataz), didanozină (Videx), efavirenz (Sustiva, în Atripla), etravirina (Intelence), nevirapină (Viramune), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, în Kaletra), saquinavir (Invirase) și zidovudină (AZT, Retrovir); anumite medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi amiodarona (Pacerone), disopiramida (Norpace), dofetilidă (Tikosyn), procainamidă, chinidină (în Nuedexta) și sotalol (Betapace, Sorine); medicamente care scad colesterolul (statine), cum ar fi atorvastatina (Lipitor, în Caduet) și pravastatina (Pravachol); cilostazol; ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darifenacin (Enablex); digoxină (Digitek, Lanoxin); erlotinib (Tarceva); eszopiclonă (Lunesta); fluconazol (Diflucan); insulină; itraconazol (Onmel, Sporanox); maraviroc (Selzentry); metilprednisolon (Medrol); omeprazol (Prilosec); medicamente orale pentru diabet, cum ar fi nateglinidă (Starlix), pioglitazonă (Actos, în Actoplus Met, în Duetact), repaglinidă (Prandin, în Prandimet), și rosiglitazonă (Avandia, în Avandamet, în Avandaryl); fenobarbital; fenitoină (Dilantin, Phenytek); quetiapină (Seroquel); ranitidină (Zantac); rifabutină (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifater, în Rifamate); rifapentină (Priftin); sildenafil (Revatio, Viagra); tacrolimus (Astagraf, Prograf); teofilina (Elixophyllin, Theo-24, Theochron); tadalafil (Adcirca,

Cialis); tolterodină (Detrol); valproat (Depacon); vardenafil (Levitra, Staxyn); și vinblastină. Multe alte medicamente pot interacționa și cu claritromicina, așa că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

- spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un interval QT prelungit (o problemă rară a inimii care poate provoca leșin sau bătăi neregulate ale inimii), aritmie ventriculară (ritmuri anormale ale inimii), un nivel scăzut de magneziu sau potasiu în sânge, miastenia gravis (MG; o tulburare a sistemului nervos care cauzează slăbiciune musculară), sau dacă aveți sau ați avut vreodată bătăi neregulate ale inimii, boală coronariană (îngustarea vaselor de sânge care furnizează sânge la inimă) sau boli ale rinichilor sau ficatului.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați claritromicină, adresați-vă medicului dumneavoastră. Claritromicina poate dăuna fătului.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați claritromicină.
- trebuie să știți că claritromicina vă poate face amețit, confuz sau dezorientat. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Claritromicina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispere:

- diaree
- greață
- vărsături
- dureri de stomac
- arsuri la stomac
- gaz
- schimbarea gustului
- durere de cap

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

- durere în piept, dificultăți de respirație, dificultăți de respirație, durere sau slăbiciune în partea laterală a corpului sau vorbire greșită
- diaree severă cu scaune apoase sau sângeroase (până la 2 luni după tratament)
- eczemă
- urticarie
- mâncărime
- umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare
- dificultăți de respirație sau de înghițire
- răgușeală
- piele descuamată sau formată de vezicule
- febră
- îngălbenirea pielii sau a ochilor
- oboseală extremă
- sângerări sau vânătăi neobișnuite
- lipsa de energie
- pierderea poftei de mâncare
- durere în partea dreaptă sus a stomacului
- urină de culoare închisă
- simptome asemănătoare gripei
- bătăi rapide, puternice sau neregulate ale inimii
- slăbiciune musculară, cum ar fi dificultăți de mestecat, de vorbit sau de a efectua activități zilnice
- viziune dubla

Claritromicina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați comprimatele la temperatura camerei și ferite de lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie). Nu puneți suspensia la frigider. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate. Aruncați orice suspensie neutilizată după 14 zile.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

- dureri de stomac
- greață
- vărsături
- diaree

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate comanda anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la claritromicină.

Comprimatul cu eliberare prelungită nu se dizolvă în stomac după înghițire. Acesta eliberează încet medicamentul pe măsură ce trece prin sistemul dumneavoastră digestiv. Este posibil să observați învelișul tabletei în scaun. Acest lucru este normal și nu înseamnă că nu ați primit doza completă de medicament.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Rețeta dumneavoastră probabil nu poate fi reîncărcată. Dacă mai aveți simptome de infecție după ce ați terminat cu claritromicină, sunați la medicul dumneavoastră.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Biaxin®Filmtab®
- Biaxin®Granule
- Biaxin®XL Filmtab
- Biaxin®XL Pac

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.

Ultima revizuire - 15.06.2020

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022