

TITLE - CLARITHROMYCIN / BIAXIN CLARIBID MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SPANISH

Source : U.S. National Library of Medicine



Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Casa → Medicamentos, hierbas y suplementos → Claritromicina

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692005.html>

claritromicina

pronunciado como (kla rith' roe mye sin)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La claritromicina se usa para tratar ciertas infecciones bacterianas, como neumonía (una infección pulmonar), bronquitis (infección de los conductos que van a los pulmones) e infecciones de los oídos, los senos paranasales, la piel y la garganta. También se usa para tratar y prevenir diseminado *Mycobacterium avium* infección compleja (MAC) [un tipo de infección pulmonar que a menudo afecta a las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)]. Se utiliza en combinación con otros medicamentos para eliminar *H. pylori*, una bacteria que causa úlceras. La claritromicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos macrólidos. Actúa deteniendo el crecimiento de bacterias.

Los antibióticos como la claritromicina no funcionan para los resfriados, la gripe u otras infecciones virales. Tomar antibióticos cuando no son necesarios aumenta el riesgo de contraer una infección más adelante que resista el tratamiento con antibióticos.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La presentación de la claritromicina es en tabletas, tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) y suspensión (líquido) para tomar por vía oral. La tableta regular y el líquido generalmente se toman con o sin alimentos cada 8 (tres veces al día) a 12 horas (dos veces al día) durante 7 a 14 días. La tableta de liberación prolongada generalmente se toma con alimentos cada 24 horas (una vez al día) durante 7 a 14 días. Su médico puede indicarle que tome claritromicina por más tiempo dependiendo de su condición. Tome la claritromicina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la claritromicina exactamente como se le indique. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Agite bien la suspensión antes de cada uso para mezclar el medicamento de manera uniforme.

Trague las tabletas de acción prolongada enteras; no los parta, mastique ni triture.

Debería comenzar a sentirse mejor durante los primeros días de tratamiento con claritromicina. Si sus síntomas no mejoran o empeoran, llame a su médico.

Tome claritromicina hasta que termine la receta, incluso si se siente mejor. Si deja de tomar claritromicina demasiado pronto u omite dosis, es posible que su infección no se trate por completo y las bacterias

puede volverse resistente a los antibióticos.

Otros usos de este medicamento

La claritromicina también se usa a veces para tratar otros tipos de infecciones, incluida la enfermedad de Lyme (una infección que se puede desarrollar después de que una garrapata muerde a una persona), la criptosporidiosis (una infección que causa diarrea), la enfermedad por arañazo de gato (una infección que se puede desarrollar después de que una persona es mordida o arañada por un gato), la enfermedad del legionario (tipo de infección pulmonar) y la tos ferina (tos convulsa; una infección grave que puede causar tos intensa). A veces también se usa para prevenir infecciones cardíacas en pacientes que se someten a procedimientos dentales o de otro tipo. Hable con su médico sobre los posibles riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar claritromicina,

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la claritromicina, la azitromicina (Zithromax, Zmax), la eritromicina (EES, Eryc, Erythrocin, PCE, otros), la telitromicina (no disponible en EE. UU.; Ketek), cualquier otro medicamento o cualquiera de los ingredientes en las preparaciones de claritromicina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico si está tomando cisaprida (Propulsid; no disponible en los EE. UU.), colchicina (Colcrys, Mitigare) si tiene enfermedad renal o hepática, dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), ergotamina (Ergomar, en Cafergot, en Migergot), lomitapida (Juxtapid), lovastatina (en Advicor), pimozida (Orap) o simvastatina (Flolipid, Zocor, en Vytorin). Su médico probablemente le indicará que no tome claritromicina si está tomando uno o más de estos medicamentos.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido ictericia (color amarillo de la piel o los ojos) u otros problemas hepáticos mientras toma claritromicina. Su médico probablemente le dirá que no tome claritromicina.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin, Jantoven); ciertas benzodiazepinas como alprazolam (Xanax), midazolam y triazolam (Halcion); bromocriptina (Parlodel); bloqueadores de los canales de calcio como amlodipina (Norvasc, en Caduet, en Lotrel), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac), nifedipina (Adalat, Afedítab CR) y verapamilo (Calan, Verelan, en Tarka, otros); carbamazepina (Epitol, Tegretol, Teril, otros); colchicina (Colcrys, Mitigare); ciertos medicamentos para el VIH como atazanavir (Reyataz), didanosina (Videx), efavirenz (Sustiva, en Atripla), etravirina (Intelence), nevirapina (Viramune), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, en Kaletra), saquinavir (Invirase) y zidovudina (AZT, Retrovir); ciertos medicamentos para los latidos cardíacos irregulares como amiodarona (Pacerone), disopiramida (Norpac), dofetilida (Tikosyn), procainamida, quinidina (en Nuedexta) y sotalol (Betapace, Sorine); medicamentos para reducir el colesterol (estatinas) como atorvastatina (Lipitor, en Caduet) y pravastatina (Pravachol); cilostazol; ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darifenacina (Enablex); digoxina (Digitek, Lanoxin); erlotinib (Tarceva); eszopiclona (Lunesta); fluconazol (Diflucan); insulina; itraconazol (Onmel, Sporanox); maraviroc (Selzentry); metilprednisolona (Medrol); omeprazol (Prilosec); medicamentos orales para la diabetes como nateglinida (Starlix), pioglitazona (Actos, en Actoplus Met, en Duetact), repaglinida (Prandin, en Prandimet), y rosiglitazona (Avandia, en Avandamet, en Avandaryl); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); quetiapina (Seroquel); ranitidina (Zantac); rifabutina (Mycobutin); rifampicina (Rifadin, Rimactane, en Rifater, en Rifamate); rifapentina (Priftin); sildenafil (Revatio, Viagra); tacrolimús (Astagraf, Prograf); teofilina (Elixophyllin, Theo-24, Theochron); tadalafilo (Adcirca,

cialis); tolterodina (Detrol); valproato (Depacon); vardenafilo (Levitra, Staxyn); y vinblastina. Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con la claritromicina, así que informe a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

- informe a su médico qué productos a base de hierbas está tomando, especialmente la hierba de San Juan.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido un intervalo QT prolongado (un problema cardíaco raro que puede causar desmayos o latidos cardíacos irregulares), arritmia ventricular (ritmos cardíacos anormales), niveles bajos de magnesio o potasio en la sangre, miastenia grave (MG; un trastorno del sistema nervioso que causa debilidad muscular), o si tiene o alguna vez ha tenido latidos cardíacos irregulares, enfermedad de las arterias coronarias (estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón), o enfermedad renal o hepática.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma claritromicina, llame a su médico. La claritromicina puede dañar al feto.
- Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando claritromicina.
- Debe saber que la claritromicina puede causarle mareos, confusión o desorientación. No conduzca un automóvil ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La claritromicina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- Diarrea
- náuseas
- vómitos
- dolor de estómago
- acidez
- gas
- cambio de gusto
- dolor de cabeza

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- dolor en el pecho, dificultad para respirar, dificultad para respirar, dolor o debilidad en un costado del cuerpo o dificultad para hablar
- diarrea severa con heces acuosas o con sangre (hasta 2 meses después de su tratamiento)
- erupción
- urticaria
- Comezón
- hinchazón de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas
- dificultad para respirar o tragar
- ronquera
- descamación o ampollas en la piel
- fiebre
- coloración amarillenta de la piel o los ojos
- cansancio extremo
- sangrado o moretones inusuales
- falta de energía
- pérdida de apetito
- dolor en la parte superior derecha del estómago
- orina de color oscuro
- síntomas parecidos a la gripe
- latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares
- debilidad muscular como dificultad para masticar, hablar o realizar actividades diarias
- visión doble

La claritromicina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guarde las tabletas a temperatura ambiente y lejos de la luz, el calor excesivo y la humedad (no en el baño). No refrigere la suspensión. Manténgalo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad. Deseche cualquier suspensión no utilizada después de 14 días.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.
<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

- dolor de estómago
- náuseas
- vómitos
- Diarrea

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la claritromicina.

La tableta de liberación prolongada no se disuelve en el estómago después de tragarla. Libera lentamente el medicamento a medida que pasa a través de su sistema digestivo. Puede notar el recubrimiento de la tableta en las heces. Esto es normal y no significa que no haya recibido la dosis completa del medicamento.

No permita que nadie más tome su medicamento. Probablemente no se pueda rellenar tu prescripción. Si aún tiene síntomas de infección después de terminar la claritromicina, llame a su médico.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- [Biaxina®Ficha de película®](#)
- [Biaxina®Gránulos](#)
- [Biaxina®Ficha de película XL](#)
- [Biaxina®Paquete XL¶](#)

¶ -Este producto de marca ya no está en el mercado. Es posible que haya alternativas genéricas disponibles.

Última revisión - 15/06/2020

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022