

# TITLE - CLARITHROMYCIN / BIAXIN CLARIBID MEDICATION PATIENT INFORMATION IN CHINESE

Source : U.S. National Library of Medicine



Disclaimer : Document presented by [www.911GlobalMeds.com](http://www.911GlobalMeds.com)



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

家→药物、草药和补充剂→克拉霉素

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692005.html>

## 克拉霉素

发音为 (kla rith' roe mye sin)

### 为什么要开这种药?

克拉霉素用于治疗某些细菌感染, 例如肺炎 (肺部感染)、支气管炎 (通向肺部的管道感染) 以及耳朵、鼻窦、皮肤和喉咙的感染。它还用于治疗 and 预防传播 *鸟分枝杆菌* 复杂 (MAC) 感染 [一种经常影响人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染者的肺部感染]。它与其他药物联合使用以消除 *幽门螺杆菌*, 一种引起溃疡的细菌。克拉霉素属于一类称为大环内酯类抗生素的药物。它通过阻止细菌的生长起作用。

克拉霉素等抗生素对感冒、流感或其他病毒感染无效。在不必要时服用抗生素会增加您日后感染抗生素治疗的风险。

### 这个药应该怎么用?

克拉霉素有片剂、缓释 (长效) 片剂和口服悬浮液 (液体)。常规片剂和液体通常每 8 小时 (每天 3 次) 至 12 小时 (每天两次) 在有或没有食物的情况下服用, 持续 7 至 14 天。缓释片剂通常每 24 小时 (每天一次) 与食物一起服用, 持续 7 至 14 天。根据您的情况, 您的医生可能会告诉您更长时间服用克拉霉素。每天大约在同一时间服用克拉霉素。仔细遵循处方标签上的说明, 并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用克拉霉素。不要多吃或少吃, 也不要比医生开的更频繁。

每次使用前摇匀混悬液, 使药物混合均匀。

整个吞服长效片剂; 不要分裂、咀嚼或压碎它们。

在克拉霉素治疗的最初几天, 您应该开始感觉好些。如果您的症状没有改善或恶化, 请致电您的医生。

即使您感觉好些, 也要服用克拉霉素直至完成处方。如果您过早停止服用克拉霉素或跳过剂量, 您的感染可能无法完全治疗, 细菌

可能对抗生素产生耐药性。

## 该药的其他用途

克拉霉素有时也用于治疗其他类型的感染，包括莱姆病（人被蜱叮咬后可能发生的感染）、隐孢子虫病（导致腹泻的感染）、猫抓病（可能在被蜱虫叮咬后发生的感染）人被猫咬伤或抓伤）、军团病（肺部感染的类型）和百日咳（百日咳；一种可导致剧烈咳嗽的严重感染）。它有时也用于预防接受牙科或其他手术的患者的心脏感染。与您的医生讨论使用这种药物治疗您的病情可能存在的风险。

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

## 我应该遵循什么特殊的预防措施？

### 服用克拉霉素前，

- 如果您对克拉霉素、阿奇霉素（Zithromax、Zmax）、红霉素（EES、Eryc、Erythrocin、PCE等）、泰利霉素（美国未提供；Ketek）、任何其他药物或任何克拉霉素制剂中的成分。向您的药剂师索取成分清单。
- 如果您正在服用西沙必利（Propulsid；在美国不可用），请告诉您的医生，如果您患有肾脏或肝脏疾病，秋水仙碱（Colcrys, Mitigare），双氢麦角胺（DHE 45, Migranal），麦角胺（Ergomar, 在Cafergot, 在Migergot），lomitapide (Juxtapid)、lovastatin (in Advicor)、pimozide (Orap) 或辛伐他汀 (Flolipid, Zocor, in Vytorin)。如果您正在服用一种或多种这些药物，您的医生可能会告诉您不要服用克拉霉素。
- 如果您在服用克拉霉素时出现或曾经出现黄疸（皮肤或眼睛发黄）或其他肝脏问题，请告诉您的医生。您的医生可能会告诉您不要服用克拉霉素。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：抗凝剂（“血液稀释剂”），例如华法林（Coumadin, Jantoven）；某些苯二氮卓类药物，例如阿普唑仑（Xanax）、咪达唑仑和三唑仑（Halcion）；溴隐亭（Parlodel）；钙通道阻滞剂，例如氨氯地平（Norvasc, 在Caduet, 在Lotrel）、地尔硫卓（Cardizem、Cartia、Tiazac）、硝苯地平（Adalat、Afedtab CR）和维拉帕米（Calan、Verelan, 在Tarka等）；卡马西平（Eptol、Tegretol、Teril等）；秋水仙碱（Colcrys, Mitigare）；某些HIV药物，如阿扎那韦（Reyataz）、去羟肌苷（Videx）、依非韦伦（Sustiva, in Atripla）、依曲韦林（Intelence）、奈韦拉平（Viramune）、奈非那韦（Viracept）、利托那韦（Norvir, 在Kaletra）、沙奎那韦（Invirase）和齐多夫定（AZT, Retrovir）；某些治疗心律不齐的药物，如胺碘酮（Pacerone）、丙吡胺（Norpace）、多非利特（Tikosyn）、普鲁卡因胺、奎尼丁（Nuedexta）和索他洛尔（Betapace, Sorine）；降胆固醇药物（他汀类药物），例如阿托伐他汀（立普妥, 在Caduet）和普伐他汀（Pravachol）；西洛他唑；环孢素（Gengraf、Neoral、Sandimmune）；达非那新（Enblex）；地高辛（Digitek, Lanoxin）；厄洛替尼（特罗凯）；右佐匹克隆（Lunesta）；氟康唑（大氟康）；胰岛素；伊曲康唑（Onmel, Sporanox）；maraviroc（塞尔岑特里）；甲基强的松龙（Medrol）；奥美拉唑（Prilosec）；糖尿病口服药物，如那格列奈（Starlix）、吡格列酮（Actos, 在Actoplus Met, 在Duetact）、瑞格列奈（Prandin, 在Prandimet）、和罗格列酮（Avandia, 在Avandamet, 在Avandaryl）；苯巴比妥；苯妥英（Dilantin, Phenytek）；喹硫平（Seroquel）；雷尼替丁（Zantac）；利福布汀（Mycobutin）；利福平（Rifadin, Rimactane, 在Rifater, 在Rifamate）；利福喷丁（Priftin）；西地那非（Revatio, 伟哥）；他克莫司（Astagraf, Prograf）；茶碱（Elixophyllin, Theo-24, Theochron）；他达拉非（Adcirca,

西力士)；托特罗定 (Detrol)；丙戊酸盐 (Depacon)；伐地那非 (艾力达, Staxyn)；和长春碱。许多其他药物也可能与克拉霉素相互作用，因此请告诉您的医生您正在服用的所有药物，即使是未出现在此列表中的药物。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。

- 告诉您的医生您正在服用什么草药产品，尤其是圣约翰草。
- 告诉您的医生您是否患有或曾经患有 QT 间期延长（一种罕见的心脏问题，可能导致昏厥或心律不齐）、室性心律失常（心律异常）、血液中镁或钾含量低、重症肌无力（MG；一种导致肌肉无力的神经系统疾病），或者如果您有或曾经有过心律不齐、冠状动脉疾病（向心脏供血的血管变窄）、肾脏或肝脏疾病。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在服用克拉霉素期间怀孕，请致电您的医生。克拉霉素可能会伤害胎儿。
- 如果您正在接受手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在服用克拉霉素。
- 您应该知道，克拉霉素可能会使您头晕、困惑或迷失方向。在您知道这种药物如何影响您之前，请勿驾驶汽车或操作机器。

## 我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

## 如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

## 这种药物会引起副作用吗？

**克拉霉素可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：**

- 腹泻
- 恶心
- 呕吐
- 肚子痛
- 胃灼热
- 气体
- 口味变化
- 头痛

**一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：**

- 胸痛、呼吸急促、呼吸困难、身体一侧疼痛或虚弱，或口齿不清
- 严重腹泻伴水样便或血便（治疗后长达 2 个月）
- 皮疹
- 麻疹
- 瘙痒
- 面部、喉咙、舌头、嘴唇、眼睛、手、脚、脚踝或小腿肿胀
- 呼吸或吞咽困难
- 嘶哑
- 皮肤脱皮或起泡
- 发烧
- 皮肤或眼睛发黄
- 极度疲倦
- 异常出血或瘀伤
- 能源短缺
- 食欲不振
- 胃右上方疼痛
- 深色尿液
- 流感样症状
- 快速、剧烈或不规则的心跳
- 肌肉无力，例如难以咀嚼、说话或进行日常活动
- 双重视力

克拉霉素可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

## 我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将药片存放在室温下，远离光线、过热和潮湿（不要放在浴室里）。不要冷藏悬浮液。将其保持在室温下，远离过多的热量和水分。14 天后丢弃任何未使用的暂停。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒，请始终锁上安全帽，并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。  
<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

## n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

### 过量服用的症状可能包括以下内容：

- 肚子痛
- 恶心
- 呕吐
- 腹泻

## 我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些实验室测试，以检查您的身体对克拉霉素的反应。

吞咽后缓释片剂不会在胃中溶解。当药物通过您的消化系统时，它会缓慢释放药物。您可能会注意到粪便中的片剂涂层。这是正常的，并不意味着您没有得到全剂量的药物。

不要让其他人服用您的药物。您的处方可能无法补充。如果您在完成克拉霉素后仍有感染症状，请致电您的医生。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

## 兰特名称

- 比亚欣®电影标签®
- 比亚欣®颗粒剂
  
- 比亚欣®XL 电影标签
- 比亚欣®XL 包 ¶

¶ -该品牌产品已不再上市。可能有通用的替代品。

最后修订 - 2020 年 6 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



#### [美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

---

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日