

TITLE - CLARITHROMYCIN / BIAXIN CLARIBID MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : U.S. National Library of Medicine



Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Huis → Medicijnen, kruiden en supplementen → Claritromycine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692005.html>

claritromycine

uitgesproken als (kla rith' roe mye sin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Claritromycine wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde bacteriële infecties, zoals longontsteking (een longinfectie), bronchitis (infectie van de buizen die naar de longen leiden) en infecties van de oren, sinussen, huid en keel. Het wordt ook gebruikt om verspreide te behandelen en te voorkomen *Mycobacterium avium* complexe (MAC) infectie [een type longinfectie die vaak voorkomt bij mensen met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv)]. Het wordt gebruikt in combinatie met andere medicijnen om te elimineren *H. pylori*, een bacterie die zweren veroorzaakt. Claritromycine zit in een klasse medicijnen die macrolide-antibiotica worden genoemd. Het werkt door de groei van bacteriën te stoppen.

Antibiotica zoals claritromycine werken niet bij verkoudheid, griep of andere virale infecties. Als u antibiotica gebruikt wanneer ze niet nodig zijn, vergroot u het risico op het krijgen van een infectie die later weerstaat aan behandeling met antibiotica.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Claritromycine wordt geleverd als een tablet, een tablet met verlengde afgifte (langwerkende werking) en een suspensie (vloeistof) om via de mond in te nemen. De gewone tablet en vloeistof worden gewoonlijk met of zonder voedsel ingenomen om de 8 (driemaal per dag) tot 12 uur (tweemaal per dag) gedurende 7 tot 14 dagen. De tablet met verlengde afgifte wordt gewoonlijk om de 24 uur (eenmaal per dag) gedurende 7 tot 14 dagen met voedsel ingenomen. Uw arts kan u vertellen om claritromycine langer te gebruiken, afhankelijk van uw toestand. Neem claritromycine elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem claritromycine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Schud de suspensie goed voor elk gebruik om het medicijn gelijkmatig te mengen.

Slik de langwerkende tabletten heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren.

U zou zich tijdens de eerste paar dagen van de behandeling met claritromycine beter moeten gaan voelen. Als uw symptomen niet verbeteren of verergeren, neem dan contact op met uw arts.

Neem claritromycine totdat u klaar bent met het recept, zelfs als u zich beter voelt. Als u te snel stopt met het innemen van claritromycine of doses overslaat, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig wordt behandeld en de bacteriën

kunnen resistent worden tegen antibiotica.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Clarithromycine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van andere soorten infecties, waaronder de ziekte van Lyme (een infectie die kan ontstaan nadat een persoon is gebeten door een teek), cryptosporidiose (een infectie die diarree veroorzaakt), kattenkrabziekte (een infectie die kan ontstaan na een persoon is gebeten of gekrabd door een kat), veteranenziekte (type longinfectie) en kinkhoest (kinkhoest; een ernstige infectie die ernstige hoestbuien kan veroorzaken). Het wordt soms ook gebruikt om hartinfecties te voorkomen bij patiënten die tandheelkundige of andere procedures ondergaan. Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u claritromycine inneemt,

- vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor claritromycine, azithromycine (Zithromax, Zmax), erytromycine (EES, Eryc, Erythrocin, PCE, anderen), telithromycine (niet beschikbaar in de VS; Ketek), andere medicijnen of een van de ingrediënten in claritromycinepreparaten. Vraag uw apotheker om een lijst van de ingrediënten.
- vertel het uw arts als u cisapride (Propulsid; niet beschikbaar in de VS), colchicine (Colcrys, Mitigare) gebruikt als u een nier- of leverziekte heeft, dihydro-ergotamine (DHE 45, Migranal), ergotamine (Ergomar, in Cafergot, in Migergot), lomitapide (Juxtapid), lovastatine (in Advicor), pimozide (Orap) of simvastatine (Flolipid, Zocor, in Vytorin). Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen claritromycine te gebruiken als u een of meer van deze geneesmiddelen gebruikt.
- vertel het uw arts als u geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) of andere leverproblemen heeft of ooit heeft gehad tijdens het gebruik van claritromycine. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen claritromycine te gebruiken.
- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin, Jantoven); bepaalde benzodiazepinen zoals alprazolam (Xanax), midazolam en triazolam (Halcion); bromocriptine (Parlodel); calciumkanaalblokkers zoals amlodipine (Norvasc, in Caduet, in Lotrel), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac), nifedipine (Adalat, Afeditab CR) en verapamil (Calan, Verelan, in Tarka, anderen); carbamazepine (Epitol, Tegretol, Teril, anderen); colchicine (Colcrys, Mitigare); bepaalde medicijnen tegen hiv zoals atazanavir (Reyataz), didanosine (Videx), efavirenz (Sustiva, in Atripla), etravirine (Intelence), nevirapine (Viramune), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra), saquinavir (Invirase) en zidovudine (AZT, Retrovir); bepaalde medicijnen voor een onregelmatige hartslag zoals amiodaron (Pacerone), disopyramide (Norpace), dofetilide (Tikosyn), procaïnamide, kinidine (in Nuedexta) en sotalol (Betapace, Sorine); cholesterolverlagende medicijnen (statines) zoals atorvastatine (Lipitor, in Caduet) en pravastatine (Pravachol); cilostazol; ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darifenacine (Enblex); digoxine (Digitek, Lanoxin); erlotinib (Tarceva); eszopiclon (Lunesta); fluconazol (Diflucan); insuline; itraconazol (Onmel, Sporanox); maraviroc (Selzentry); methylprednisolon (Medrol); omeprazol (Prilosec); orale medicatie voor diabetes zoals nateglinide (Starlix), pioglitazon (Actos, in Actoplus Met, in Duetact), repaglinide (Prandin, in Prandimet), en rosiglitazon (Avandia, in Avandamet, in Avandaryl); fenobarbital; fenytoïne (Dilantin, Phenytek); quetiapine (Seroquel); ranitidine (Zantac); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifater, in Rifamate); rifapentine (Priftin); sildenafil (Revatio, Viagra); tacrolimus (Astagraf, Prograf); theofylline (Elixofylline, Theo-24, Theochron); tadalafil (Adcirca,

Cialis); tolterodine (Detrol); valproaat (Depacon); vardenafil (Levitra, Staxyn); en vinblastine. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met claritromycine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

- vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.
- vertel het uw arts als u een verlengd QT-interval heeft of ooit heeft gehad (een zeldzaam hartprobleem dat flauwvallen of een onregelmatige hartslag kan veroorzaken), ventriculaire aritmie (abnormale hartritmes), een laag magnesium- of kaliumgehalte in uw bloed, myasthenia gravis (MG; een aandoening van het zenuwstelsel die spierzwakte veroorzaakt), of als u een onregelmatige hartslag heeft of ooit heeft gehad, coronaire hartziekte (vernauwing van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien), of een nier- of leverziekte.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u claritromycine gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Claritromycine kan de foetus schaden.
- als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u claritromycine gebruikt.
- u moet weten dat claritromycine u duizelig, verward of gedesoriënteerd kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Claritromycine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- diarree
- misselijkheid
- braken
- buikpijn
- maagzuur
- gas-
- verandering in smaak
- hoofdpijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische noodhulp:

- pijn op de borst, kortademigheid, moeite met ademen, pijn of zwakte in de zijkant van uw lichaam, of onduidelijke spraak
- ernstige diarree met waterige of bloederige ontlasting (tot 2 maanden na uw behandeling)
- uitslag
- netelroos
- jeuk
- zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen
- moeite met ademen of slikken
- heesheid
- peeling of blaarvorming huid
- koorts
- geel worden van de huid of ogen
- extreme vermoeidheid
- ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken
- gebrek aan energie
- verlies van eetlust
- pijn in de rechterbovenhoek van de maag
- donkergekleurde urine
- griepachtige symptomen
- snelle, bonzende of onregelmatige hartslag
- spierzwakte zoals moeite met kauwen, praten of het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
- dubbel zicht

Claritromycine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar de tabletten bij kamertemperatuur en uit de buurt van licht, overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Bewaar de suspensie niet in de koelkast. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht. Gooi ongebruikte suspensie na 14 dagen weg.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p>) [<http://goo.gl/c4Rm4p>] voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

- buikpijn
- misselijkheid
- braken
- diarree

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op claritromycine te controleren.

De tablet met verlengde afgifte lost niet op in de maag na inslikken. Het geeft het medicijn langzaam af terwijl het door uw spijsverteringsstelsel gaat. U kunt de tabletcoating in de ontlasting opmerken. Dit is normaal en betekent niet dat u niet de volledige dosis medicatie heeft gekregen.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Uw recept is waarschijnlijk niet navulbaar. Als u nog steeds symptomen van infectie heeft nadat u klaar bent met claritromycine, neem dan contact op met uw arts.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Biaxin®Filmtab®
- Biaxin®Korrels

- Biaxin®XL Filmtab
- Biaxin®XL-pakketik

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.

Laatst herzien - 15-06-2020

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022